

que latere 6—11, spinis hyalinis, dente apicali aequilonga vel brevior vicinis. Cymae sessiles v. subsessiles, foliis aequilongae vel vix longiores, 2—4-florae. Sepala oblongo-ovata vel late triangularia, 3 mm longa, glandulis duplo brevioribus. Corolla rosea, 15 mm in diametro, petalis 7—9 mm longis crenulato-lobulatis.

Obs.: In honorem Nestoris botanicorum cubanorum Prof.-ris JUAN TOMAS ROIG y MESA, magistri agronomiae, botanicae atque pharmacologiae dedicata.

Typus: SHAFER 13 409; Prov. Pinar del Rio: Sierra de los Organos prope dag. Sumidero. Leg.: A. J. SHAFER et HNO LEON, Aug. 1912. LS.

Prov. Pinar del Rio, Viñales: Mogote de Bandera. Leg.: HNO ALAIN No. 2758. 21. II. 1953. — Prov. Pinar del Rio; Viñales: Sierra de Guasasa, leg.: A. BORHIDI 3. VII. 1970.

**Malpighia Acunana** Borhidi et Muñiz sp. nova (Fig. 5)

Frutex pulcherrimus, 2—3 m altus. Ramuli teretes, glabri. Folia sessilia vel subsessilia ovata, 4,5—7 cm longa, 3—4,5 cm lata, apice acuminata, acuta, basi rotundata vel cordata, nitida et glabra, nervis utrinque reticulatis et valde prominentibus, coriacea, margine revoluta, sinuato-dentata, dentibus utroque latere 11—16, 3—8 mm longis, saepe recurvatis,



Fig. 5. Type specimen of *Malpighia Acunana*, SV. 27126

Fam.: **Malpighiaceae**

**Malpighia Roigiana** Borhidi et Muñiz sp. nova

Frutex 1—2 m altus. Rami cylindrici glabri. Folia glabra, nitida, late elliptica vel ovato-orbicularia, 2,5—4,5 cm longa, apice obtusa vel rotundata, mucrone reflexo, nervis reticulatis utrinque valde prominentibus, margine revoluta, spinoso-dentata dentibus utro-

dente apicali longiore vicinis. Cymae 3—7-florae, sessiles axillares et terminales, foliis breviores; pedicellis 1,0—1,4 cm longis. Sepala ovata, 2—3 mm longa, glandulae dimidio sepalum longiores. Corolla rosea, 15—20 mm in diam., petala majora 8—10 mm longa. Drupa subgloboso-pyramidata, 11—13 mm longa, rubra.

Obs.: A specie proxima *M. Roigiana* Borhidi et Muñiz foliis ovatis, majoribus, apice acuminatis, margine dentibus numerosioribus, cymis foliis brevioribus, corolla majore bene differt.

Typus: Prov. Oriente; Sierra Maestra, in silvis calcareis aridis “mogotis” supra Finca Demajagua prope pag. Matias. Leg.: A. BORHIDI et O. MUÑIZ. 23. X. 1969. No. 27 126. SV; isotypus: Bp. 503021. — Prov. Oriente: Sierra Maestra, in silvis calcareis aridis supra pag. La Tabla. Leg.: A. BORHIDI et O. MUÑIZ 5. II. 1970.