

Excerpt from:

Catálogo de las Plantas Vasculares de la

República Argentina II, Fabaceae-

Zygophyllaceae (Dicotyledoneae),

ed. F. O. Zuloaga and O. Morrone,

Monographs in Systematic Botany from the

Missouri Botanical Garden 74: 804–813. 1999.

MALPIGHIACEAE

19 géneros, 44 especies; 3 especies endémicas.

por W. R. Anderson

Aspicarpa Rich.

Número de especies: 4

Aspicarpa argentea Nied., nom. superfl. = **Aspicarpa sericea** Griseb.

Aspicarpa argentea Nied. var. *sericea* (Griseb.) Nied., nom. superfl. = **Aspicarpa sericea** Griseb.

Aspicarpa guaranitica (A. St.-Hil.) Hassl. = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.

Aspicarpa lanata (Chodat) Nied., nom. illeg. = **Aspicarpa schininii** W.R. Anderson

Aspicarpa linearifolia (A. St.-Hil.) Nied. = **Peregrina linearifolia** (A. St.-Hil.) W.R. Anderson

Aspicarpa pulchella (Griseb.) O'Donnell & Lourteig
Sin.: *Aspicarpa sericea* (A. St.-Hil.) Nied., nom. illeg.,
Camarea pulchella Griseb., *Cryptolappa pulchella*
(Griseb.) Kuntze, nom. superfl., *Cryptolappa pulchella*
(Griseb.) Kuntze var. *latifolia* Kuntze, nom. superfl.,
Janusia sericea (A. St.-Hil.) A. Juss.

Hábito: Hierba perenne.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, MI.

Países limítrofes: BR, PA, UR.

Ejemplar examinado: *Cristóbal et al.* 1883 (CTES, MICH).

Aspicarpa robusta (Chodat) Hassl., nom. superfl. =
Aspicarpa sericea Griseb.

Aspicarpa robusta (Chodat) Hassl. var. *fiebrigii*
(Chodat) Hassl. = **Aspicarpa schininii** W.R. Anderson

Aspicarpa robusta (Chodat) Hassl. var. *sericea* (Griseb.)
Hassl., nom. superfl. = **Aspicarpa sericea** Griseb.

Aspicarpa salicifolia (Chodat) Nied.

Sin.: *Camarea salicifolia* Chodat, *Cryptolappa salicifolia*
(Chodat) Kuntze, *Gaudichaudia salicifolia* (Chodat)
Chodat

Hábito: Hierba perenne.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Carnevali* 892 (CTES).

Aspicarpa schininii W.R. Anderson

Sin.: *Aspicarpa lanata* (Chodat) Nied., nom. illeg., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *fiebrigii* (Chodat) Hassl.,
Camarea lanata Chodat, *Cryptolappa lanata* (Chodat)
Kuntze, *Gaudichaudia lanata* (Chodat) Chodat,
Gaudichaudia robusta (Chodat) Chodat var. *fiebrigii*
Chodat

Hábito: Hierba perenne.

Status: Nativa.

Elevación: 1000-1500 m.

Prov.: JU.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Kiesling* 8355 (SI).

Aspicarpa sericea (A. St.-Hil.) Nied., nom. illeg. =
Aspicarpa pulchella (Griseb.) O'Donnell & Lourteig

Aspicarpa sericea Griseb.

Sin.: *Aspicarpa argentea* Nied., nom. superfl., *Aspicarpa argentea* Nied. var. *sericea* (Griseb.) Nied., nom. superfl., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl., nom. superfl., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *sericea* (Griseb.) Hassl., nom. superfl., *Camarea robusta* Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *sericea* (Griseb.) Chodat

Hábito: Hierba perenne.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1500 m.

Prov.: CH, CO, FO, JU, SA, SE, TU.
Países limítrofes: BO, PA.
Ejemplar examinado: *Lorentz e Hieronymus 309* (isotipos, F. NY, US).

Banisteria acanthocarpa A. Juss. = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria argentea (Kunth) Spreng. = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria argyrophaea (A. Juss.) C.V. Morton = **Heteropterys argyrophaea** A. Juss.

Banisteria bonariensis Hook. & Arn. = **Stigmaphyllon bonariense** (Hook. & Arn.) C. E. Anderson
Ref.: C. Anderson, 1997.

Banisteria caapi Griseb. = **Banisteriopsis caapi** (Griseb.) C.V. Morton
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria dumetorum (Griseb.) C.V. Morton = **Heteropterys dumetorum** (Griseb.) Nied.

Banisteria fagifolia DC. = **Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.

Banisteria hassleriana Chodat = **Banisteriopsis lutea** (Griseb.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria hispida Nied. = **Banisteriopsis lutea** (Griseb.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria inebrians (C.V. Morton) J.F. Macbr. = **Banisteriopsis caapi** (Griseb.) C.V. Morton
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria lutea Griseb. = **Banisteriopsis lutea** (Griseb.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria metallicolor A. Juss. = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria metallicolor A. Juss. var. *falcata* Nied. = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria metallicolor A. Juss. var. *sericea* Nied. = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria metallicolor A. Juss. var. *subrotunda* Nied. = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria muricata Cav. = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria nitrosiodora Griseb. = **Banisteriopsis lutea** (Griseb.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria quitensis Nied. = **Banisteriopsis caapi** (Griseb.) C.V. Morton
Ref.: Gates, 1982.

Banisteria tenuis Lindl. = **Heteropterys glabra** Hook. & Arn.

Banisteriopsis C.B. Rob.

Número de especies: 3

Banisteriopsis argentea (Kunth) C.B. Rob. = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteriopsis caapi (Griseb.) C.V. Morton
Sin.: *Banisteria caapi* Griseb., *Banisteria inebrians* (C.V. Morton) J.F. Macbr., *Banisteria quitensis* Nied., *Banisteriopsis inebrians* C.V. Morton, *Banisteriopsis quitensis* (Nied.) C.V. Morton

Hábito: Enredadera.

Status: Nativa.

Elevación: 500-1000 m.

Prov.: SA.

Países limítrofes: BR, BO.

Ejemplar examinado: *Legname y Cuezco 9690C* (LIL).

Banisteriopsis inebrians C.V. Morton = **Banisteriopsis caapi** (Griseb.) C.V. Morton
Ref.: Gates, 1982.

Banisteriopsis lutea (Griseb.) Cuatrec.

Sin.: *Banisteria hassleriana* Chodat, *Banisteria hispida* Nied., *Banisteria lutea* Griseb., *Banisteria nitrosiodora* Griseb., *Banisteriopsis nitrosiodora* (Griseb.) O'Donell & Lourteig, *Jubistylis mollis* Rusby

Ref.: Gates, 1982.

Hábito: Enredadera.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1500 m.

Prov.: JU, SA, TU.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Lorentz e Hieronymus 486* (isotipo de *Banisteria nitrosiodora*, NY).

Banisteriopsis metallicolor (A. Juss.) O'Donell & Lourteig = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteriopsis metallicolor (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *sericea* (Nied.) O'Donell & Lourteig = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteriopsis metallicolor (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *subrotunda* (Nied.) O'Donell & Lourteig = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.

Sin.: *Banisteria acanthocarpa* A. Juss., *Banisteria argentea* (Kunth) Spreng., *Banisteria metallicolor* A. Juss., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *falcata* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *sericea* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *subrotunda* Nied., *Banisteria muricata* Cav., *Banisteriopsis argentea* (Kunth) C.B. Rob., *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donnell & Lourteig, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donnell & Lourteig var. *sericea* (Nied.) O'Donnell & Lourteig, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donnell & Lourteig var. *subrotunda* (Nied.) O'Donnell & Lourteig, *Heteropterys argentea* Kunth, *Heteropterys pirayuensis* Morong

Ref.: Gates, 1982.

Hábito: Enredadera.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1000 m.

Prov.: COR, JU, MI, SA.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Schinini 14735* (CTES, MICH).

Banisteriopsis nitrosiodora (Griseb.) O'Donnell & Lourteig = **Banisteriopsis lutea** (Griseb.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.

Banisteriopsis quitensis (Nied.) C.V. Morton = **Banisteriopsis caapi** (Griseb.) C.V. Morton
Ref.: Gates, 1982.

Brittonella pilosa Rusby = **Mionandra camareoides** Griseb.

Bunchosia Kunth

Número de especies: 1

Bunchosia missionum Eskuche = **Bunchosia pallescens** Skottsb.

Bunchosia multiflora Hook. & Arn. = **Heladena multiflora** (Hook. & Arn.) Nied.

Bunchosia pallescens Skottsb.

Sin.: *Bunchosia missionum* Eskuche

Hábito: Árbol.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Tressens et al. 3065* (CTES, MICH).

Callaeum Small

Número de especies: 1

Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson

Sin.: *Hiraea platyptera* Griseb., *Hiraea psilophylla* A. Juss., *Mascagnia pachyptera* Rusby, *Mascagnia psilophylla* (A. Juss.) Griseb.

Ref.: Johnson, 1986.

Hábito: Enredadera o liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: BA, COR, ER, JU, MI, SA.

Países limítrofes: BO, BR, PA, UR.

Ejemplar examinado: *Krapovickas y Cristóbal 46701* (CTES, MICH).

[*Camarea ericoides* A. St.-Hil.]

Sin.: *Camarea linearifolia* A. St.-Hil.

Nota: Especie excluida de la flora argentina. Véase nota bajo *Peregrina linearifolia*.

Camarea juncea Griseb. = **Peregrina linearifolia** (A. St.-Hil.) W.R. Anderson

Camarea lanata Chodat = **Aspicarpa schininii** W.R. Anderson

Camarea linearifolia A. St.-Hil. = *Camarea ericoides* A. St.-Hil.

Camarea pulchella Griseb. = **Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donnell & Lourteig

Camarea robusta Chodat = **Aspicarpa sericea** Griseb.

Camarea salicifolia Chodat = **Aspicarpa salicifolia** (Chodat) Nied.

Clonodia biglandulosa Chodat = **Heteropterys argyrophaea** A. Juss.

Clonodia mollis Nied. = **Heteropterys mollis** (Nied.) Nied.

Clonodia tenuifolia Nied. = **Heteropterys sylvatica** A. Juss.

Cordobia Nied.

Número de especies: 1

Cordobia argentea (Griseb.) Nied.

Sin.: *Cryptolappa argentea* (Griseb.) Kuntze, *Gaudichaudia argentea* (Griseb.) Chodat, *Janusia argentea* (Griseb.) Griseb., *Mionandra argentea* Griseb., *Peixotoa cordobensis* Kuntze

Hábito: Enredadera.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1500 m.

Prov.: CA, CH, CO, FO, LR, SA, SE, SJ, SL, TU.

Países limítrofes: PA.

Ejemplar examinado: *Lorentz 11* (isotipo, K).

Cordobia fischeri (Hicken) Nied. = **Gallardoa fischeri** Hicken
Ref.: Nicora, 1944.

Cryptolappa argentea (Griseb.) Kuntze = **Cordobia argentea** (Griseb.) Nied.

Cryptolappa lanata (Chodat) Kuntze = **Aspicarpa schininii** W.R. Anderson

Cryptolappa pulchella (Griseb.) Kuntze, nom. superfl. = **Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donnell & Lourteig

Cryptolappa pulchella (Griseb.) Kuntze var. *latifolia* Kuntze, nom. superfl. = **Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donnell & Lourteig

Cryptolappa salicifolia (Chodat) Kuntze = **Aspicarpa salicifolia** (Chodat) Nied.

Dicella Griseb.

Número de especies: 1

[*Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb.]Sin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *holosericea* (A. Juss.) Nied., *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *subglabra* Nied., nom. superfl.Nota: Especie excluida de la flora argentina. Véase nota bajo *Dicella nucifera*.*Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *holosericea* (A. Juss.) Nied. = ***Dicella bracteosa*** (A. Juss.) Griseb.*Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *minutiflora* Chodat = ***Dicella nucifera*** Chodat
Ref.: Chase, 1981.*Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *subglabra* Nied., nom. superfl. = ***Dicella bracteosa*** (A. Juss.) Griseb.***Dicella nucifera*** ChodatSin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *minutiflora* Chodat, *Dicella nucifera* Chodat f. *lancifolia* Nied., *Dicella nucifera* Chodat f. *ovatifolia* Nied., *Dicella tricarpa* Nied.

Ref.: Chase, 1981.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Anderson 12381* (MICH).Nota: Niedenzu (1928: 677) citó para Argentina dos ejemplares de *D. bracteosa* (A. Juss.) Griseb., uno de ellos bajo *D. bracteosa* var. *holosericea* (A. Juss.) Nied. y el restante como *D. bracteosa* var. *subglabra* Nied., nom. superfl. Chase (1981) consideró a ambos nombres como sinónimos de *D. bracteosa* y no registró la presencia de este taxón en Argentina.*Dicella nucifera* Chodat f. *lancifolia* Nied. = ***Dicella nucifera*** Chodat

Ref.: Chase, 1981.

Dicella nucifera Chodat f. *ovatifolia* Nied. = ***Dicella nucifera*** Chodat

Ref.: Chase, 1981.

Dicella tricarpa Nied. = ***Dicella nucifera*** Chodat

Ref.: Chase, 1981.

Gallardoa Hicken

Número de especies: 1 especie endémica.

Gallardoa fischeri HickenSin.: *Cordobia fischeri* (Hicken) Nied.

Ref.: Nicora, 1944.

Hábito: Arbusto.

Status: Endémica.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: NE, RN, SL.

Ejemplar examinado: *Fischer 10* (holotipo, SI; isotipos, CM, GH, K, MO, NY, US).***Galphimia*** Cav.

Número de especies: 1

Galphimia australis Chodat = ***Galphimia brasiliensis*** (L.) A. Juss.*Galphimia australis* Chodat f. *angustifolia* Chodat = ***Galphimia brasiliensis*** (L.) A. Juss.***Galphimia brasiliensis*** (L.) A. Juss.Sin.: *Galphimia australis* Chodat, *Galphimia australis* Chodat f. *angustifolia* Chodat, *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. f. *angustifolia* (Chodat) Nied., *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. var. *pubescens* A. Juss., *Thryallis brasiliensis* L.

Hábito: Hierba perenne o subarbusto.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, ER, MI.

Países limítrofes: BO, BR, PA, UR.

Ejemplar examinado: *Tressens et al. 2478* (CTES, MICH).*Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. f. *angustifolia* (Chodat) Nied. = ***Galphimia brasiliensis*** (L.) A. Juss.*Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. var. *pubescens* A. Juss. = ***Galphimia brasiliensis*** (L.) A. Juss.*Gaudichaudia argentea* (Griseb.) Chodat = ***Cordobia argentea*** (Griseb.) Nied.*Gaudichaudia barbeyi* (Chodat) Chodat = ***Janusia guaranitica*** (A. St.-Hil.) A. Juss.*Gaudichaudia guaranitica* A. St.-Hil. = ***Janusia guaranitica*** (A. St.-Hil.) A. Juss.*Gaudichaudia lanata* (Chodat) Chodat = ***Aspicarpa schininii*** W.R. Anderson*Gaudichaudia linearifolia* A. St.-Hil. = ***Peregrina linearifolia*** (A. St.-Hil.) W.R. Anderson*Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat = ***Aspicarpa sericea*** Griseb.*Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *fiebrigii* Chodat = ***Aspicarpa schininii*** W.R. Anderson*Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *sericea* (Griseb.) Chodat = ***Aspicarpa sericea*** Griseb.*Gaudichaudia salicifolia* (Chodat) Chodat = ***Aspicarpa salicifolia*** (Chodat) Nied.***Heladena*** A. Juss.

Número de especies: 1

Heladena australis A. Juss., nom. superfl. = ***Heladena multiflora*** (Hook. & Arn.) Nied.

Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.Sin.: *Bunchosia multiflora* Hook. & Arn., *Heladena australis*A. Juss., nom. superfl., *Malpighiantha volubilis* Rojas

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Baird s.n.* (holotipo, K).**Heteropterys** Kunth, nom. cons.

Número de especies: 13, 1 especie endémica.

Heteropterys aceroides Griseb. = **Heteropterys intermedia** (A. Juss.) Griseb.**Heteropterys amplexicaulis** Morong

Hábito: Arbusto o liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Molfinio s.n.* (BA 41647).Nota: Niedenzu (1928) erróneamente aplicó el nombre *Heteropterys hypericifolia* para esta especie; criterio que posteriormente fue seguido por O'Donnell & Lourteig (1943) y Múlgura (1981b).*Heteropterys angustifolia* Griseb. = **Heteropterys glabra** Hook. & Arn.*Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *angustissima* Nied. = **Heteropterys glabra** Hook. & Arn.*Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *lanceolata* Nied. = **Heteropterys glabra** Hook. & Arn.*Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *sinuata* Nied. = **Heteropterys hypericifolia** A. Juss.*Heteropterys argentea* Kunth = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.**Heteropterys argyrophaea** A. Juss.Sin.: *Banisteria argyrophaea* (A. Juss.) C.V. Morton,*Clonodia biglandulosa* Chodat

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Tressens et al.* 2755 (CTES, MICH).*Heteropterys australis* A. Juss. = **Heteropterys syringifolia** Griseb.**Heteropterys bicolor** A. Juss.Sin.: *Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *elliptica* Nied.,*Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *lanceolata* Nied.,*Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *major* A. Juss.

Ref.: Múlgura, 1981b.

Hábito: Arbusto o liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: MI.

Países limítrofes: BR.

Ejemplar examinado: *Tressens et al.* 4683 (CTES).*Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *elliptica* Nied. = **Heteropterys bicolor** A. Juss.*Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *lanceolata* Nied. = **Heteropterys bicolor** A. Juss.*Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *major* A. Juss. = **Heteropterys bicolor** A. Juss.**Heteropterys cochleosperma** A. Juss.Sin.: *Heteropterys hassleriana* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. f. *acrobasis* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. f. *amblyobasis* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. var. *eglandulosa* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. var. *glandulifera* Nied., *Heteropterys trichanthera* A. Juss. var. *cuiabensis* Nied.

Hábito: Arbusto apoyante o liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1000 m.

Prov.: MI, SA.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Schulz* 5412 (LIL).*Heteropterys diversifolia* A. Juss. = **Heteropterys intermedia** (A. Juss.) Griseb.**Heteropterys dumetorum** (Griseb.) Nied.Sin.: *Banisteria dumetorum* (Griseb.) C.V. Morton,*Heteropterys paraguayensis* Nied., *Heteropterys praecox* Nied., *Mascagnia dumetorum* Griseb.

Hábito: Arbusto apoyante.

Status: Nativa.

Elevación: 0-2500 m.

Prov.: CA, JU, LR, SA, SE, TU.

Países limítrofes: BO, BR, UR.

Ejemplar examinado: *Ferrucci et al.* 813 (CTES, MICH).Nota: O'Donnell & Lourteig (1943) erróneamente aplicaron el nombre *Heteropterys umbellata* A. Juss. para esta especie; criterio que posteriormente fue seguido por Múlgura (1981b, 1994b). *H. umbellata* es una especie nativa de Minas Gerais y São Paulo, Brasil.**Heteropterys glabra** Hook. & Arn.Sin.: *Banisteria tenuis* Lindl., *Heteropterys angustifolia* Griseb., *Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *angustissima* Nied., *Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *lanceolata* Nied., *Heteropterys pseudoangustifolia* Chodat

Hábito: Arbusto.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: CH, COR, ER, FO, MI, SF.

Países limítrofes: BR, PA, UR.

Ejemplar examinado: *Tweedie s.n.* (holotipo, K).Nota: *H. glabra* se halla cultivada, además de las provincias donde es nativa, también en Buenos Aires y Córdoba.*Heteropterys hassleriana* Nied. = **Heteropterys cochleosperma** A. Juss.*Heteropterys hassleriana* Nied. f. *acrobasis* Nied. = **Heteropterys cochleosperma** A. Juss.

Heteropterys hassleriana Nied. f. *amblyobasis* Nied. =
Heteropterys cochleosperma A. Juss.

Heteropterys hassleriana Nied. var. *eglandulosa* Nied. =
Heteropterys cochleosperma A. Juss.

Heteropterys hassleriana Nied. var. *glandulifera* Nied. =
Heteropterys cochleosperma A. Juss.

Heteropterys hiraoides A. Juss., nom. superfl. =
Heteropterys intermedia (A. Juss.) Griseb.

Heteropterys hypericifolia A. Juss.

Sin.: *Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *sinuata* Nied.

Hábito: Arbusto apoyante.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: CH, CO, COR, ER, FO, SA, SE, SF.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Schinini y Ahumada 15971* (CTES, MICH).

Nota: O'Donnell & Lourteig (1943) y Múlgura (1994b) usaron el nombre *H. angustifolia* f. *lanceolata* y *H. glabra* respectivamente para esta especie. Véase nota bajo *H. syringifolia*.

Heteropterys intermedia (A. Juss.) Griseb.

Sin.: *Heteropterys aceroides* Griseb., *Heteropterys diversifolia* A. Juss., *Heteropterys hiraoides* A. Juss., nom. superfl., *Heteropterys laurifolia* Gardner, nom. illeg., *Heteropterys venosa* Griseb., *Hiraea floribunda* A. Juss., *Hiraea intermedia* A. Juss.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1000 m.

Prov.: COR, MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Vanni et al. 3124* (CTES, MICH).

Heteropterys laurifolia Gardner, nom. illeg. =
Heteropterys intermedia (A. Juss.) Griseb.

Heteropterys mollis (Nied.) Nied.

Sin.: *Clonodia mollis* Nied.

Hábito: Arbusto apoyante.

Status: Nativa.

Elevación: 1000-1500 m.

Prov.: JU.

Países limítrofes: BO.

Ejemplar examinado: *Villa Carenzo y Legname 398* (LIL).

Nota: Especie afín a *H. sylvatica* A. Juss., de la cual posiblemente no se distingue.

Heteropterys mulgurae W.R. Anderson

Ref.: Anderson, 1998.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: MI.

Países limítrofes: BR.

Ejemplar examinado: *Schwarz 3218* (holotipo, LIL).

Nota: Múlgura (1981b) citó a esta especie bajo el nombre *H. nitida* (Lam.) DC., siendo esta última nativa del este del Brasil.

[*Heteropterys nitida* (Lam.) DC.]

Nota: Especie excluida de la flora argentina. Véase nota bajo *Heteropterys mulgurae*.

Heteropterys paraguayensis Nied. = ***Heteropterys dumetorum*** (Griseb.) Nied.

Heteropterys pirayuensis Morong = ***Banisteriopsis muricata*** (Cav.) Cuatrec.

Ref.: Gates, 1982.

Heteropterys praecox Nied. = ***Heteropterys dumetorum*** (Griseb.) Nied.

Heteropterys pseudoangustifolia Chodat = ***Heteropterys glabra*** Hook. & Arn.

Heteropterys schulziana W.R. Anderson

Ref.: Anderson, 1998.

Hábito: Arbusto.

Status: Endémica.

Elevación: 500-1000 m.

Prov.: SA.

Ejemplar examinado: *Schulz 5090* (holotipo, CTES; isotipo, LIL).

Heteropterys sylvatica A. Juss.

Sin.: *Clonodia tenuifolia* Nied., *Heteropterys tenuifolia* (Nied.) Nied.

Hábito: Arbusto apoyante.

Status: Nativa.

Elevación: 500-1000 m.

Prov.: JU, SA.

Países limítrofes: BO, BR.

Ejemplar examinado: *Legname y Cuezco 9122C* (CTES).

Heteropterys syringifolia Griseb.

Sin.: *Heteropterys australis* A. Juss.

Hábito: Arbusto apoyante.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, FO, MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Krapovickas y Cristóbal 15622* (CTES).

Nota: Es posible que esta especie se hibridice naturalmente con *H. hypericifolia*. Los ejemplares *Krapovickas y Cristóbal 28889* de San Javier, Misiones y *Schinini y Cristóbal 13632* de Perichón, Corrientes, presentan caracteres morfológicos intermedios entre ambos taxones.

Heteropterys tenuifolia (Nied.) Nied. = ***Heteropterys sylvatica*** A. Juss.

Heteropterys trichanthera A. Juss. var. *cuiabensis* Nied. = ***Heteropterys cochleosperma*** A. Juss.

[*Heteropterys umbellata* A. Juss.]

Nota: Especie excluida de la flora argentina. Véase nota bajo *Heteropterys dumetorum*.

Heteropterys venosa Griseb. = ***Heteropterys intermedia*** (A. Juss.) Griseb.

Hiraea Jacq.

Número de especies: 1

Hiraea ambigua A. Juss. = **Tetrapterys ambigua** (A. Juss.) Nied.*Hiraea anisopetala* A. Juss. = **Mascagnia anisopetala** (A. Juss.) Griseb.*Hiraea bahiensis* Moric. = **Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.*Hiraea bahiensis* Moric. var. *paraguariensis* Nied. = **Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.*Hiraea brevifolia* (Griseb.) Niederl. = **Mascagnia brevifolia** Griseb.*Hiraea divaricata* Kunth = **Mascagnia divaricata** (Kunth) Nied.*Hiraea elegans* A. Juss. = **Mascagnia divaricata** (Kunth) Nied.**Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.Sin.: *Banisteria fagifolia* DC., *Hiraea bahiensis* Moric., *Hiraea bahiensis* Moric. var. *paraguariensis* Nied., *Hiraea salzmänniana* A. Juss., *Hiraea salzmänniana* A. Juss. var. *glandulifera* Chodat

Hábito: Arbusto o liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: CH, COR, MI.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Vanni et al. 2953* (CTES, MICH).*Hiraea floribunda* A. Juss. = **Heteropterys intermedia** (A. Juss.) Griseb.*Hiraea intermedia* A. Juss. = **Heteropterys intermedia** (A. Juss.) Griseb.*Hiraea macrocarpa* Chodat = **Mascagnia anisopetala** (A. Juss.) Griseb.*Hiraea platyptera* Griseb. = **Callaeum psilophyllum** (A. Juss.) D.M. Johnson
Ref.: Johnson, 1986.*Hiraea psilophylla* A. Juss. = **Callaeum psilophyllum** (A. Juss.) D.M. Johnson
Ref.: Johnson, 1986.*Hiraea pulcherrima* Morong = **Mascagnia divaricata** (Kunth) Nied.*Hiraea rigida* A. Juss. = **Mascagnia rigida** (A. Juss.) Griseb.*Hiraea salzmänniana* A. Juss. = **Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.*Hiraea salzmänniana* A. Juss. var. *glandulifera* Chodat = **Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.*Hiraea sepium* A. Juss. = **Mascagnia sepium** (A. Juss.) Griseb.*Hiraea sepium* A. Juss. var. *nitens* S. Moore = **Mascagnia sepium** (A. Juss.) Griseb.*Hiraea sericea* A. Juss. = **Tetrapterys sericea** (A. Juss.) A. Juss.**Janusia** A. Juss.

Número de especies: 1

Janusia argentea (Griseb.) Griseb. = **Cordobia argentea** (Griseb.) Nied.*Janusia barbeyi* Chodat = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.**Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.Sin.: *Aspicarpa guaranitica* (A. St.-Hil.) Hassl.,*Gaudichaudia barbeyi* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia guaranitica* A. St.-Hil., *Janusia barbeyi* Chodat,*Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *cordifolia*Nied., nom. superfl., *Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.)A. Juss. f. *glabrata* Nied., *Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.)A. Juss. var. *barbeyi* (Chodat) Kuntze

Hábito: Enredadera.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1500 m.

Prov.: CA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, LR, MI, SA, SE, SF, SL, TU.

Países limítrofes: BO, BR, PA, UR.

Ejemplar examinado: *Cristóbal et al. 1902* (CTES, MICH).*Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *cordifolia* Nied., nom. superfl. = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.*Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *glabrata* Nied. = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.*Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. var. *barbeyi* (Chodat) Kuntze = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.*Janusia linearifolia* (A. St.-Hil.) A. Juss. = **Peregrina linearifolia** (A. St.-Hil.) W.R. Anderson*Janusia sericea* (A. St.-Hil.) A. Juss. = **Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donnell & Lourteig*Jubistylis mollis* Rusby = **Banisteriopsis lutea** (Griseb.) Cuatrec.
Ref.: Gates, 1982.*Malpighiantha volubilis* Rojas = **Heladena multiflora** (Hook. & Arn.) Nied.**Mascagnia** (Bertero ex DC.) Colla

Número de especies: 5

Mascagnia ambigua (A. Juss.) Griseb. = **Tetrapterys ambigua** (A. Juss.) Nied.*Mascagnia ambigua* (A. Juss.) Griseb. f. *paraguayensis* (Nied.) Nied. = **Tetrapterys ambigua** (A. Juss.) Nied.

Mascagnia anisopetala (A. Juss.) Griseb.

Sin.: *Hiraea anisopetala* A. Juss., *Hiraea macrocarpa* Chodat

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, MI.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Tressens et al. 4015* (CTES, MICH).

Mascagnia brevifolia Griseb.

Sin.: *Hiraea brevifolia* (Griseb.) Niederl., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *malmeana* (Skottsb.) Nied., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *paniculata* Nied., *Mascagnia laurifolia* Nied., *Mascagnia malmeana* Skottsb.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1000 m.

Prov.: CH, FO, JU, SA.

Países limítrofes: BO, PA.

Ejemplar examinado: *Lorentz y Hieronymus s.n.* (isosintipos, G, K).

Mascagnia brevifolia Griseb. var. *malmeana* (Skottsb.)

Nied. = **Mascagnia brevifolia** Griseb.

Mascagnia brevifolia Griseb. var. *paniculata* Nied. =

Mascagnia brevifolia Griseb.

Mascagnia coriacea Griseb. = **Mascagnia rigida** (A.

Juss.) Griseb.

Mascagnia divaricata (Kunth) Nied.

Sin.: *Hiraea divaricata* Kunth, *Hiraea elegans* A. Juss., *Hiraea pulcherrima* Morong, *Mascagnia elegans* (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia iximensis* Rusby, *Mascagnia pulcherrima* (Morong) Skottsb.

Ref.: W. Anderson, 1993.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: CH, COR, FO, MI.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Vanni et al. 2888* (CTES, MICH).

Nota: Niedenzu (1928), O'Donnell & Lourteig (1943) y Múlgura (1994b) aplicaron erróneamente el nombre *M. ovatifolia* (Kunth) Griseb. para esta especie. *M. ovatifolia* habita en Trinidad, Venezuela, Colombia y Panamá; para una mayor discusión véase W. Anderson (1993).

Mascagnia dumetorum Griseb. = **Heteropterys**

dumetorum (Griseb.) Nied.

Mascagnia elegans (A. Juss.) Griseb. = **Mascagnia**

divaricata (Kunth) Nied.

Mascagnia exotropa Griseb. = **Mascagnia rigida** (A.

Juss.) Griseb.

Mascagnia iximensis Rusby = **Mascagnia divaricata**

(Kunth) Nied.

Mascagnia laurifolia Nied. = **Mascagnia brevifolia**

Griseb.

Mascagnia malmeana Skottsb. = **Mascagnia brevifolia**

Griseb.

[**Mascagnia ovatifolia** (Kunth) Griseb.]

Nota: Especie excluida de la flora argentina. Véase nota bajo *Mascagnia divaricata*.

Mascagnia pachyptera Rusby = **Callaeum psilophyllum**

(A. Juss.) D.M. Johnson

Ref.: Johnson, 1986.

Mascagnia paraguayensis Nied. = **Tetrapteryx ambigua**

(A. Juss.) Nied.

Mascagnia psilophylla (A. Juss.) Griseb. = **Callaeum**

psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson

Ref.: Johnson, 1986.

Mascagnia pulcherrima (Morong) Skottsb. = **Mascagnia**

divaricata (Kunth) Nied.

Mascagnia rigida (A. Juss.) Griseb.

Sin.: *Hiraea rigida* A. Juss., *Mascagnia coriacea* Griseb., *Mascagnia exotropa* Griseb., *Mascagnia rigida* (A. Juss.) Griseb. subsp. *coriacea* (Griseb.) Nied.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: MI.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Vanni et al. 2903* (CTES, MICH).

Mascagnia rigida (A. Juss.) Griseb. subsp. *coriacea*

(Griseb.) Nied. = **Mascagnia rigida** (A. Juss.) Griseb.

Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb.

Sin.: *Hiraea sepium* A. Juss., *Hiraea sepium* A. Juss. var. *nitens* S. Moore, *Mascagnia sepium* (A. Juss.) Griseb. subsp. *acuminata* Nied., nom. superfl., *Mascagnia sepium* (A. Juss.) Griseb. var. *mediterranea* Nied., *Mascagnia sepium* (A. Juss.) Griseb. var. *pubens* Griseb.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: CH, COR, FO, MI.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Quarín 3432* (CTES, MICH).

Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb. subsp. *acuminata*

Nied., nom. superfl. = **Mascagnia sepium** (A. Juss.) Griseb.

Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb. var. *mediterranea*

Nied. = **Mascagnia sepium** (A. Juss.) Griseb.

Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb. var. *pubens* Griseb.

= **Mascagnia sepium** (A. Juss.) Griseb.

Mionandra Griseb.

Número de especies: 1

Mionandra argentea Griseb. = **Cordobia argentea**

(Griseb.) Nied.

Mionandra camareoides Griseb.

Sin.: *Brittonella pilosa* Rusby, *Mionandra camareoides* Griseb. f. *prostrata* Nied.

Hábito: Hierba perenne.

Status: Nativa.

Elevación: 0-2500 m.

Prov.: CA, CO, JU, LP, SA, SE, SL, TU.

Países limítrofes: BO.

Ejemplar examinado: *Anderson 13585* (MICH).

Mionandra camareoides Griseb. f. *prostrata* Nied. =

Mionandra camareoides Griseb.

Peixotoa cordobensis Kuntze = **Cordobia argentea** (Griseb.) Nied.

Peregrina W.R. Anderson

Número de especies: 1

Peregrina linearifolia (A. St.-Hil.) W.R. Anderson

Sin.: *Aspicarpa linearifolia* (A. St.-Hil.) Nied., *Camarea juncea* Griseb., *Gaudichaudia linearifolia* A. St.-Hil., *Janusia linearifolia* (A. St.-Hil.) A. Juss.

Hábito: Hierba perenne.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Krapovickas y Cristóbal 46451* (CTES, MICH).

Nota: O'Donell & Lourteig (1943) incluyeron erróneamente a *Camarea linearifolia* A. St.-Hil. como sinónimo de *Aspicarpa linearifolia* (A. St.-Hil.) Nied. Sin embargo, ambos taxones son bien distintos y están basados en tipos diferentes. *Camarea linearifolia* se considera sinónimo de *C. ericoides* A. St.-Hil., especie que no habita en Argentina.

Ptilochaeta Turcz., nom. cons.

Número de especies: 1

Ptilochaeta nudipes Griseb.

Hábito: Arbusto.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1000 m.

Prov.: JU, SA.

Países limítrofes: BO, PA.

Ejemplar examinado: *Rodríguez 1057* (LP).

Stigmaphyllon A. Juss.

Número de especies: 3

Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.) C. E.

Anderson

Sin.: *Banisteria bonariensis* Hook. & Arn., *Stigmaphyllon heterophyllum* Hook., *Stigmaphyllon littorale* A. Juss.

Ref.: C. Anderson, 1997.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: BA, CH, COR, DF, ER, MI, SF.

Países limítrofes: BR, PA, UR.

Ejemplar examinado: *Tweedie s.n.* (lectotipo, K).

Nota: Niedenzu (1928: 511) mencionó la presencia de *Stigmaphyllon megacarpum* (Vell.) Griseb. en Misiones. Posteriormente, C. Anderson (1997) citó los ejemplares mencionados por Niedenzu de Misiones bajo *S. bonariense* y excluyó el nombre *S. megacarpum* por ser de aplicación dudosa (para una mayor discusión véase C. Anderson, 1997: 265).

Stigmaphyllon calcaratum N.E. Br.

Sin.: *Stigmaphyllon hasslerianum* Nied.

Ref.: C. Anderson, 1997.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: CH, COR, ER, FO, SF.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Schinini 20026* (CTES, MICH).

Stigmaphyllon hasslerianum Nied. = **Stigmaphyllon calcaratum** N.E. Br.

Ref.: C. Anderson, 1997.

Stigmaphyllon heterophyllum Hook. = **Stigmaphyllon bonariense** (Hook. & Arn.) C. E. Anderson

Ref.: C. Anderson, 1997.

Stigmaphyllon jatrophifolium A. Juss.

Ref.: C. Anderson, 1997.

Hábito: Liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, ER, MI.

Países limítrofes: BR, PA, UR.

Ejemplar examinado: *Krapovickas y Cristóbal 28877* (CTES, MICH, MO).

Stigmaphyllon littorale A. Juss. = **Stigmaphyllon bonariense** (Hook. & Arn.) C. E. Anderson

Ref.: C. Anderson, 1997.

[*Stigmaphyllon megacarpum* (Vell.) Griseb.]

Nota: Taxón dudoso. Véase nota bajo *Stigmaphyllon bonariense*.

Tetrapterys Cav., nom. cons.

Número de especies: 3

Tetrapterys ambigua (A. Juss.) Nied.

Sin.: *Hiraea ambigua* A. Juss., *Mascagnia ambigua* (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia ambigua* (A. Juss.) Griseb. f. *paraguayensis* (Nied.) Nied., *Mascagnia paraguayensis* Nied., *Tetrapterys ambigua* (A. Juss.) Nied. var. *paraguayensis* (Nied.) Nied., *Tetrapterys paraguayensis* Nied., *Tetrapterys pilifera* S. Moore

Hábito: Subarbusto.

Status: Nativa.

Elevación: 0-1000 m.

Prov.: JU, MI.

Países limítrofes: BO, BR, PA.

Ejemplar examinado: *Cabrera et al. 31963* (MICH, SI).

Tetrapterys ambigua (A. Juss.) Nied. var. *paraguayensis* (Nied.) Nied. = **Tetrapterys ambigua** (A. Juss.) Nied.

Tetrapteryx chalcophylla A. Juss. = ***Tetrapteryx sericea***
(A. Juss.) A. Juss.

Tetrapteryx cinerea Griseb. = ***Tetrapteryx mollis*** Griseb.

Tetrapteryx glandulosa Griseb. = ***Tetrapteryx sericea***
(A. Juss.) A. Juss.

Tetrapteryx ligustrifolia Nied., nom. illeg. = ***Tetrapteryx sericea*** (A. Juss.) A. Juss.

Tetrapteryx mollis Griseb.

Sin.: *Tetrapteryx cinerea* Griseb.

Hábito: Arbusto o liana.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: MI.

Países limítrofes: BR.

Ejemplar examinado: *Vanni et al. 580* (CTES, MICH).

Nota: Especie afín a *T. phlomoides* (Spreng.) Nied.,
posiblemente no distinta de esta.

[*Tetrapteryx multiglandulosa* A. Juss.]

Nota: Cita dudosa para la flora argentina. Véase nota bajo
Tetrapteryx sericea.

Tetrapteryx paraguariensis Nied. = ***Tetrapteryx ambigua***
(A. Juss.) Nied.

Tetrapteryx pilifera S. Moore = ***Tetrapteryx ambigua*** (A.
Juss.) Nied.

Tetrapteryx sericea (A. Juss.) A. Juss.

Sin.: *Hiraea sericea* A. Juss., *Tetrapteryx chalcophylla* A.

Juss., *Tetrapteryx glandulosa* Griseb., *Tetrapteryx*
ligustrifolia Nied., nom. illeg.

Hábito: Arbusto o enredadera.

Status: Nativa.

Elevación: 0-500 m.

Prov.: COR, MI.

Países limítrofes: BR, PA.

Ejemplar examinado: *Krapovickas et al. 24012* (CTES,
MICH).

Nota: Niedenzu (1928: 191) citó bajo el nombre *Tetrapteryx*
multiglandulosa A. Juss. el ejemplar Niederlein, 5 II
1883, Isla de Jupiter, Misiones. El ejemplar no ha
podido ser hallado pero probablemente se refiera a *T.*
sericea.

Thryallis brasiliensis L. = ***Galphimia brasiliensis*** (L.) A.
Juss.

[*Thryallis latifolia* Mart. var. *ovatifolia* (Nied.) Nied.]

Nota: Cita dudosa para la flora argentina. Niedenzu (1928:
576) citó bajo este nombre un ejemplar de Bacle
supuestamente de Argentina, sin otra localidad. C.
Anderson (1995) consideró el nombre de Niedenzu
sinónimo de *T. brachystachys* Lindl. Esta autora no
encontró ningún ejemplar de *Thryallis* de Argentina. El
ejemplar de Bacle posiblemente proseda de Santa
Catarina, Brasil.

Tricomaria Hook. & Arn.

Número de especies: 1 especie endémica.

Tricomaria usillo Hook. & Arn.

Hábito: Arbusto.

Status: Endémica.

Elevación: 500-1500 m.

Prov.: CA, CO, LR, ME, SJ, SL, TU.

Ejemplar examinado: *Gillies s.n.* (holotipo, K).