

MALPIGHIACEAE

Revisada por: William R. Anderson & Paul E. Berry, 2002

Referencias principales: Anderson 1990, 1997a, b, c, 2001a, b; Anderson & Davis 2001; Gates 1982; Johnson 1986; Troost 1984

Herbarios revisados: NY, VEN

31 géneros, 192 especies, incluyendo 35 especies (+ 1 variedad) endémicas

ADELPHIA W.R.Anderson

Adelphia hiraee (Gaertn.) W.R.Anderson, Novon 16(2): 171. 2006.
Triopteris hiraee Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 169. 1790. Liana. 50–600 m AR CA FA LA YA ZU

ALICIA W.R.Anderson

Alicia macrodisca (Triana & Planch.) W.R. Anderson, Novon 16(2): 176. 2006.
Hiraea macrodisca Triana & Planch., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 4, 18: 326. 1862. Liana. 100–500 m AM AP BA BO

BANISTERIOPSIS C.B.Rob.

Banisteriopsis acapulcensis (Rose) Small, N. Amer. Fl. 25: 132. 1910.
Heteropteris acapulcensis Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5: 139. 1897.
Banisteriopsis acapulcensis var. *llanensis* B.Gates, Fl. Neotrop. Monogr. 30: 46. 1982. Arbusto o arbusto trepador. Endémica. 0–200 m CO GU

Banisteriopsis alternifolia (Steyerm.) B. Gates, Fl. Neotrop. Monogr. 30: 142. 1982.

Banisteria alternifolia Steyerm., Fieldiana, Bot. 28: 280. 1952. Liana. 1200–1300 m MO

Banisteriopsis caapi (Griseb.) C.V.Morton, J. Wash. Acad. Sci. 21: 486. 1931.
Banisteria caapi Griseb. in Mart., Fl. Bras. 12(1): 43. 1858. Liana. 10–200 m AM

Banisteriopsis cornifolia (Kunth) C.B.Rob. in Small, N. Amer. Fl. 25: 132. 1910.
Heteropteris cornifolia Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 165. 1821 [1822].
Banisteriopsis cornifolia var. *cornifolia*. Arbusto. 100–1500 m LA
Banisteriopsis cornifolia var. *maracaybensis* (A.Juss.) W.R.Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 20: 15. 1995.
Banisteria maracaybensis A.Juss., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 285. 1840. Arbusto trepador. 0–1600 m AN AR CA DF FA GU LA ME TR ZU

Banisteriopsis cristata (Griseb.) Cuatrec., Ciencia (México) 23: 141. 1964.
Banisteria cristata Griseb., Linnaea 22: 16. 1849. Liana o arbusto. 35–1000 m AN AR BO CA DF FA GU LA YA ZU

Banisteriopsis grandifolia (Nied.) B.Gates, Fl. Neotrop. Monogr. 30: 141. 1982.
Banisteria elegans var. *grandifolia* Nied. in Engl., Pflanzenr. IV, 141: 412. 1928. Liana. 1000–2000 m AR DF FA MI YA

Banisteriopsis krukoffii B.Gates, Fl. Neotrop. Monogr. 30: 200. 1982. Liana. 100–600 m AM BO

Banisteriopsis lucida (Rich.) Small, N. Amer. Fl. 25: 133. 1910.

Banisteria lucida Rich., Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 109. 1792. Liana. 100–1400 m AM AP AR BO DA DF FA LA SU TA ZU

Banisteriopsis lyrata B.Gates, Brittonia 31: 108. 1979. Liana. 100–200 m BO DA

Banisteriopsis maguirei B.Gates, Brittonia 31: 108. 1979. Liana. Endémica. 1000–1900 m AM BO

Banisteriopsis martiniana (A.Juss.) Cuatrec., Webbia 13: 498. 1958.

Banisteria martiniana A.Juss., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 284. 1840.

Banisteriopsis martiniana var. *martiniana*. Liana. 0–2000 m AR BO DA SU

Banisteriopsis martiniana var. *subnervia* Cuatrec., Webbia 13: 501. 1958. Liana. 100–300 m AM

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec., Webbia 13: 503. 1958.

Banisteria muricata Cav., Diss. 9: 423. 1790. Liana. 100–1200 m AN AR BA BO CA CO DF FA GU LA MI MO PO SU TA TR YA ZU

Banisteriopsis nutans (Nied.) B.Gates, Fl. Neotrop. Monogr. 30: 179. 1982.

Banisteria nutans Nied., Banisteria 2: 15. 1901. Liana. 1600 m LA

Banisteriopsis platyptera (Griseb.) Cuatrec., Webbia 13: 494. 1958.

Banisteria platyptera Griseb., Linnaea 22: 17. 1849. Liana. 1750–1800 m DF

Banisteriopsis pubipetala (A.Juss.) Cuatrec., Ciencia (México) 23: 142. 1964.

Banisteria pubipetala A.Juss. in A.St.-Hil., Fl. Bras. Merid. 3: 41. 1832 [1833]. Liana o arbusto trepador. 850–1000 m AP PO TA

Banisteriopsis pulcherrima (Sandwith) B.Gates, Brittonia 31: 109. 1979.

Banisteriopsis elegans var. *pulcherrima* Sandwith, J. Arnold Arbor. 24: 223. 1943. Liana o arbusto. 300–2200 m BO

Banisteriopsis wurdackii B.Gates, Brittonia 31: 109. 1979. Liana. 50–400 m BO ME

BLEPHARANDRA Griseb.

Blepharandra angustifolia (Kunth) W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 55. 1981.

Byrsonima angustifolia Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 153. 1821 [1822]. Arbusto o árbol. 100–400 m AM

Blepharandra fimbriata MacBryde, Canad. J. Bot. 52: 2437. 1974. Arbusto. 600–1800 m BO

Blepharandra heteropetala W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard.

- 32: 57. 1981. Arbusto o árbol. 50–400 m AM
- Blepharandra hypoleuca* (Benth.) Griseb., *Linnaea* 22: 7. 1849.
- Coleostachys hypoleuca* Benth., *London J. Bot.* 7: 125. 1848. Arbusto o árbol. 400–2600 m AM BO
- BUNCHOSIA** Kunth
- Bunchosia argentea* (Jacq.) DC., *Prodr.* 1: 582. 1824.
- Malpighia argentea* Jacq., *Fragm. Bot.* 57. 1800–1809. Arbusto o árbol. 100–1800 m AN AR BA BO DF FA LA ME MI MO PO TA YA
- Bunchosia armeniaca* (Cav.) DC., *Prodr.* 1: 582. 1824.
- Malpighia armeniaca* Cav., *Diss.* 8: 410. 1789. Arbol. 50–300 m BO DA
- Bunchosia cestrifolia* Cuatrec., *Webbia* 13: 575. 1958. Arbol. 500–1100 m FA LA
- Bunchosia decussiflora* W.R.Anderson, *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 279. 1981. Arbusto o árbol. 50–1300 m AM
- Bunchosia diphylla* (Jacq.) Cuatrec. & Croat, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 67: 865. 1980 [1981].
- Malpighia diphylla* Jacq., *Enum. Syst. Pl.* 21. 1760. Arbusto. 50–1000 m FA LA YA ZU
- Bunchosia glandulifera* (Jacq.) Kunth in Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 5: 154. 1821 [1822].
- Malpighia glandulifera* Jacq., *Collectanea* 4: 207. 1790 [1791]. Arbusto o árbol. 50–100 m AM AN AR BA CA CO DF GU MI PO
- Bunchosia mollis* Benth., *London J. Bot.* 7: 127. 1848. Arbusto o árbol. 0–300 m AN AR BA BO GU MI MO NE SU
- Bunchosia odorata* (Jacq.) DC., *Prodr.* 1: 582. 1824.
- Malpighia odorata* Jacq., *Enum. Syst. Pl.* 21. 1760. Arbusto o árbol. 50–1160 m FA LA ME MO SU TA YA ZU
- Bunchosia petraea* W.R.Anderson, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 21: 40. 1997. Arbusto. Endémica. 50–100 m AM
- Bunchosia postuma* Nied., *Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceum Hosianum Braunsberg* 8: 63. 1926. Arbusto. 15–600 m DF FA MI
- Bunchosia thaumatococcus* W.R.Anderson, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 21: 43. 1997. Arbusto. Endémica. 200–600 m DF
- Bunchosia tuberculata* (Jacq.) DC., *Prodr.* 1: 581. 1824.
- Malpighia tuberculata* Jacq., *Pl. Hort. Schoenbr.* 1: 54. 1797. Arbol o arbusto. 900 m DF
- BURDACHIA** A.Juss.
- Burdachia prismatocarpa* A.Juss., *Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.* 2, 13: 330. 1840.
- Burdachia prismatocarpa* var. *prismatocarpa*. Arbusto o árbol. 50–200 m AM AP BO
- Burdachia sphaerocarpa* A.Juss., *Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.* 2, 13: 330. 1840. Arbusto o árbol. 50–100 m AM
- BYRSONIMA** Kunth
- Byrsonima aerugo* Sagot, *Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.* 6, 12: 178. 1881. Arbol. 200–1300 m BO DA
- Byrsonima arthropoda* A.Juss., *Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.* 2, 13: 335. 1840. Arbol. 90 m ZU
- Byrsonima baccae* W.R.Anderson, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 20: 19. 1995. Arbusto o árbol. Endémica. 1700–2200 m AM
- Byrsonima basiliana* W.R.Anderson, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 21: 45. 1997. Arbusto o árbol. Endémica. 100–200 m AM
- Byrsonima bronweniana* W.R.Anderson, *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 107. 1981. Arbusto o árbol. 50–200 m AM
- Byrsonima carraoana* Steyerl., *Fiediana*, *Bot.* 28: 287. 1952. Arbusto o árbol. 1200–2500 m BO
- Byrsonima chalcophylla* Nied., *Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceums Hosianum Braunsberg* 5: 57. 1914. Arbol o arbusto. 1900–2400 m BO
- Byrsonima chrysophylla* Kunth in Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 5: 150. 1821 [1822]. Arbusto o árbol. 100–900 m AM BO
- Byrsonima coccolobifolia* Kunth in Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 5: 148. 1821 [1822]. Arbusto o árbol. 50–600 m AN AR BA BO CA CO DA FA GU MO SU ZU
- Byrsonima concinna* Benth., *London J. Bot.* 7: 122. 1848. Arbusto o árbol. 100–2100 m AM BO
- Byrsonima coniophylla* A.Juss., *Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.* 2, 13: 335. 1840. Arbusto o árbol. 100–200 m AM
- Byrsonima cowanii* W.R.Anderson, *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 123. 1981. Arbol. 100–600 m AM
- Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth in Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 5: 149. 1821 [1822].
- Malpighia crassifolia* L., *Sp. Pl.* 426. 1753. Arbusto o árbol. 0–2000 m AM AN AP AR BA BO CA CO DA DF FA GU LA ME MI MO NE PO SU TA TR YA ZU
- Byrsonima crispa* A.Juss., *Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.* 2, 13: 335. 1840. Arbol. 50–600 m AM BO
- Byrsonima cuprea* Griseb. in Mart., *Fl. Bras.* 12(1): 19. 1858. Arbusto o árbol. 90–200 m AM
- Byrsonima dubia* W.R.Anderson, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 17: 42. 1990. Arbusto o árbol. 1400–1500 m BO
- Byrsonima duidana* W.R.Anderson, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 19: 361. 1993. Arbusto o árbol. Endémica. 50–2300 m AM
- Byrsonima fernandezii* Cuatrec., *Webbia* 13: 612. 1958. Arbol. 100–800 m AM
- Byrsonima flexipes* W.R.Anderson, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 23: 69. 2001. Arbol. 100 m AM
- Byrsonima frondosa* A.Juss., *Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.* 2, 13: 334. 1840. Arbol. 100 m AM
- Byrsonima huberi* W.R.Anderson, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 21: 48. 1997. Arbol. Endémica. 2000 m AM
- Byrsonima hypoleuca* Turcz., *Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou* 31: 392. 1858. Arbol. 500–1700 m AR BA DF LA ME MI TA TR YA ZU
- Byrsonima japurensis* A.Juss., *Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.* 2, 13: 335. 1840. Arbusto o árbol. 50–300 m AM AN AP BO GU
- Byrsonima kariniana* W.R.Anderson, *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 127. 1981. Arbusto. Aparentemente endémica. 1400–2000 m AM
- Byrsonima karstenii* W.R.Anderson, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 17: 43. 1990. Arbol. 1200–2000 m AR DF MI
- Byrsonima laevis* Nied., *Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceums Hosianum Braunsberg* 1: 34. 1901. Arbusto o árbol. 100–1500 m AM
- Byrsonima leucophlebia* Griseb. in Mart., *Fl. Bras.* 12(1): 15. 1858. Arbusto o árbol. 300–600 m BO
- Byrsonima linguifera* Cuatrec., *Webbia* 13: 613. 1958. Arbusto o árbol. 50–1100 m AM
- Byrsonima luetzelburgii* Steyerl., *Fiediana*, *Bot.* 28: 288. 1952. Arbusto o árbol. 100–200 m AM
- Byrsonima macrostachya* W.R.Anderson, *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 118. 1981. Arbol. Endémica. 1100–2000 m AM
- Byrsonima maguirei* W.R.Anderson, *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 81. 1981. Arbusto o árbol. Endémica. 1200–2200 m AM
- Byrsonima nitidissima* Kunth in Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 5: 152. 1821 [1822]. Arbusto o árbol. 50–200 m AM AP BO
- Byrsonima pachypoda* W.R.Anderson, *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 123. 1981. Arbusto. 1400–1900 m BO
- Byrsonima poeppigiana* A.Juss., *Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.* 2, 13: 335. 1840. Arbol. 100–200 m AM
- Byrsonima punctulata* A.Juss., *Ann. Sci.*

- Nat., Bot. Sér. 2, 13: 335. 1840. Arbol o arbusto. 100–200 m AM
- Byrsonima schomburgkiana* Benth., London J. Bot. 7: 123. 1848. Arbol. 100–800 m AM BO
- Byrsonima spicata* (Cav.) DC., Prodr. 1: 580. 1824.
- Malpighia spicata* Cav., Diss. 8: 409. 1789. Arbol. 100–1700 m AM AN AR BA BO FA LA ME MI MO SU TA TR YA ZU
- Byrsonima steyermarkii* W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 124. 1981. Arbol. Endémica. 1200–2100 m AM BO
- Byrsonima stipulacea* A.Juss., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 332. 1840. Arbol o arbusto. 100–1400 m BO DA
- Byrsonima tillettii* W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 118. 1981. Arbusto o árbol. 1300 m BO
- Byrsonima verbascifolia* (L.) DC., Prodr. 1: 579. 1824.
- Malpighia verbascifolia* L., Sp. Pl. 426. 1753. Arbusto. 50–1400 m AM AN AP AR BA BO CO GU ME MO
- Byrsonima wurdackii* W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 119. 1981. Arbol. 100–200 m AM
- CALLAEUM** Small
- Callaeum antifebrile* (Griseb.) D.M.Johnson, Syst. Bot. 11: 349. 1986.
- Banisteria antifebrilis* Griseb., Linnaea 22: 15. 1849. Liana o arbusto trepador. 18 m FA
- CAROLUS** W.R.Anderson
- Carolus sinemariensis* (Aubl.) W.R.Anderson, Novon 16(2): 188. 2006.
- Banisteria sinemariensis* Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 462. 1775. Liana. 100–1000 m AM AP BO DA FA ME TA ZU
- CHRISTIANELLA** W.R.Anderson
- Christianella surinamensis* (Kosterm.) W.R.Anderson, Novon 16(2): 191. 2006.
- Mascagnia multiglandulosa* var. *surinamensis* Kosterm., Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht 25: 5. 1936. Liana. 100–200 m AM
- CLONODIA** Griseb.
- Clonodia complicata* (Kunth) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 206. 1981.
- Hiraea complicata* Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 171. 1821 [1822]. Liana o arbusto. 0–300 m AM AN AP BO DA TR ZU
- DIACIDIA** Griseb.
- Diacidia cordata* (Maguire) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 66. 1981.
- Sipapoa cordata* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 18: 46. 1969. Arbusto. Endémica. 300–1900 m AM
- Diacidia ferruginea* (Maguire & K.D.Phelps) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 68. 1981.
- Sipapoa ferruginea* Maguire & K.D.Phelps, Mem. New York Bot. Gard. 8: 126. 1953. Arbusto o árbol. Endémica. 1100–2000 m AM
- Diacidia galphimoides* Griseb. in Mart., Fl. Bras. 12(1): 120. 1858. Arbusto o árbol. 50–400 m AM BO
- Diacidia glaucifolia* (Maguire) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 63. 1981.
- Sipapoa glaucifolia* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 18: 48. 1969. Arbusto o árbol. 600–1600 m AM
- Diacidia hypoleuca* (Maguire) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 67. 1981.
- Sipapoa hypoleuca* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 8: 125. 1953. Arbusto o árbol. Endémica. 500–1200 m AM
- Diacidia kunhardtii* (Maguire) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 66. 1981.
- Sipapoa kunhardtii* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 8: 125. 1953. Arbusto o árbol. Endémica. 1300–1600 m AM
- Diacidia rufa* (Maguire) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 64. 1981.
- Sipapoa rufa* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 18: 48. 1969. Arbusto o árbol. 1500–1900 m AM
- Diacidia steyermarkii* (Maguire) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 71. 1981.
- Sipapoa steyermarkii* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 18: 54. 1969. Arbusto o árbol. Endémica. 1300–2300 m BO
- Diacidia stipularis* (Maguire & K.D.Phelps) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 65. 1981.
- Sipapoa stipularis* Maguire & K.D.Phelps, Mem. New York Bot. Gard. 8: 127. 1953. Arbusto. Endémica. 1600–2000 m AM
- Diacidia vestita* (Benth.) B.D.Jacks., Index Kew. 1: 741. 1895.
- Coleostachys vestita* Benth., London J. Bot. 7: 124. 1848. Arbusto o árbol. Endémica. 1100–2000 m AM
- DIPLOPTERYS** A.Juss.
- Diplopterys cabrerana* (Cuatrec.) B.Gates, Brittonia 31: 109. 1979.
- Banisteriopsis cabrerana* Cuatrec., Webbia 13: 493. 1958. Liana. 100–200 m AM
- EXCENTRADENIA** W.R.Anderson
- Excentradenia adenophora* (Sandwith) W.R.Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 31. 1997.
- Hiraea adenophora* Sandwith, Kew Bull. 1951: 33. 1951. Liana. 100–200 m BO DA
- GAUDICHAUDIA** Kunth
- Gaudichaudia albida* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 217. 1830. Hierba trepadora. 750–1800 m AR CA DF FA LA ME MI TA TR
- GLANDONIA** Griseb.
- Glandonia williamsii* Steyer., Fieldiana, Bot. 28: 288. 1952. Arbusto o árbol. 100–200 m AM
- HETEROPTERYS** Kunth
- Heteropterys alata* (W.R.Anderson) W.R.Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16: 75. 1987.
- Heteropterys beecheyana* var. *alata* W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 184. 1981. Liana o arbusto. 60–580 m AM AR BO CA CO MI ZU
- Heteropterys atabapensis* W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 198. 1981. Sufrutice, arbusto o árbol. 100–200 m AM
- Heteropterys ayacuchensis* W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 64: 227. 1990. Arbusto. Endémica. 50–100 m AM
- Heteropterys berteriana* A.Juss., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 278. 1840. Liana. 20–580 m FA LA ZU
- Heteropterys cristata* Benth., London J. Bot. 7: 131. 1848. Liana. 100–900 m AM BO
- Heteropterys cuatrecasii* W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 191. 1981. Liana. Endémica. 1100–2000 m AM
- Heteropterys huberi* W.R.Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16: 78. 1987.
- Arbusto. Endémica. 600–800 m AM
- Heteropterys leona* (Cav.) Exell, Cat. Vasc. Pl. S. Tomé 123. 1944.
- Banisteria leona* Cav., Diss. 9: 424. 1790. Liana. 0–100 m DA
- Heteropterys lonicerifolia* Triana & Planch., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 4, 18: 324. 1862. Liana. 700–1650 m CA DF FA GU LA ME TR
- Heteropterys macradena* (DC.) W.R.Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 202. 1981., sens. lat.
- Banisteria macradena* DC., Prodr. 1: 590. 1824. Liana, arbusto o árbol. 50–1600 m AM AN AP AR BO DF FA GU LA ME MI MO NE PO SU TA YA
- Heteropterys macrostachya* A.Juss., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 275. 1840. Liana o arbusto. 25–1350 m AM AP AR BA BO CA DF FA LA MI NE SU TA YA

- Heteropterys maguirei* W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 64: 225. 1990. Liana o arbusto. 1000–1100 m BO
- Heteropterys megaptera* A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 277. 1840. Liana. 600–1200 m BO SU
- Heteropterys molesta* W.R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 59. 1997. Liana. Endémica. 50–100 m BO
- Heteropterys neblinensis* W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 176. 1981. Liana. Endémica. 1700–2000 m AM
- Heteropterys nervosa* A. Juss. in A. St.-Hil., Fl. Bras. Merid. 3: 26. 1832 [1833]. Liana. 50–200 m AM
- Heteropterys oblongifolia* Gleason, Bull. Torrey Bot. Club 58: 377. 1931. Sufrutice, arbusto o árbol. Endémica. 100–300 m AM
- Heteropterys orinocensis* (Kunth) A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 276. 1840. *Banisteria orinocensis* Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 162. 1821 [1822]. Liana. 50–200 m AM AP BO GU
- Heteropterys prunifolia* (Kunth) W.R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16: 80. 1987. *Hiraea prunifolia* Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 170. 1821 [1822]. Liana o sufrutice. 0–600 m AR CA DF FA LA MI PO SU
- Heteropterys purpurea* (L.) Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 164. 1821 [1822]. *Banisteria purpurea* L., Sp. Pl. 427. 1753. Trepadora. 0–200 m AN DF NE SU
- Heteropterys quetepensis* Steyererm., Fieldiana, Bot. 28: 292. 1952. Arbusto o árbol. 30–200 m AM AN AP BO CO GU SU
- Heteropterys siderosa* Cuatrec., Webbia 13: 476. 1958. Liana. 50–200 m AM
- Heteropterys steyermarkii* W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 178. 1981. Arbusto o árbol. Endémica. 1200–1900 m AM
- Heteropterys uribei* Cuatrec., Webbia 13: 472. 1958. Arbusto trepador. 150–550 m CA YA
- HIRAEA** Jacq.
Hiraea affinis Miq., Linnaea 19: 133. 1847 [1846]. Liana. 50–300 m DA
Hiraea apaporiensis Cuatrec., Webbia 13: 404. 1958. Liana. 100–200 m AM
Hiraea buntingii W.R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 63. 1997. Arbusto o liana. Endémica. 140–300 m TR ZU
Hiraea celiana W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 249. 1981. Liana. Endémica. 100–1500 m AM
Hiraea fagifolia (DC.) A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 258. 1840. *Banisteria fagifolia* DC., Prodr. 1: 590. 1824. Liana. 200–300 m BO DA LA SU
Hiraea faginea (Sw.) Nied., Verz. Vorles. Königl. Lyceum Hosianum Braunschweig 1906/07: 16. 1906. *Malpighia faginea* Sw., Prodr. 74. 1788. Liana. 0–200 m AM BO DA
Hiraea fimbriata W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 245. 1981. Liana. 50–100 m AM AN AP BO
Hiraea hypoleuca W.R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 64. 1997. Liana. 1100–1250 m TA
Hiraea neblinensis W.R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 66. 1997. Liana. Endémica. 100–200 m AM
Hiraea reclinata Jacq., Enum. Syst. Pl. 4, 21. 1760. Arbusto trepador. 0–1300 m AR DF FA LA NE PO TA YA ZU
Hiraea steyermarkii W.R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 69. 1997. Liana. Endémica. 100–300 m BO
Hiraea tepuiensis Steyererm., Fieldiana, Bot. 28: 293. 1952. Liana. 400–1800 m AM BO SU
Hiraea ternifolia (Kunth) A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 257. 1840. *Malpighia ternifolia* Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 146. 1821 [1822]. Liana. 50–1200 m AM BO DF LA ME ZU
Hiraea transiens Nied., Verz. Vorles. Königl. Lyceum Hosianum Braunschweig 1906/07: 8. 1906. Liana. 0–65 m DF MI
- JANUSIA** A. Juss.
Janusia caudata Griseb. in Mart., Fl. Bras. 12(1): 103. 1859 [1879]. Liana. 300–500 m BO
- JUBELINA** A. Juss.
Jubelina grisebachiana W.R. Anderson, Contrib. Univ. Michigan Herb. 17: 30. 1990. Liana. 100–200 m AM
Jubelina magnifica W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 228. 1981. Liana. Endémica. 100–200 m AM
- LOPHANTHERA** A. Juss.
Lophanthera longifolia (Kunth) Griseb. in Mart., Fl. Bras. 12(1): 25. 1858. *Galphimia longifolia* Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 173. 1821 [1822]. Arbusto o árbol. 100–200 m AM
- LOPHOPTERYS** A. Juss.
Lophopterys euryptera Sandwith, Kew Bull. 1951: 34. 1951. Liana. 50–400 m BO DA
Lophopterys inpana W.R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 46. 1990. Liana o arbusto. 100–200 m AM
- MALPIGHIA** L.
Malpighia emarginata DC., Prodr. 1: 578. 1824. Arbusto o árbol. Cultivada y naturalizada. 0–900 m AR BO CA DA DF FA NE SU ZU
Malpighia glabra L., Sp. Pl. 425. 1753. Arbusto o árbol. 0–1500 m AR BO CA DF FA LA MI SU TA TR ZU
- MALPIGHIODES** W.R. Anderson
Malpighiodes leucanthele (Griseb.) W.R. Anderson, Novon 16(2): 193. 2006. *Mascagnia leucanthele* Griseb. in Mart., Fl. Bras. 12(1): 96. 1858. Liana. BO
Malpighiodes liesneri (W.R. Anderson) W.R. Anderson, Novon 16(2): 194. 2006. *Mascagnia liesneri* W.R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 51. 1990. Liana. Endémica. 100–200 m AM
- MASCAGNIA** (Bertero ex DC.) Colla
Mascagnia cynanchifolia Griseb. in Mart., Fl. Bras. 12(1): 95. 1858. Liana. 100–200 m AM
Mascagnia dissimilis C. V. Morton & Moldenke, Phytologia 1: 19. 1933. Liana. 100–300 m AM
Mascagnia divaricata (Kunth) Nied. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. III, 4: 55. 1890. *Hiraea divaricata* Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 169. 1821 [1822]. Liana. 50–1500 m AN AR CA DA DF FA LA ME MI PO SU ZU
Mascagnia eggersiana (Nied.) W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 224. 1981. *Mascagnia tenuifolia* var. *eggersiana* Nied., Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceum Hosianum Braunschweig 3: 10. 1908. Liana. 100–1600 m AM AR BO DF FA TA TR YA
Mascagnia glandulifera Cuatrec., Webbia 13: 365. 1958. Liana. 100 m AM
Mascagnia macradena (DC.) Nied., Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceums Hosianum Braunschweig 3: 10. 1908. *Hiraea macradena* DC., Prodr. 1: 585. 1824. Liana. 100–1000 m FA LA TA TR YA ZU
Mascagnia ovatifolia (Kunth) Griseb., Fl. Brit. W. I. 121. 1860. *Hiraea ovatifolia* Kunth in Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 170. 1821 [1822]. Liana. 100–800 m AP AR BA BO CA DF FA ME MI MO NE PO SU TA YA ZU
Mascagnia schunkei W.R. Anderson, Mem. New York Bot. Gard. 32: 222. 1981. Liana. 50–300 m AM
Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb. in

Mart., Fl. Bras. 12(1): 96. 1858.
Hiraea septum A.Juss. in A.St.-Hil.,
 Fl. Bras. Merid. 3: 19. 1832 [1833].
 Liana. 50–1200 m AM AP BO DF
 FA MI SU TA YA ZU

MEZIA Schwacke ex Nied.

Mezia curranii W.R.Anderson, Mem. New
 York Bot. Gard. 32: 236. 1981. Liana.
 200–300 m AM

Mezia huberi W.R.Anderson, Contr. Univ.
 Michigan Herb. 19: 384. 1993. Arbusto
 o árbol. Endémica. 100–600
 m AM

Mezia includens (Benth.) Cuatrec., Webbia
 13: 450. 1958.
Tetrapterys includens Benth., London
 J. Bot. 7: 133. 1848. Liana.
 200–1300 m AM BO CA

Mezia rufa W.R.Anderson, Mem. New
 York Bot. Gard. 32: 234. 1981. Liana.
 50–400 m AM

NIEDENZUELLE W.R.Anderson

Niedenzuella caracasana W.R.Anderson,
 Novon 16(2): 198. 2006. Liana. Endémica.
 1500 m DF

Niedenzuella castanea (Cuatrec.) W.R.Anderson,
 Novon 16(2): 199. 2006.
Heteropterys castanea Cuatrec., Webbia
 13: 475. 1958. Liana. 100–200 m
 AM

Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.) W.R.
 Anderson, Novon 16(2): 200. 2006.
Hiraea poeppigiana A.Juss., Ann.
 Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 260. 1840.
 Liana. 100–200 m AM

Niedenzuella stanea (Griseb.) W.R.Anderson,
 Novon 16(2): 202. 2006.
Niedenzuella stanea Griseb., Vidensk.
 Meddel. Dansk Naturhist. Foren.
 Kjøbenhavn 1853: 46. 1854. Liana
 o arbusto. 100–200 m AM

PTERANDRA A.Juss.

Pterandra flavescens Maguire, Mem.
 New York Bot. Gard. 8: 128. 1953.
 Arbusto o árbol. Endémica. 1500
 m AM

Pterandra sericea W.R.Anderson, Brittonia
 28: 407. 1976 [1977]. Arbusto
 o árbol. 100–800 m BO

SPACHEA A.Juss.

Spachea elegans (G.Mey.) A.Juss. in Deless.,
 Icon. Sel. Pl. 3: 19. 1837 [1838].
Malpighia elegans G.Mey., Prim.

Fl. Esseq. 178. 1818. Arbol. 0–200
 m BO DA

STIGMAPHYLLON A.Juss.

Stigmaphyllon adenodon A.Juss., Ann.
 Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 288. 1840.
Stigmaphyllon adenodon var. *adenodon*.
 Liana. 0–100 m DA SU

Stigmaphyllon bannisterioides (L.) C.E.
 Anderson, Taxon 41: 328. 1992.
Malpighia bannisterioides L., Pl.
 Surin. 9. 1775. Trepadora o arbusto.
 0–50 m DA MI SU YA

Stigmaphyllon bogotense Triana &
 Planch., Ann. Sci. Nat., Bot. Sér.
 4, 18: 320. 1862. Liana. 800–2500
 m BA DF FA LA ME PO TA TR

Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.
 in A.St.-Hil., Fl. Bras. Merid. 3:
 49. 1832 [1833].

Banisteria ciliata Lam., Encycl. 1:
 369. 1783 [1785]. Liana. 0–50 m SU

Stigmaphyllon dichotomum (L.) Griseb.,
 Linnaea 13: 207. 1839.

Banisteria dichotoma L., Sp. Pl. 427.
 1753. Liana. 300–500 m AP BA CA
 FA LA ME PO TA TR YA ZU

Stigmaphyllon ellipticum (Kunth) A.Juss.,
 Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 290.
 1840.

Banisteria elliptica Kunth in Kunth,
 Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 161.
 1821 [1822]. Liana. 100–400 m ZU

Stigmaphyllon finlayanum A.Juss., Arch.
 Mus. Hist. Nat. 3: 375. 1843. Liana.
 0–900 m SU

Stigmaphyllon puberum (Rich.) A.Juss.,
 Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 289.
 1840.

Banisteria pubera Rich., Actes Soc.
 Hist. Nat. Paris 1: 109. 1792. Liana.
 0–100 m DA MO

Stigmaphyllon singulare C.E.Anderson,
 Syst. Bot. 11: 126. 1986. Trepadora.
 150 m TA ZU

Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A.Juss.,
 Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 288.
 1840.

Banisteria sinuata DC., Prodr. 1:
 588. 1824. Liana. 0–450 m AM
 AN AR BA BO CA DA DF FA LA
 ME MI MO PO SU TA TR ZU

TETRAPTERYS Cav.

Tetrapterys acutifolia Cav., Diss. 9: 433.
 1790. Liana. 900–1500 m AR BA
 DF LA ME MO SU

Tetrapterys aristeguietae W.R.Anderson,
 Mem. New York Bot. Gard. 32: 255. 1981.
 Trepadora (?), arbusto o árbol. Endémica.
 50–100 m AN AP BO

Tetrapterys chloroptera Cuatrec., Webbia
 13: 436. 1958. Liana. 65 m AP

Tetrapterys crispa A.Juss., Ann. Sci. Nat.,
 Bot. Sér. 2, 13: 265. 1840, sens. lat.
 Liana. 90–1000 m AM AP AR BO
 CA CO DA FA LA PO YA ZU

Tetrapterys diptera Cuatrec., Webbia 13:
 428. 1958. Liana. 2250–2300 m ME

Tetrapterys discolor (G.Mey.) DC., Prodr.
 1: 587. 1824.

Triopteris discolor G.Mey., Prim.
 Fl. Esseq. 182. 1818. Liana. 50–900
 m AN AP AR BO CO DA DF LA
 MO SU TA YA ZU

Tetrapterys fimbriopetala A.Juss., Ann.
 Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 263.
 1840. Liana o arbusto. 50–2000 m
 AM BO

Tetrapterys gracilis W.R.Anderson, Mem.
 New York Bot. Gard. 32: 257. 1981.
 Arbusto. 100–200 m AM BO?

Tetrapterys maranhamensis A.Juss.,
 Arch. Mus. Hist. Nat. 3: 537. 1843.
 Liana o arbusto. 50–300 m BO

Tetrapterys mucronata Cav., Diss. 9: 434.
 1790. Liana. 50–400 m AM AP BO

Tetrapterys oleifolia (Benth.) Griseb. in
 Mart., Fl. Bras. 12(1): 86. 1858.

Hiraea oleifolia Benth., London J.
 Bot. 7: 136. 1848. Arbusto. 1000–1400
 m BO

Tetrapterys pusilla Steyererm., Fieldiana,
 Bot. 28: 294. 1952. Sufrutice o arbusto.
 500–2600 m BO

Tetrapterys rhodopteron Oliv., Timehri
 5: 190. 1886. Liana o arbusto.
 400–1700 m BO

Tetrapterys seemannii Triana & Planch.,
 Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 4, 18: 335.
 1862. Liana. 20–100 m ZU

Tetrapterys styloptera A.Juss., Ann. Sci.
 Nat., Bot. Sér. 2, 13: 262. 1840.
 Liana, arbusto o árbol. 0–1200 m
 AM BO CA DF FA LA ME MI TA
 TR YA ZU

Tetrapterys tinifolia Triana & Planch.,
 Ann. Sci. Nat., Bot. Sér. 4, 18: 336.
 1862. Liana. 520 m MI

Tetrapterys vacciniifolia A.Juss., Ann.
 Sci. Nat., Bot. Sér. 2, 13: 262. 1840.
 Arbusto. Endémica. 100–200 m
 FA ZU

MALPIGHIACEAE

Sinónimos y nombres excluidos

Alcoceratothrix rugosa (Benth.) Nied. = *Byrsonima stipulacea*

Alcoceratothrix stipulacea (A.Juss.) Nied. = *Byrsonima stipulacea*

Atopocarpus Cuatrec. = *Clonodia*

Banisteria apiculata (Miq.) C.B.Rob. = *Heteropterys macrostachya*

Banisteria argentea (Kunth) Spreng. = *Banisteriopsis muricata*

Banisteria argentea (Kunth) Spreng. var. *acuminata* Nied. = *Banisteriopsis muricata*

Banisteria argentea (Kunth) Spreng. var. *obtusiuscula* Nied. = *Banisteriopsis muricata*

Banisteria cinerascens (Benth.) Griseb. = *Banisteriopsis cinerascens* (Benth.) B.Gates

Banisteria cinerascens (Benth.) Griseb. var. *glabrescens* Nied. = *Banisteriopsis wurdackii*

- Banisteria cornifolia* (Kunth) Spreng. = *Banisteriopsis cornifolia*
Banisteria cornifolia (Kunth) Spreng. var. *elliptica* Nied. = *Banisteriopsis cornifolia* var. *maracaybensis*
Banisteria elegans Triana & Planch. = *Banisteriopsis elegans*
Banisteria guatemalensis Nied. = *Banisteriopsis acapulcensis*
Banisteria heterophylla Willd. = *Stigmaphyllon sinuatum*
Banisteria laurifolia L. = *Heteropterys laurifolia* (L.) A.Juss., registro dudoso (Pittier *et al.* 1945–1947; Hoyos 1985), no presente en Venezuela
Banisteria leptocarpa Benth. = *Banisteriopsis martiniana*
Banisteria maracaybensis A.Juss. var. *elliptica* Nied. = *Banisteriopsis cornifolia* var. *maracaybensis*
Banisteria multiflora DC. = *Heteropterys leona*
Banisteria orbicularis Nied. = *Banisteriopsis cristata*
Banisteria ovata Cav. = *Stigmaphyllon bannisterioides*
Banisteria sepium A.Juss., no presente en Venezuela = *Banisteriopsis sepium* (A.Juss.) B.Gates
Banisteria splendens DC. = *Stigmaphyllon sinuatum*
Banisteriopsis cornifolia (Kunth) Robinson var. *elliptica* B.Gates = *Banisteriopsis cornifolia* var. *maracaybensis*
Banisteriopsis leptocarpa (Benth.) R.O.Williams = *Banisteriopsis martiniana*
Banisteriopsis martiniana (A.Juss.) Cuatrec. var. *grandifolia* (Nied.) Cuatrec. = *Banisteriopsis grandifolia*
Banisteriopsis martiniana (A.Juss.) Cuatrec. var. *laevis* Cuatrec. = *Banisteriopsis martiniana* var. *subenervia*
Banisteriopsis panamensis Cuatrec. & Croat = *Banisteriopsis nutans*
Banisteriopsis rusbyana sensu ethnobotanists non Nied. C.V.Morton = *Diplopterys cabrerana*
Blepharandra ptariana Steyerl. = *Blepharandra hypoleuca*
Brachypterys A.Juss. = *Stigmaphyllon*
Brachypterys borealis A.Juss. = *Stigmaphyllon bannisterioides*
Brachypterys ovata (Cav.) Small = *Stigmaphyllon bannisterioides*
Brachypterys paralias (A.Juss.) Hutch. = *Stigmaphyllon paralias* A.Juss.
Bunchosia canescens (Aiton) DC., error de identificación (Pittier *et al.* 1945–1947), probablemente *Bunchosia mollis* o *Bunchosia odorata*
Bunchosia columbica Nied. = *Bunchosia diphylla*
Bunchosia cumanensis G.Don, nombre obscuro
Bunchosia glauca Kunth, registro dudoso (TROPICOS; Index Kewensis)
Bunchosia lindeniana — var. *mexicana* Nied., registro dudoso (Pittier *et al.* 1945–1947) = *Bunchosia lindeniana* A.Juss., no presente en Venezuela
Bunchosia rhombifolia Turcz. = *Bunchosia mollis*
Bunchosia schomburgkiana Nied. = *Bunchosia mollis*
Bunchosia squarrosa Griseb. = *Tetrapteryx styloptera*
Burdachia atractoides Nied. = *Burdachia sphaerocarpa*
Burdachia prismatocarpa Juss. var. *sphaerocarpa* (A.Juss.) Nied. = *Burdachia sphaerocarpa*
Burdachia sphaerocarpa A.Juss. var. *glandifera* (Gleason) W.R.Anderson = *Burdachia sphaerocarpa*
Burdachia williamsii Steyerl. = *Burdachia prismatocarpa*
Byrsonima altissima DC., no presente en Venezuela. Error de identificación por *Byrsonima aerugo*
Byrsonima amoena Cuatrec., registro dudoso (TROPICOS; VEN), no presente en Venezuela
Byrsonima barkleyana Cuatrec. = *Byrsonima punctulata*
Byrsonima bolivarana Steyerl. = *Byrsonima carroana*
Byrsonima bracteolaris Benth. = *Byrsonima concinna*
Byrsonima chalcophylla Nied. ex Ule var. *carroana* (Steyerl.) W.R.Anderson = *Byrsonima carroana*
Byrsonima christianeae W.R.Anderson, especie probablemente en Bolívar
Byrsonima coriacea (Sw.) DC. = *Byrsonima crassifolia*
Byrsonima coriacea (Sw.) DC. var. *spicata* (Cav.) Nied. = *Byrsonima spicata*
Byrsonima cretacea Gleason = *Blepharandra hypoleuca*
Byrsonima cretacea Nied. = *Byrsonima luetzelburgii*
Byrsonima densa DC., registro dudoso (Pittier *et al.* 1945–1947), no presente en Venezuela
Byrsonima ferruginea Kunth = *Byrsonima crassifolia*
Byrsonima ferruginea Kunth var. *macrophylla* Benth. = *Byrsonima aerugo*
Byrsonima gymnocalycina A.Juss., registro dudoso (Pittier *et al.* 1945–1947), no presente en Venezuela
Byrsonima laurifolia Kunth = *Byrsonima crassifolia*
Byrsonima martinicensis Duss., no presente en Venezuela = *Byrsonima trinitensis* A.Juss.
Byrsonima moritziana Turcz. = *Byrsonima crassifolia*
Byrsonima reticulata Griseb., non *Byrsonima reticulata* (Poir.) DC. = *Byrsonima karstenii*
Byrsonima rugosa Benth. = *Byrsonima stipulacea*
Byrsonima uvulifera Nied. = *Byrsonima japurensis*
Byrsonima verbascifolia Rich. ex Juss. var. *denudata* Cuatrec. = *Byrsonima verbascifolia*
Callyntranthele Nied. = *Blepharandra*
Callyntranthele angustifolia (Kunth) Nied. = *Blepharandra angustifolia*
Clonodia racemosa (A.Juss.) Nied., registro dudoso (VEN; Pittier *et al.* 1945–1947), no presente en Venezuela
Clonodia racemosa (Juss.) Nied. var. *orinocensis* Nied. = *Clonodia complicata*

Diacidia duckeana Maguire = *Diacidia galphimoides*
Diplopterys includens (Benth.) Nied. = *Mezia includens*
Diplopterys involuta (Turcz.) Nied. = *Mezia includens*
Diplopterys involuta (Turcz.) Nied. var. *ovata* Nied. = *Mezia curranii*
Galphimia gracilis Bartl., nativa y cultivada
Heteropterys acutifolia A.Juss. = *Heteropterys orinocensis*
Heteropterys anoptera A.Juss. = *Heteropterys eglandulosa*
Heteropterys beecheyana A.Juss. = *Heteropterys brachiata*
Heteropterys beecheyana A.Juss. var. *alata* W.R.Anderson = *Heteropterys alata*
Heteropterys carinata Benth. = *Heteropterys cristata*
Heteropterys cinerascens Benth. = *Banisteriopsis cinerascens*
Heteropterys cochleosperma A.Juss., registro dudoso (Pittier *et al.* 1945–1947), no presente en Venezuela
Heteropterys dichromocalyx W.R.Anderson, especie probablemente en Amazonas
Heteropterys eglandulosa A.Juss., no presente en Venezuela
Heteropterys escalloniifolia A.Juss., registro dudoso (Steyermark & Huber 1978), no presente en Venezuela
Heteropterys helicina Griseb. = *Heteropterys orinocensis*
Heteropterys lasserii W.R.Anderson = *Heteropterys megaptera*
Heteropterys multiflora (DC.) Hochr. = *Heteropterys leona*
Heteropterys oleifolia (Benth.) Griseb. = *Tetrapterys oleifolia*
Heteropterys purpurea (L.) Kunth var. *antillana* Nied. = *Heteropterys purpurea* (nom. superfl.)
Heteropterys purpurea (L.) Kunth var. *puberula* Nied. = *Heteropterys prunifolia*
Heteropterys rhombifolia Rusby = *Heteropterys prunifolia*
Heteropterys suberosa Griseb. = *Heteropterys nervosa*
Heteropterys suberosa Griseb. var. *lessertiana* (A.Juss.) Griseb. = *Heteropterys macradena*
Heteropterys venezolensis Nied. = *Heteropterys prunifolia*
Hiraea bifurcata W.R.Anderson = *Hiraea ternifolia*
Hiraea chrysophylla A.Juss. = *Hiraea faginea*
Hiraea fulgens A.Juss. = *Hiraea faginea*
Hiraea hippocrateoides Triana & Planch. = *Mascagnia hiraea*
Hiraea nitida Kunth = *Clonodia complicata*
Hiraea platitriphylla Hochr. = *Hiraea ternifolia*
Hiraea velutina Nied., no presente en Venezuela = *Hiraea barclayana* Benth.
Lophanthera lactescens Ducke, no presente en Venezuela
Malpighia puniceifolia L. = *Malpighia glabra*
Malpighia semeruco A.Juss. = *Malpighia glabra*
Mascagnia aggersiana (Nied.) Anderson, error de escritura por *Mascagnia eggarsiana*
Mascagnia americana Bertero = *Mascagnia macradena*; nom. superfl.
Mascagnia castanea (Cuatrec.) W.R.Anderson = *Niedenzuella castanea*
Mascagnia complicata (Kunth) Nied. = *Clonodia complicata*
Mascagnia hippocrateoides (Triana & Planch.) Nied. = *Mascagnia hiraea*
Mascagnia hiraea (Gaertn.) Fawc. & Rendle = *Adelphia hiraea*
Mascagnia macrodisca (Triana & Planch.) Nied. = *Alicia macrodisca*
Mascagnia nervosa Nied. = *Mascagnia ovatifolia*
Mascagnia nitida (Kunth) Nied. = *Clonodia complicata*
Mascagnia poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson = *Niedenzuella poeppigiana*
Mascagnia sinemariensis (Aubl.) Griseb. = *Carolus sinemariensis*
Mascagnia stannea (Griseb.) Nied. = *Niedenzuella stannea*
Mascagnia surinamensis (Kosterm.) W.R.Anderson = *Christianella surinamensis*
Mascagnia tenuifolia Nied., error de identificación por *Mascagnia eggarsiana*
Mascagnia volubilis (Sims) Nied. = *Mascagnia sinemariensis*
Pterandra guianensis W.R.Anderson, especie probablemente en Bolívar
Sipapoa Maguire = *Diacidia*
Sipapoa vestita (Benth.) Maguire = *Diacidia vestita*
Skolioterys Cuatrec. = *Clonodia*
Stenocalyx involutus Turcz. = *Mezia includens*
Stigmaphyllon brachiatum Triana & Planch. = *Stigmaphyllon sinuatum*
Stigmaphyllon fulgens A.Juss. = *Stigmaphyllon sinuatum*
Stigmaphyllon heterophyllum Hook. = *Stigmaphyllon sinuatum*
Stigmaphyllon hypoleucum Miq. = *Stigmaphyllon sinuatum*
Stigmaphyllon monancistrum Nied. = *Stigmaphyllon sinuatum*
Stigmaphyllon ovatum (Cav.) Nied. = *Stigmaphyllon bannisterioides*
Stigmaphyllon splendens Cuatrec. = *Stigmaphyllon sinuatum*
Stigmaphyllon tiliifolium (Kunth) Nied. = *Stigmaphyllon dichotomum*
Stigmaphyllon tiliifolium (Kunth) Nied. var. *berteroanum* Nied. = *Stigmaphyllon dichotomum*
Tetrapodenia Gleason = *Burdachia*
Tetrapodenia glandifera Gleason = *Burdachia sphaerocarpa*
Tetrapterys acapulcensis Kunth, registro dudoso (VEN), no presente en Venezuela
Tetrapterys anisoptera A.Juss., registro dudoso (VEN; Pittier *et al.* 1945–1947; Steyermark & Huber 1978), no presente en Venezuela
Tetrapterys boliviensis Nied. = *Tetrapterys styloptera*
Tetrapterys boliviensis Nied. var. *granatensis* Nied. = *Tetrapterys styloptera*
Tetrapterys crebriflora A.Juss. = *Tetrapterys mucronata*

- Tetrapterys huachamacariensis* W.R.Anderson = *Tetrapterys fimbripetala*
Tetrapterys julianii J.F.Macbr. = *Dicella julianii* (J.F.Macbr.) W.R.Anderson, especie probablemente en Amazonas
Tetrapterys mucronata Cav. subsp. *crebriflora* (A.Juss.) Kosterm. = *Tetrapterys mucronata*
Tetrapterys mucronata Cav. var. *crebriflora* (A.Juss.) J.F.Macbr. = *Tetrapterys mucronata*
Tetrapterys ovalifolia Griseb., registro dudoso (Pittier *et al.* 1945-1947), no presente en Venezuela
Tetrapterys phylladenophora Maguire & Steyerl. = *Tetrapterys rhodopteron*
Tetrapterys poeppigiana (A.Juss.) Griseb. = *Mascagnia poeppigiana*
Tetrapterys squarrosa (Griseb.) Griseb. = *Tetrapterys styloptera*

MALPIGHIACEAE

Referencias de interés

- Anderson, C. 1997a. Revision of *Pterandra* (Malpighiaceae). *Contr. Univ. Michigan Herb.* 21: 1-27.
 Anderson, C. 1997b. Monograph of *Stigmaphyllon* (Malpighiaceae). *Syst. Bot. Monogr.* 51: 1-313.
 Anderson, W.R. 1981. Malpighiaceae. In: The botany of the Guayana Highland - Part XI (Maguire, B. and Collaborators). *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 21-305.
 Anderson, W.R. 1988. Malpighiaceae. In: *Flora of the Lesser Antilles-Leeward and Windward Islands*. Vol. 4: Dicotyledoneae - Part 1 (Howard, R.A., ed.), pp. 596-633. Arnold Arboretum, Harvard University, Massachusetts.
 Anderson, W.R. 1990. The taxonomy of *Jubelina* (Malpighiaceae). *Contr. Univ. Michigan Herb.* 17: 21-37.
 Anderson, W.R. 1997. Notes on Neotropical Malpighiaceae - VI. *Contr. Univ. Michigan Herb.* 21: 37-84.
 Anderson, W.R. 2001a. Malpighiaceae. In: *Flora of the Venezuelan Guayana*. Vol. 6: Liliaceae-Myrsinaceae (Berry, P.E., K. Yatskievych & B.K. Holst, eds.), pp. 82-185. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
 Anderson, W.R. 2001b. Jacquin's species of *Bunchosia* (Malpighiaceae) from Cartagena, Colombia. *Contr. Univ. Michigan Herb.* 23: 59-62.
 Anderson, W.R. 2002. Malpighiaceae Nomenclature: <http://herbarium.lsa.umich.edu/malpigh/>
 Anderson, W.R. & C.C. Davis. 2001. Monograph of *Lophopterys* (Malpighiaceae). *Contr. Univ. Michigan Herb.* 23: 83-105.
 Cuatrecasas, J. 1958. Malpighiaceae. In: *Prima Flora Colombiana* (Cuatrecasas, J., ed.). *Webbia* 13(2): 343-664.
 Gates, B. 1982. *Banisteriopsis*, *Diplopterys* (Malpighiaceae). *Fl. Neotrop. Monogr.* 30: 1-237.
 Johnson, D.M. 1986. Revision of the neotropical genus *Callaeum* (Malpighiaceae). *Syst. Bot.* 11: 335-353.
 Steyermark, J.A. 1952. Malpighiaceae. In: Contributions to the Flora of Venezuela - 2 (Steyermark, J.A. and Collaborators). *Fieldiana, Bot.* 28(2): 280-295.
 Steyermark, J.A. 1957a. Malpighiaceae. In: Contributions to the Flora of Venezuela - 4 (Steyermark, J.A. and Collaborators). *Fieldiana, Bot.* 28(4): 939-943.
 Steyermark, J.A. 1957b. Meliaceae. In: Contributions to the Flora of Venezuela - 4 (Steyermark, J.A. and Collaborators). *Fieldiana, Bot.* 28(4): 936-939.
 Troost, P. 1984. Malpighiaceae. In: *Flora of the Netherlands Antilles* (Stoffers, A.L., ed.). 3: 323-334.