

Cuatrecasas 1958c; Anderson 2006.

Liana.

Endémica. Pacífico. 0-15 m.

CHO, VAL. No evaluada.

O Colombia.

Forero 4419 (COL, MO).

NOTA: pos. solo un extremo en la gran variación de *A. hiraea* / poss. only one end of the great variation in *A. hiraea*.

Alicia W.R.Anderson

1 especie

***Alicia macrodisca* (Triana & Planch) Griseb.**

Mascagnia macrodisca (Triana & Planch.) Nied., *Mascagnia macrodisca* f. *angustifolia*

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c; Anderson 2006.

Liana.

Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Orinoquia. 240-980 m.

AMA, BOY, GUV, MET, PUT, VAU. No evaluada.

Suramérica hasta aprox. 20°S.

Cuatrecasas 7477 (COL, F, US).

Amorimia W.R.Anderson

1 especie, 1 especie endémica

Amorimia concinna

(C.V.Morton) W.R.Anderson

Mascagnia concinna C.V.Morton, *Mascagnia dumetorum*

C.V.Morton

Cuatrecasas 1958c; Anderson 2006.

Liana.

Endémica. Caribe. 30-170 m.

BOL, CES, MAG, SUC. No evaluada.

N Colombia.

Haught 3927 (COL, F, NY, US).

MALPIGHIACEAE

**POR WILLIAM R. ANDERSON[†] Y
CHRISTIANE ANDERSON**

(Lista preliminar compilada por
Marcela Celis y Laura Clavijo)

32 géneros, 246 especies, 47
especies endémicas

***Adelphia* W.R.Anderson**

2 especies, 1 especie endémica

***Adelphia hiraea* (Gaertn.)**

W.R.Anderson

Mascagnia hippocrateoides
(Triana & Planch.) Nied.

Cuatrecasas 1958c; Anderson 2006.

Liana.

Nativa. Caribe, Pacífico, V Magdalena. 100-800 m.

ANT, CES, CHO, CUN, SAN. No evaluada.

SE México a Ecuador y Venezuela; Jamaica.

Uribe 1521 (COL).

***Adelphia platyrachis* (Triana & Planch.) W.R.Anderson**

Mascagnia platyrachis (Triana & Planch.) Cuatrec.

Banisteriopsis C.B.Rob.

6 especies

***Banisteriopsis elegans*
(Triana & Planch.) Sandwith**

Banisteriopsis elegans subsp. *cordata* (Nied.) Sandwith, *Banisteriopsis elegans* var. *ciliata* (Nied.) Sandwith, *Banisteriopsis martiniana* var. *elegans* (Triana & Planch.) Cuatrec. Cuatrecasas 1958c; Gates 1982. Liana. Nativa. Amazonia, Andes, Pacífico, SN Santa Marta, V Magdalena. 0-1600 m. ANT, CHO, MAG, NAR, PUT, VAL. No evaluada. SE México a Venezuela y Perú. Forero 5805 (COL, MICH, MO).

***Banisteriopsis martiniana*
(A.Juss.) Cuatrec.**

Banisteriopsis martiniana var. *laevis* Cuatrec. Gates 1982. Liana. Nativa. Amazonia. 100-550 m. AMA, CAQ, VAU. No evaluada. N Suramérica. Schultes 14569 (A, COL, US). *Banisteriopsis martiniana* var. *subnervia* Cuatrec.

***Banisteriopsis muricata*
(Cav.) Cuatrec.**

Banisteria schlimii Turcz., *Heteropterys argentea* Kunth Cuatrecasas 1958c; Gates 1982. Trepadora, liana. Nativa. Andes, Caribe, Orinoquia, V Cauca, V Magdalena. 0-1900 m. ANT, ARA, ATL, BOL, BOY, CES, CÓR, CUN, GUJ, HUI, MAG, MET, NSA, SAN, SUC, TOL. No evaluada. México a Argentina.

Cuatrecasas 12094 (BM, COL, F, GH, MO, U, US).

***Banisteriopsis padifolia*
(Nied.) B.Gates**

Banisteriopsis martiniana var. *popayanensis* Cuatrec., *Banisteriopsis polygama* (Nied.) B.Gates Gates 1982. Liana. Nativa. Andes, Pacífico. 0-2400 m. ANT, CAU, CHO, TOL, VAL. No evaluada. Colombia y O Venezuela a Bolivia. Juncosa 1193 (CHOCO, JAUM, MO).

***Banisteriopsis pubescens*
(Nied.) Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Gates 1982. Liana. Nativa. Andes. 1200-1600 m. NAR. No evaluada. SO Colombia y NO Ecuador. Lehmann 5159 (F, NY). NOTA: conocida en Colombia solo del tipo / known in Colombia only from the type.

***Banisteriopsis wilburii*
B.Gates**

Gates 1982. Liana. Nativa. Andes, Pacífico, V Cauca. 150-2150 m. ANT, BOY. No evaluada. Panamá y NO Colombia. Betancur 718 (COL, HUA, MICH, MO). NOTA: Cuatrecasas (1958) trató esta especie como *B. martiniana* var. *grandifolia*. Gates (1982) limitó *B. grandifolia* a plantas de Venezuela / Cuatrecasas (1958) treated this species as *B. martiniana* var. *grandifolia*;

Gates (1982) restricted *B. grandifolia* to Venezuela.

***Blepharandra* Griseb.**

2 especies

***Blepharandra angustifolia*
(Kunth) W.R.Anderson**

Byrsonima angustifolia Kunth Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2001a. Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 90 m. GUI. No evaluada. E Colombia, SO Venezuela, NO Brasil. Cárdenas 18665 (COAH, HUA).

***Blepharandra heteropetala*
W.R.Anderson**

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a. Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 150 m. GUI. No evaluada. E Colombia, SO Venezuela, NO Brasil. Madriñán 1037 (COL, GH, MO).

***Bronwenia* W.R.Anderson & C.Davis**

3 especies

***Bronwenia acapulcensis*
(Rose) W.R.Anderson & C.Davis**

Banisteria maracaybensis var. *angustifolia* Griseb., *Banisteriopsis acapulcensis* (Rose) Small, *Banisteriopsis cornifolia* var. *leiocarpa* (Nied.) Cuatrec., *Banisteriopsis dugandii* Cuatrec. Gates 1982; Anderson & Davis 2007. Arbusto, trepadora. Nativa. Caribe. 0-200 m.

ANT, ATL, BOL, CES, MAG, SUC. No evaluada.
México a Colombia y Venezuela.
Haught 2247 (COL, F, GH, NY, US).
Bronwenia acapulcensis var. *acapulcensis*

Bronwenia cornifolia
(Kunth) W.R.Anderson & C.Davis

Banisteriopsis cornifolia (Kunth) C.B.Rob., *Heteropterys cornifolia* Kunth
Gates 1982; Anderson & Davis 2007.
Arbusto, trepadora, liana.
Nativa. Andes, Caribe, Pacífico, V Magdalena. 50-3000 m.
ANT, CUN, GUJ, HUI, TOL. No evaluada.
México a Colombia y Venezuela.
Smith 1135 (COL, GH, IAN, MO, US).
Bronwenia cornifolia var. *cornifolia*, *Bronwenia cornifolia* var. *maracaybensis* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.Davis

Bronwenia wurdackii
(B.Gates) W.R.Anderson & C.Davis

Banisteriopsis wurdackii B.Gates
Gates 1982; Anderson & Davis 2007.
Liana.
Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Orinoquia, V Cauca, V Magdalena. 60-770 m.
AMA, ANT, BOY, MET, SAN. No evaluada.
Panamá y N Suramérica a Bolivia.
Brant 1236 (COL, HUA, MICH, MO).

***Bunchosia* Kunth**

23 especies, 5 especies endémicas

Bunchosia anomala

W.R.Anderson

Anderson 1995.
Árbol.
Endémica. Caribe, V Cauca, V Magdalena. 50-500 m.
ANT, CÓR. No evaluada.
N Colombia.
Callejas 3601 (HUA, MICH, MO).

***Bunchosia argentea* (Jacq.)**

DC.

Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, árbol.
Nativa. Amazonia, Andes, Caribe, Pacífico, SN Santa Marta, V Cauca. 0-2055 m.
ANT, BOL, CAU, CES, CHO, GUJ, HUI, MAG, PUT, QUI, VAL. No evaluada.
Costa Rica a Bolivia, O Brasil y Guayanas.
Callejas 5075 (COL, HUA, MICH, MO).

***Bunchosia armeniaca* (Cav.)**

DC.

Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa. Amazonia, Andes, Orinoquia, Pacífico, V Cauca, V Magdalena. 100-2800 m.
AMA, ANT, BOY, CAL, CAQ, CAS, CAU, CUN, GUV, HUI, MET, NAR, PUT, QUI, RIS, VAL. No evaluada.
NO Suramérica.
Callejas 3618 (HUA, MICH, MO).

Bunchosia brevistyla

W.R.Anderson

Anderson 1995.
Arbusto.
Endémica. Andes. 1800 m.
VAL. No evaluada.
Devia 2208 (MICH, MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

Bunchosia brevisurcularis

Dobson

Arbusto, árbol.
Nativa. Caribe, Pacífico. 0-460 m.
ANT, CHO, CÓR. No evaluada.
NO Colombia y Panamá.
Roldán 1194 (COL, HUA, MICH, MO).

Bunchosia cauliflora

W.R.Anderson

Anderson, W. 1997.
Arbusto, árbol.
Nativa. Amazonia. 120-180 m.
AMA. No evaluada.
Colombia y Ecuador.
Galeano 1156 (COL).

Bunchosia cestrifolia

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, arbolito.
Nativa. Andes, V Magdalena. 880-2950 m.
BOY, CAU, CES, CUN, HUI, NSA, SAN. No evaluada.
Gentry 8990 (MICH, MO, NY).

Bunchosia decussiflora

W.R.Anderson

Anderson 1981.
Árbol.
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 270-325 m.
CAQ, MET, PUT. No evaluada.
Amazonia.
Sánchez 2744 (COAH).

***Bunchosia diphylla* (Jacq.)**

Cuatrec. & Croat

Bunchosia columbica Nied., *Byrsonima diphylla* (Jacq.) DC.
Anderson, W. 2001d.
Arbusto, arbolito, árbol.

Nativa. Caribe, V Magdalena.
5-600 m.
ATL, BOL, BOY, CES, MAG. No
evaluada.
N Colombia y Venezuela.
Ramírez 4577 (JAUM, MO).

***Bunchosia dwyeri* Cuatrec. & Croat**

Anderson, W. 2007b.
Arbusto, árbol.
Nativa. Andes. 1100 m.
ANT. No evaluada.
Colombia a Nicaragua.
Sánchez 1347 (COL, HUA,
MEDEL, MO).

***Bunchosia glandulifera* (Jacq.) Kunth**

Cuatrecasas 1958c; Anderson
1981.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa y cultivada. Amazonia,
Andes, Guayana y Macarena,
Caribe, Orinoquia, V Magdalena.
70-2250 m.
AMA, ANT, BOL, CAQ, CAS,
CUN, GUV, MET, PUT, SAN,
TOL, VAU, VIC. No evaluada.
Suramérica.
Zarucchi 1655 (COAH, COL,
GH, MICH, MO).
NOTA: ampliamente cultivada
por sus frutos comestibles y
como ornamental. Prob. no es
nativa en Colombia / widely
cultivated for its edible fruits and
as an ornamental; maybe not
native to Colombia.

***Bunchosia hartwegiana* Benth.**

Bunchosia hartwegiana f. *linearis*
Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, árbol.
Endémica. Caribe, V Magdalena.
50-600 m.
ANT, BOL, CAL, CES, CUN,
SAN. No evaluada.

N Colombia.
Gentry 15432 (COL, MICH,
MO).

[*Bunchosia hookeriana* A.Juss.]

Cuatrecasas 1958c.
NOTA: registro basado en
identificación errónea.
Corresponde a *B. decussiflora*
/ record based on a
misidentification; corresponds to
B. decussiflora.

***Bunchosia macrophylla* Rose**

Bunchosia macrophylla var.
chocoensis Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c; Anderson, W.
2007b.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa. Pacífico. 0-170 m.
ANT, CHO. No evaluada.
NO Colombia a Nicaragua.
Roldán 611 (COL, HUA, MO).

***Bunchosia nitida* (Jacq.) A.Rich.**

Bunchosia cornifolia Kunth
Anderson, W. 2001d.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa y cultivada. Andes,
Caribe, Orinoquia, Pacífico, V
Cauca, V Magdalena. 0-1830 m.
ANT, BOL, BOY, CAS, CAU,
CHO, CUN, HUI, QUI, RIS,
TOL, VAL. No evaluada.
Nicaragua a Ecuador.
Haught 4896 (COL, US).

***Bunchosia odorata* (Jacq.) Juss.**

Bunchosia pilosa Kunth
Cuatrecasas 1958c; Anderson, W.
2001d.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa. Caribe. 5-350 m.
ATL, BOL, GUJ, MAG, NSA,
SUC. No evaluada.
N Colombia y Venezuela.

Smith 844 (A, COL, GH, MICH,
MO, NY, WIS).

***Bunchosia petraea* W.R.Anderson**

Anderson, W. 1997.
Arbusto.
Nativa. Orinoquia? 40 m.
VIC? No evaluada.
SO Venezuela.
NOTA: esperada. Se describió
en Venezuela, cerca de Puerto
Carreño (Vichada) / expected;
described from Venezuela, near
Puerto Carreño (Vichada).

***Bunchosia pseudonitida* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa. Andes, Islas Caribeñas, V
Cauca, V Magdalena. 50-1600 m.
ANT, CAU, CUN, HUI, NSA,
QUI, RIS, SUC, TOL, VAL. No
evaluada.
Colombia y Ecuador.
Pérez-Arbeláez 6395 (COL, F, US).

***Bunchosia retusa* Triana & Planch.**

Bunchosia pilosa var. *retusa*
(Triana & Planch.) Nied.
Cuatrecasas 1958c.
Árbol.
Endémica. Andes. 1300 m.
CUN. No evaluada.
Pérez-Arbeláez 2014 (COL, US).

***Bunchosia swartziana* Griseb.**

Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa. Islas Caribeñas. 50 m.
SAP. No evaluada.
SE México a Nicaragua; Antillas.
Toro 20 (COL, NY).

***Bunchosia systyla* (Nied.) Dobson**

Árbol.

Nativa. Amazonia. 180 m.
AMA. No evaluada.
Colombia y Brasil.
Duivenvoorden 138 (MICH).

***Bunchosia* sp. nov. 1**

Árbol.
Endémica. V Cauca. 500-700 m.
ANT. No evaluada.
Soejarto 2929 (COL, GH, HUA, MO).
NOTA: conocida solo del tipo /
known only from the type.

***Bunchosia* sp. nov. 2**

Arbusto, árbol.
Nativa y cultivada. Andes. 1050-
2700 m.
ANT, CAL, CUN, NAR, PUT,
QUI, TOL, VAL. No evaluada.
Colombia y Ecuador.
Hodge 6695 (GH, MEDEL).

***Bunchosia* sp. nov. 3**

Arbusto, arbolito.
Nativa. Andes. 1500-2100 m.
ANT, CAU, CHO. No evaluada.
Colombia y Ecuador.
Forero 2265 (COL, MO).

***Burdachia* Endl.**

2 especies

Burdachia prismatocarpa

A.Juss.

Burdachia prismatocarpa var.
argutivenosa Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c; Anderson, W.
2001a.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa. Amazonia, Orinoquia.
80-350 m.
AMA, CAQ, CAS, GUI, VAU,
VIC. No evaluada.
O Amazonia (Colombia, Perú,
Brasil, Venezuela).
Zarucchi 2237 (COL, GH, HUA,
MICH).

Burdachia prismatocarpa var.
loretoensis W.R.Anderson,
Burdachia prismatocarpa var.
prismatocarpa
NOTA: Cuatrecasas (1958) usó
el nombre *B. sphaerocarpa* para
plantas de *B. prismatocarpa* var.
loretoensis / Cuatrecasas (1958)
used the name *B. sphaerocarpa*
for plants of *B. prismatocarpa*
var. *loretoensis*.

Burdachia sphaerocarpa

A.Juss.

Burdachia atractoides Nied.
Anderson 1981; Anderson, W.
2001a.
Arbusto, árbol.
Nativa. Amazonia. 85-200 m.
AMA, GUI. No evaluada.
SE Colombia, SO Venezuela, NO
Brasil, Guyana.
Galeano 5948 (COAH, COL,
MO).

***Byrsonima* Kunth**

36 especies, 5 especies endémicas

***Byrsonima aerugo* Sagot**

Anderson, W. 2001a.
Árbol.
Nativa. Andes, Pacífico. 112-
1060 m.
ANT, NAR. No evaluada.
N Suramérica.
Callejas 3994 (COL, HUA,
MICH, MO).

***Byrsonima amoena* Cuatrec.**

Byrsonima ciliata Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c; Anderson
1981; Anderson, W. 2001a.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa. Amazonia, Guayana y
Macarena. 100-810 m.
AMA, CAQ, GUI, GUV, VAU.
No evaluada.
Colombia, Perú y Brasil.
Maguire 44154 (COL, MICH,
NY, US).

Byrsonima arthropoda

A.Juss.

Byrsonima magna Cuatrec.
Anderson, W. 2007b.
Árbol.
Nativa. Amazonia, Andes,
Orinoquia, Pacífico, V Cauca, V
Magdalena. 5-1100 m.
AMA, ANT, CAU, MET, PUT,
SAN, VAL. No evaluada.
Costa Rica a Bolivia y Brasil.
Brant 1226 (COL, HUA, MICH,
MO).

Byrsonima bronweniana

W.R.Anderson

Anderson 1981; Anderson, W.
2001a.
Arbusto, árbol.
Nativa. Amazonia. 120 m.
GUI. No evaluada.
SE Colombia, SO Venezuela, NO
Brasil.
Liesner 9091 (COL, MICH, MO).
Nota: Cuatrecasas (1958) usó
el nombre *B. angustifolia* para
esta especie; dicho nombre es
el basónimo de *Blepharandra*
angustifolia / Cuatrecasas (1958)
used the name *B. angustifolia*
for this species; that name is
the basonym of *Blepharandra*
angustifolia.

Byrsonima bucidifolia

Standl.

Arbusto.
Nativa. Islas Caribeñas. 0-85 m.
SAP. No evaluada.
Península de Yucatán (México);
Isla Providencia (Colombia).
Idrobo 11661 (COL).

Byrsonima chrysophylla

Kunth

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W.
2001a.
Arbusto, árbol.
Nativa. Amazonia, Orinoquia.
65-350 m.

AMA, GUI, VAU, VIC. No evaluada.
Amazonia.
Cárdenas 4159 (COAH, MO).

***Byrsonima concinna* Benth.**

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.
Arbusto, arbolito.
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 200-350 m.
AMA, CAQ. No evaluada.
N Suramérica.
Mendoza 9419 (COAH).

***Byrsonima coniophylla* A.Juss.**

Anderson, W. 2001a.
Arbusto, árbol.
Nativa. Amazonia. 80-200 m.
GUI, VAU. No evaluada.
Colombia, Venezuela y Brasil.
García-Barriga 20889 (COL, GH).

***Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth**

Byrsonima crassifolia subsp. *insulata* Cuatrec., *Byrsonima crassifolia* var. *lanceolata* Cuatrec., *Byrsonima cumingiana* A.Juss.
Cuatrecasas 1958c; Cuatrecasas & Croat 1981.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Islas Caribeñas, Caribe, Orinoquia, Pacífico, SN Santa Marta, V Magdalena. 0-2500 m.
ANT, ARA, BOL, BOY, CAQ, CAS, CAU, CES, CHO, CÓR, CUN, GUI, GUJ, GUV, HUI, MAG, MET, NSA, SAP, SAN, SUC, TOL, VAU, VIC. No evaluada.
México a Bolivia, Paraguay y Brasil; Antillas.
Callejas 7008 (COAH, HUA, MICH, MO).

***Byrsonima crispa* A.Juss.**

Byrsonima adenophylla Triana & Planch., *Byrsonima carmeniana* Cuatrec.
Anderson, W. 2001a.
Árbol.
Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Orinoquia, Pacífico, V Cauca, V Magdalena. 60-1400 m.
ANT, CAQ, GUV, MET, NAR. No evaluada.
Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia.
Castro 5908 (COAH).

***Byrsonima cuprea* Griseb.**

Anderson, W. 2001a.
Arbusto, arbolito, árbol.
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 110 m.
GUI. No evaluada.
Amazonia de Colombia, Venezuela y Brasil.
Cárdenas 17100 (COAH).

***Byrsonima fernandezii* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2001a.
Árbol.
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 230 m.
CAQ, GUI, GUV. No evaluada.
O Amazonia (Colombia, Brasil, Venezuela).
Eusse 1318 (COAH).

Byrsonima flexipes

W.R.Anderson

Anderson, W. 2001a; Anderson, W. 2001b.
Árbol.
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 90-350 m.
AMA, CAQ. No evaluada.
Colombia y Venezuela.
Cárdenas 6944 (COAH, MO).

***Byrsonima frondosa* A.Juss.**

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.
Árbol.
Nativa. Guayana y Macarena? 118 m.
GUI? No evaluada.
Amazonia de Venezuela y Brasil.
NOTA: esperada; conocida de cerca del río Negro, en Venezuela y Brasil; esperada en Guainía / expected; known near the río Negro in Venezuela and Brazil; expected in Guainía.

***Byrsonima garcibarrigae* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson 1981.
Árbol.
Nativa. Amazonia, Andes, Pacífico, V Cauca, V Magdalena. 40-1800 m.
AMA, ANT, CHO, VAU. No evaluada.
Colombia, Perú, Brasil.
Gentry 23827 (COL, HUA, MICH, MO).

***Byrsonima hypoleuca* Turcz.**

Cuatrecasas 1958c.
Árbol.
Nativa. Andes, Pacífico. 112-1780 m.
ANT, BOY, CAS, NSA, SAN. No evaluada.
N Colombia y Venezuela.
Cuatrecasas 27957 (COL, K, US).

***Byrsonima japurensis* A.Juss.**

Byrsonima inundata Benth., *Byrsonima japurensis* subsp. *fluminensis* (Nied.) Cuatrec., *Byrsonima japurensis* subsp. *silvatica* Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c; Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.
Arbusto, arbolito, árbol.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia. 100-450 m.

AMA, CAQ, CAS, GUV, MET, PUT, VAU, VIC. No evaluada.

O Amazonia.

Zarucchi 2111 (COAH, COL, K, MICH).

Byrsonima krukoffii

W.R.Anderson

Anderson 1995.

Árbol.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 200-249 m.

GUV, MET, PUT. No evaluada.

O Amazonia y Guayanas.

Galíndez 319 (COAH).

***Byrsonima laevis* Nied.**

Anderson, W. 2001a.

Arbusto, arbolito, árbol.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 100-455 m.

CAQ, GUI. No evaluada.

NO Amazonia (Colombia, Venezuela, Brasil).

Cárdenas 4016 (COAH, MO).

Byrsonima linguifera

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2001a.

Arbusto, arbolito, árbol.

Nativa. Amazonia, Orinoquia. 100-223 m.

GUV, VIC. No evaluada.

O Amazonia, de Colombia y Venezuela a Bolivia.

Giraldo-Cañas 2610 (COAH, COL, HUA).

Byrsonima luetzelburgii

Steyerm.

Byrsonima cretacea Nied.

Anderson 1981.

Árbol.

Nativa. Amazonia. 110-250 m.

GUI, VAU. No evaluada.

SE Colombia, SO Venezuela, NO Brasil.

Pabón 317 (COL).

Byrsonima nemoralis

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.

Árbol.

Endémica. Andes, Pacífico. 10-620 m.

CAU, CHO, VAL. No evaluada.

O Colombia.

Forero 6028 (CHOCO, COL, MICH, MO).

Byrsonima nitidissima

Kunth

Cuatrecasas 1958c; Anderson

1981; Anderson, W. 2001a.

Arbusto, arbolito, árbol.

Nativa. Orinoquia. 90-120 m.

VIC. No evaluada.

Alto río Orinoco, Colombia y Venezuela.

Córdoba 1262 (COL, MO).

Byrsonima oblongifolia

A.Juss.

Subarbusto.

Nativa. Orinoquia. 100-250 m.

MET, VIC. No evaluada.

E Colombia, E Bolivia y Brasil.

Vincelli 1190 (COL).

Byrsonima poeppigiana

A.Juss.

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.

Árbol.

Nativa. Amazonia. 120-600 m.

AMA, CAQ. No evaluada.

O Amazonia.

Cárdenas 9202 (COAH).

Byrsonima punctulata

A.Juss.

Byrsonima barkleyana Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2001a.

Arbusto, arbolito, árbol.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia. 90-250 m.

AMA, GUI, VAU, VIC. No evaluada.

N Amazonia (Colombia, Venezuela, Brasil).

Zarucchi 2235 (COAH, COL, K, MICH).

Byrsonima putumayensis

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.

Árbol.

Nativa. Andes. 1350-1400 m.

PUT. No evaluada.

S Colombia a Perú.

Betancur 5301 (COL).

Byrsonima schultesiana

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.

Árbol.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia. 200-486 m.

AMA, MET, VAU. No evaluada.

Colombia, Perú y Brasil.

García-Barriga 14108 (COAH, COL, NY, US).

NOTA: muy cercana a *B.*

arthropoda / closely related to *B. arthropoda*.

***Byrsonima spicata* (Cav.)**

Kunth

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2001a.

Arbusto, árbol.

Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Caribe, Orinoquia, Pacífico, V Cauca, V Magdalena. 5-1156 m.

ANT, BOL, BOY, CAL, CAQ, CAS, CHO, Cór, CUN, GUI, GUJ, GUV, MET, NSA, SAN, TOL, VIC. No evaluada.

Panamá a N Suramérica;

Antillas.

Callejas 3589 (COL, HUA, MICH, MO).

***Byrsonima verbascifolia* (L.) DC.**

Byrsonima verbascifolia var. *denudata* Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c; Anderson 1981.

Subarbusto.

Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Caribe, Orinoquia. 100-1700 m.

BOY, CAQ, CAS, GUJ, GUV, MET, SAN, VIC. No evaluada. Honduras a S Brasil.

Zarucchi 3701 (COAH, MICH, MO).

Byrsonima wurdackii

W.R.Anderson

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.

Arbolito, árbol.

Nativa. Amazonia. 180 m.

VAU. No evaluada.

Mejía 108 (COAH, COL, HUA).

***Byrsonima* sp. nov. 1**

Árbol.

Endémica. Andes. 1100-2300 m. ANT, NAR, RIS, SAN, VAL. No evaluada.

Sánchez 426 (COL, HUA, MEDEL).

***Byrsonima* sp. nov. 2**

Árbol.

Nativa. Amazonia, Pacífico. 100 m.

AMA, CHO, VAL. No evaluada. Colombia y Perú.

Sastre 3336 (COL, MICH, P, VEN).

***Byrsonima* sp. nov. 3**

Subarbusto.

Endémica. Orinoquia. 180 m. MET. No evaluada.

Pinto 1503 (COL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Byrsonima* sp. nov. 4**

Árbol.

Endémica. Andes. 1710-2300 m. SAN. No evaluada.

Rentería 669 (COL, HUA, MO, NY).

***Byrsonima* sp. nov. 5**

Árbol.

Endémica. SN Santa Marta. 1100-1200 m.

MAG. No evaluada.

N Colombia.

Madriñán 550 (GH, MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Callaeum* Small**

1 especie

Callaeum antifebrile

(Griseb.) D.M.Johnson

Johnson 1986.

Liana.

Nativa. Amazonia. 200 m.

AMA. No evaluada.

Amazonia.

Idrobo 8318 (COL).

***Carolus* W.R.Anderson**

1 especie

Carolus sinemariensis

(Aubl.) W.R.Anderson

Mascagnia hondensis

C.V.Morton, *Mascagnia*

schizoptera (Turcz.) Cuatrec.,

Mascagnia sinemariensis (Aubl.) Griseb.

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2001a; Anderson 2006.

Liana.

Nativa. Andes, Guayana y Macarena, Caribe, Orinoquia,

Pacífico, V Cauca, V Magdalena. 30-2200 m.

ANT, CHO, CÓR, CUN, HUI, MET, SAN, TOL. No evaluada.

México a Suramérica N de 4°S; Antillas menores.

Brant 1260 (COL, HUA, MICH, MO).

***Christianella* W.R.Anderson**

2 especies

Christianella glandulifera

(Cuatrec.) W.R.Anderson

Mascagnia glandulifera Cuatrec. Cuatrecasas 1958c; Anderson 2006.

Liana.

Nativa. Amazonia. 250 m.

AMA, VAU. No evaluada.

O Amazonia (Colombia, Perú, Brasil, Venezuela).

Schultes 13594 (COL, GH, MICH, US).

Christianella mesoamericana

(W.R.Anderson)

W.R.Anderson

Mascagnia mesoamericana

W.R.Anderson

Anderson 2006; Anderson, W. 2007b.

Liana.

Nativa. Pacífico? 140 m.

CHO? No evaluada.

SE México a Panamá.

NOTA: esperada; conocida de Darién (Panamá); esperada en Chocó / expected; known from Darién (Panama); expected in Chocó.

***Diacidia* Griseb.**

1 especie

Diacidia galphimiioides

Griseb.

Diacidia parvifolia Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c; Anderson 1981; Anderson, W. 2001a. Subarbusto, arbusto, arbolito. Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 65-680 m. CAQ, GUI, GUV, VAU. No evaluada. SE Colombia, SO Venezuela, NO Brasil. *Davis 202* (COL, MICH). NOTA: véase Anderson (2001a) para discusión de *D. parvifolia* / see Anderson (2001a) for a discussion of *D. parvifolia*.

***Dicella* Griseb.**

1 especie

***Dicella julianii* (J.F.Macbr.)**

W.R.Anderson

Anderson, W. 1975; Chase 1981. Liana. Nativa. Amazonia, V Cauca. 100-900 m. AMA, ANT, VAU. No evaluada. Colombia, Ecuador, Perú y O Brasil. *Callejas 4467* (HUA, MICH, MO).

***Diplopterys* Nied.**

10 especies, 1 especie endémica

Diplopterys cabrerana

(Cuatrec.) B.Gates

Banisteriopsis cabrerana Cuatrec. Cuatrecasas 1958c; Gates 1982. Liana. Nativa y cultivada. Amazonia, Andes. 100-720 m. AMA, PUT, VAU. No evaluada. Amazonia. *Klug 1971* (A, BR, COL, F, G, GH, M, MEDEL, MICH, MO, NY, P, S, SP, U, US, W).

***Diplopterys cristata* (Griseb.)**

W.R.Anderson & C.Davis

Banisteriopsis cristata (Griseb.) Cuatrec. Gates 1982; Anderson & Davis 2006. Trepadora, liana. Nativa. Caribe. 100-200 m. GUJ. No evaluada. NE Colombia, N Venezuela Guyana y Surinam. *Saravia 2168* (COL).

Diplopterys erianthera

(A.Juss.) W.R.Anderson & C.Davis

Banisteriopsis erianthera (A.Juss.) B.Gates Gates 1982; Anderson & Davis 2006. Liana. Nativa. Amazonia. 100 m. AMA. No evaluada. O Amazonia. *Rudas 1440* (MICH, MO).

Diplopterys heterostyla

(A.Juss.) W.R.Anderson & C.Davis

Banisteria jasminellum A.Juss., *Banisteriopsis heterostyla* (A.Juss.) Cuatrec. Cuatrecasas 1958c; Gates 1982; Anderson & Davis 2006. Liana. Endémica. Caribe, V Magdalena. 0-630 m. ATL, BOL, CES, GUJ, MAG, SAN. No evaluada. *Smith 1524* (BR, COL, G, MICH, MO, NY, P, US).

Diplopterys krukoffii

(B.Gates) W.R.Anderson & C.Davis

Banisteriopsis krukoffii B.Gates Gates 1982; Anderson & Davis 2006.

Liana.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 200 m. CAQ. No evaluada. Colombia, Brasil y Venezuela. *Stevenson 1580* (COAH).

Diplopterys longialata

(Nied.) W.R.Anderson & C.Davis

Banisteriopsis longialata (Nied.) B.Gates, *Banisteriopsis rusbyana* (Nied.) Morton Gates 1982; Anderson & Davis 2006. Liana. Nativa. Amazonia. 400-600 m. CAQ, PUT. No evaluada. O Suramérica. *Cuatrecasas 8985* (COL, F, US).

***Diplopterys lucida* (Rich.)**

W.R.Anderson & C.Davis

Banisteriopsis lucida (Rich.) Small Gates 1982; Anderson & Davis 2006. Liana. Nativa. Andes, SN Santa Marta, V Magdalena. 110-1600 m. ANT, CES, MAG, SAN. No evaluada. Suramérica. *Romero-Castañeda 10091* (COL, NY).

***Diplopterys nutans* (Nied.)**

W.R.Anderson & C.Davis

Banisteriopsis nutans (Nied.) B.Gates Gates 1982; Anderson & Davis 2006. Liana. Nativa. Amazonia. 350 m. GUV. No evaluada. O Suramérica y E Panamá. *Ramírez 7027* (COAH).

Diplopterys platyptera
(Griseb.) W.R.Anderson &
C.Davis

Banisteriopsis platyptera
(Griseb.) Cuatrec.
Gates 1982; Anderson & Davis
2006.
Liana.
Nativa. Caribe? 0-40 m.
DESCONOCIDO. No evaluada.
Tierras bajas del Atlántico, de
Panamá a Pernambuco (Brasil).
NOTA: esperada / expected.

Diplopterys pubipetala
(A.Juss.) W.R.Anderson &
C.Davis

Banisteriopsis pubipetala
(A.Juss.) Cuatrec.
Gates 1982; Anderson & Davis
2006.
Liana.
Nativa. Amazonia, Andes,
Guayana y Macarena, Orinoquia,
Pacífico, V Magdalena. 50-1180
m.
ANT, CAQ, MET, NSA, PUT,
VAL, VAU. No evaluada.
Colombia y Venezuela a Bolivia y
Paraguay.
Zarucchi 1817 (COL, MICH).

***Ectopopterys* W.R.Anderson**
1 especie

Ectopopterys soejartoi
W.R.Anderson
Anderson, W. 1997.
Liana.
Nativa. V Cauca, V Magdalena.
400-900 m.
ANT. No evaluada.
Colombia, Ecuador y Perú.
Fonnegra 1396 (GH, HUA, MO).

***Gaudichaudia* Kunth**
1 especie

Gaudichaudia albida
Schltdl. & Cham.
Cuatrecasas 1958c.
Trepadora.
Nativa. Andes. 1500-2250 m.
BOY, CES, SAN. No evaluada.
México a Venezuela.
Cuatrecasas 1931 (COL, F, US).

***Glandonia* Griseb.**
1 especie

Glandonia williamsii
Steyerm.
Cuatrecasas 1958c; Anderson, W.
2001a.
Arbusto, arbolito.
Nativa. Amazonia, Guayana y
Macarena. 180 m.
GUI, VAU. No evaluada.
SE Colombia, SO Venezuela, NO
Brasil.
Zarucchi 2236 (COL, GH, HUA,
MICH).

***Heteropterys* Kunth**
28 especies, 3 especies endémicas

Heteropterys actinocenia
W.R.Anderson
Anderson 1982.
Liana.
Nativa. Amazonia? 180 m.
AMA? No evaluada.
Amazonia de Perú.
NOTA: esperada; conocida de N
Loreto (Perú) / expected; known
from N Loreto (Peru).

[*Heteropterys acutifolia*
A.Juss.]
Cuatrecasas 1958c.
NOTA: registro basado en
identificación errónea;
corresponde a *H. macradena*
/ record based on a
misidentification; corresponds to
H. macradena.

Heteropterys alata
(W.R.Anderson)
W.R.Anderson
Heteropterys beecheyana var.
alata W.R.Anderson
Anderson, C. 2001a.
Arbusto, trepadora, liana.
Nativa. Amazonia, Andes,
Guayana y Macarena, Orinoquia,
V Magdalena. 112-700 m.
CAL, CAQ, CAS, GUI, GUV,
MET, VIC. No evaluada.
Colombia y Venezuela.
Betancur 1589 (COAH, HUA,
MICH, MO).

Heteropterys atabapensis
W.R.Anderson
Anderson 1981; Anderson, W.
2001a.
Subarbusto, arbusto, arbolito.
Nativa. Amazonia, Guayana y
Macarena. 80-400 m.
GUI, VAU. No evaluada.
SE Colombia, SO Venezuela.
Maguire 36282 (COL, MICH,
NY).

Heteropterys aureosericea
Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c.
Liana.
Nativa. Amazonia. 160 m.
AMA. No evaluada.
O Amazonia (Colombia,
Ecuador, Perú, Brasil).
Jaramillo 8038 (COAH, COL,
VEN).

Heteropterys ayacuchensis
W.R.Anderson
Anderson, W. 2001a.
Arbusto.
Nativa. Orinoquia? 68 m.
VIC? No evaluada.
Río Orinoco, Venezuela.
NOTA: esperada; conocida
de cerca de Puerto Ayacucho
(Venezuela), frente a Vichada

/ expected; known near Puerto Ayacucho (Venezuela) across Vichada.

Heteropterys berteriana

A.Juss.

Heteropterys formosa C.V.Morton & Cuatrec., *Heteropterys pauciflora* var. *granatensis* Nied. Cuatrecasas 1958c. Trepadora, liana. Nativa. Caribe. 4-400 m. ATL, BOL, CES, GUJ, MAG. No evaluada. N Colombia y Venezuela. Cuadros 4561 (COL, JBG, MICH, MO).

[*Heteropterys brachiata* (L.) DC.]

Cuatrecasas 1958c. NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde a *H. alata* / record based on a misidentification; corresponds to *H. alata*.

Heteropterys colombiana

W.R.Anderson

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2007a. Arbusto, trepadora. Endémica. Caribe, V Magdalena. 30-700 m. CES, GUJ, MAG, SAN. No evaluada. NE Colombia. Cuatrecasas 27966 (COL, K). NOTA: Cuatrecasas (1958) usó para estas plantas el nombre *H. tomentosa*, especie de S Brasil, Paraguay y zonas adyacentes de Bolivia / Cuatrecasas (1958) used for these plants the name *H. tomentosa*, a species from S Brazil, Paraguay and adjacent areas of Bolivia.

***Heteropterys complicata* (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis**

Clonodia complicata (Kunth) W.R.Anderson, *Skolioterys lehmanniana* (Nied.) Cuatrec. Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2001a; Anderson & Davis 2007. Arbusto, arbolito, liana. Nativa. Caribe, Orinoquia. 5-170 m. ARA, BOL, CAS, Cór, VIC. No evaluada. Colombia y Venezuela. Callejas 4400 (COL, HUA, MICH, MO, NY).

Heteropterys floridana

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c. Liana. Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia, V Cauca, V Magdalena. 150-620 m. ANT, CAQ, GUV, VIC. No evaluada. Colombia y Perú. Callejas 5301 (HUA, MICH, MO).

[*Heteropterys gayana*

A.Juss.]

Cuatrecasas 1958c. NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde a *H. lonicerifolia* / record based on a misidentification; corresponds to *H. lonicerifolia*.

***Heteropterys laurifolia* (L.)**

A.Juss.

Arbusto, arbolito, liana. Nativa. Andes, Caribe, V Magdalena. 20-1290 m. CUN, MAG, SAN, SUC, TOL. No evaluada. México a Bolivia; Antillas. Haught 6279 (COL).

***Heteropterys leona* (Cav.)**

Exell

Heteropterys multiflora (DC.) Hochr. Anderson, C. 2001b. Arbusto, liana. Nativa. Pacífico. 5-190 m. CHO, VAL. No evaluada. Belice a Brasil, O Colombia, costa atlántica de África. Forero 4109 (COL, MO).

Heteropterys lonicerifolia

Triana & Planch.

Trepadora. Nativa. Andes, Caribe. 60-1790 m. BOY, CUN, MAG. No evaluada. N Colombia y Venezuela. Kirkbride 2559 (COL, NY). NOTA: Cuatrecasas (1958) usó para esta especie el nombre *H. gayana*, sinónimo de la especie endémica de México *H. cotinifolia* / Cuatrecasas (1958) used for this species the name *H. gayana*, a synonym of the Mexican endemic *H. cotinifolia*.

Heteropterys macradena

(DC.) W.R.Anderson

Anderson, W. 2001a. Arbusto, arbolito, liana. Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Caribe, Orinoquia, Pacífico, V Magdalena. 30-1000 m. AMA, ANT, CAQ, CAS, GUJ, GUV, HUI, MAG, MET, VAU, VIC. No evaluada. N Suramérica. Zarucchi 3453 (COAH, GH, MICH, MO). NOTA: Cuatrecasas (1958) usó para esta especie el nombre *H. acutifolia*, sinónimo de *H. orinocensis* / Cuatrecasas (1958) used for this species the name *H. acutifolia*, a synonym of *H. orinocensis*.

Heteropterys macrostachya**A.Juss.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.

Arbusto, liana.

Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Caribe, Orinoquia, V Cauca, V Magdalena. 60-1830 m.

AMA, ANT, CAQ, CUN, GUV, MAG, MET, NSA, SAN, TOL, VAU. No evaluada.

SE México a Bolivia y Brasil.

Giraldo-Cañas 2505 (COAH, COL, HUA, MO).***Heteropterys magnifica*****W.R.Anderson**

Anderson 1990b.

Liana.

Nativa. Amazonia? 130 m.

AMA? No evaluada.

Amazonia de Perú.

NOTA: esperada; conocida de N Loreto (Perú) / expected; known from N Loreto (Peru).

Heteropterys nervosa* A.Juss.Heteropterys mossii* (C.V.Morton) Cuatrec.

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.

Liana.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 130-850 m.

AMA, CAQ, GUI, GUV, MET, VAU. No evaluada.

Suramérica a Bolivia y Paraguay. *Zarucchi 1926* (COL, GH, MICH).***Heteropterys oblongifolia*****Gleason**

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.

Subarbusto, arbusto, arbolito.

Nativa. Amazonia?, Guayana y Macarena? 130 m.

GUI? No evaluada.

SO Venezuela.

NOTA: esperada. Conocida de Amazonas (Venezuela), frente a Guainía / expected; known from Amazonas (Venezuela), opposite Guainía.

Heteropterys obovata* (Small)*Cuatrec. & Croat**

Cuatrecasas & Croat 1981.

Liana.

Nativa. Pacífico? 140 m.

CHO? No evaluada.

Guatemala a Panamá.

NOTA: esperada; conocida de Darién (Panamá), cerca de la frontera con Colombia / expected; known of Darién (Panama), near the border with Colombia.

Heteropterys occidentalis**Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Nativa. Andes, Pacífico, V Cauca. 540-1250 m.

NAR, PUT, QUI, RIS, VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador y Perú.

Cuadros 1302 (COL, MO).***Heteropterys olivacea*****(Cuatrec.) W.R.Anderson***Stigmaphyllon olivaceum*

Cuatrec.

Anderson 1981.

Liana.

Endémica. Amazonia, Guayana y Macarena. 250-270 m.

AMA, VAU. No evaluada.

Colombia.

Cortés 624 (COAH, COL).***Heteropterys orinocensis*****(Kunth) A.Juss.***Heteropterys helicina* Griseb.

Anderson, W. 2001a.

Liana.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia. 50-500 m. AMA, CAS, GUI, GUV, VIC. No evaluada.

Amazonia.

García-Barriga 20811 (COL, GH).

NOTA: crece a lo largo de los ríos / grows along rivers.

Heteropterys prunifolia**(Kunth) W.R.Anderson***Heteropterys purpurea* var. *puberula* Nied., *Heteropterys rhombifolia* Rusby, *Heteropterys venezolensis* Nied.

Cuatrecasas 1958c; Anderson 1987.

Liana.

Nativa. Caribe, V Magdalena. 10-600 m.

ATL, BOL, CES, HUI, MAG. No evaluada.

Panamá, Colombia y Venezuela. *Haught 3959* (COL, MICH).***Heteropterys quetepensis*****Steyerm.**

Anderson, W. 2001a.

Arbusto, arbolito.

Nativa. Orinoquia? 68 m.

VIC? No evaluada.

Venezuela.

NOTA: esperada; conocida de cerca de Puerto Paéz (Apure) y Puerto Ayacucho (Amazonas), en Venezuela / expected; known near Puerto Páez (Apure), and Puerto Ayacucho (Amazonas) in Venezuela.

Heteropterys racemosa**A.Juss.***Atopocarpus papillosus* Cuatrec., *Clonodia racemosa* (A.Juss.)

Nied.

Cuatrecasas 1958c; Cuatrecasas 1960; Anderson & Davis 2007.

Liana.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 180-200 m.

GUI, GUV, VAU. No evaluada.
Amazonia de Colombia y Brasil.
Davis 214 (COL, MICH).

Heteropterys riparia

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.
Árbol, liana.
Nativa. Amazonia, Orinoquia.
100-300 m.
AMA, MET, PUT, VAU. No evaluada.
O Amazonia.
Schultes 12428 (COL, GH, US).

Heteropterys rudasii

W.R.Anderson

Anderson 1995.
Trepadora.
Endémica. Amazonia. 100 m.
AMA. No evaluada.
Rudas 2221 (COL, MICH, MO).
NOTA: conocida solo del tipo /
known only from the type.

Heteropterys siderosa

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.
Liana.
Nativa. Amazonia, Guayana y
Macarena. 270 m.
VAU. No evaluada.
Amazonia.
Zarucchi 1327 (COL, MICH).

[*Heteropterys tomentosa*

A.Juss.]

Cuatrecasas 1958c.
NOTA: registro basado en
identificación errónea;
corresponde a *H. colombiana*
/ record based on a
misidentification; corresponds to
H. colombiana.

***Heteropterys uribei* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.
Liana.

Nativa. Amazonia, Andes. 320-
1650 m.
CAQ, CUN. No evaluada.
NO Suramérica.
Gentry 9139 (COL, MICH, MO).

Hiraea Jacq.

28 especies, 8 especies endémicas

***Hiraea affinis* Miq.**

Anderson, W. 2001a.
Liana.
Nativa. Amazonia, Guayana y
Macarena. 130 m.
GUV, MET. No evaluada.
N Suramérica.
Muñoz 14 (COAH).

***Hiraea apaporiensis* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson
1981; Anderson, W. 2001a.
Arbusto, arbolito, liana.
Nativa. Amazonia, Guayana y
Macarena. 100-350 m.
AMA, MET, VAU. No evaluada.
NO Amazonia (Colombia,
Venezuela, Brasil).
García-Barriga 14215 (COL, NY,
US).

***Hiraea brachyptera* Triana &
Planch.**

Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, arbolito, liana.
Nativa. Pacífico. 0-100 m.
CAU, CHO, NAR, VAL. No
evaluada.
O Colombia y NO Ecuador.
Juncosa 2099 (CUVC, MICH,
MO).

***Hiraea cephalotes* Triana &
Planch.**

Cuatrecasas 1958c.
Liana.
Nativa. Andes. 1000-1850 m.
ANT, CAU, CES, HUI, NAR,
QUI, RIS, VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador.
Cuatrecasas 18775 (COL, F, US).

Hiraea colombiana

C.V.Morton

Cuatrecasas 1958c.
Liana.
Nativa. Andes. 2200-2800 m.
NSA. No evaluada.
Colombia y Venezuela.
Killip 19824 (A, GH, NY, US).

***Hiraea crassipes* A.Juss.**

Liana.
Nativa. Amazonia. 130 m.
AMA. No evaluada.
O Amazonia.
Sánchez 5685 (COAH).
NOTA: identificación provisional,
basada en material estéril /
tentative identification based on
sterile material.

Hiraea escobariae

C.E.Anderson

Anderson 2013.
Liana.
Endémica. Andes. 1100-1850 m.
ANT, CUN. No evaluada.
Vertientes de la cuenca del río
Magdalena.
Escobar 6331 (HT: MICH; IT:
COL?, HUA?).

***Hiraea fagifolia* (DC.)**

A.Juss.

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W.
2001a.
Arbusto, liana.
Nativa. Amazonia, Orinoquia,
Pacífico, V Magdalena. 5-900 m.
AMA, ANT, CAL, CHO, GUV,
MET, SAN. No evaluada.
SE México a Suramérica (excepto
Chile y Uruguay).
Fuchs 21813 (COL, MICH, MO,
NY, US).

Hiraea faginea* (Sw.) Nied.Hiraea chrysophylla* A.Juss.

Anderson, W. 2001a.

Liana.

Nativa. Pacífico. 0-120 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Nicaragua a Guayanas y Brasil N del río Amazonas.

Feddema 2046 (COL, MICH, NY, US).***Hiraea ferruginea* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Endémica. Andes. 1550-1945 m.

VAL. No evaluada.

Croat 79976 (CUVC, MO).***Hiraea fimbriata*****W.R.Anderson**

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.

Liana.

Nativa. Orinoquia. 170 m.

VIC. No evaluada.

E Colombia y Venezuela.

Cuatrecasas 4089 (COL, US).***Hiraea guapecita* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Nativa. Pacífico. 0-5 m.

CAU, VAL. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.

Lozano 5886 (COL).***Hiraea holmgreniorum*****C.E.Anderson**

Anderson 2013.

Liana.

Nativa. Amazonia? 100 m.

AMA? No evaluada.

SE Colombia?, NO Brasil.

NOTA: esperada; recolectada en Vila Bittencourt, Amazonas (Brasil), justo en la frontera con Amazonas / expected; collected in Vila Bittencourt, Amazonas

(Brazil), right on the border with Amazonas.

Hiraea hypoleuca**W.R.Anderson**

Anderson, W. 1997.

Liana.

Nativa. Andes, V Cauca. 820-1680 m.

ANT, SAN. No evaluada.

N Colombia y NO Venezuela.

Callejas 8802 (HUA, MICH, NY).***Hiraea idroboana* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.

Trepadora.

Endémica. Andes, Guayana y Macarena. 1300-2000 m.

CAU, MET, NAR. No evaluada.

Benavides 526 (COL).***Hiraea klugii* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Nativa. Amazonia. 200 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

S Colombia, NE Ecuador, N Perú.

Klug 1609 (A, GH, MO, NY, S, US).

NOTA: no se sabe si el tipo, del río Putumayo, se recolectó en Colombia o en Perú. Es la única colección de Colombia / it is not known whether the type, from the Putumayo River, was collected in Colombia or Peru; this is the only collection from Colombia.

***Hiraea mutisiana* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.

Trepadora.

Endémica. Andes. 1750-2500 m.

CUN, RIS. No evaluada.

García-Barriga 12555 (COL, US).***Hiraea opulifolia* (Rusby)****Nied.**

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Endémica. SN Santa Marta. 1060 m.

MAG. No evaluada.

N Colombia.

Smith 1512 (COL, MICH, NY).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Hiraea pachypoda* Nied.**

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Nativa. Andes. 650-1920 m.

CAU, CUN. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Galeano 7258 (COL).*Hiraea pachypoda* var. *caucana* Cuatrec.***Hiraea putumayensis*****C.V.Morton & Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Nativa. Amazonia. 325 m.

PUT. No evaluada.

Amazonia de Colombia y Ecuador.

Klug 1892 (A, BM, F, GH, K, MICH, MO, NY, S, US).

NOTA: conocida en Colombia solo del tipo / known in Colombia only from the type.

[*Hiraea quapara* (Aubl.) Sprague]

Cuatrecasas 1958c.

NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde a *H. smilacina* / record based on a misidentification; corresponds to *H. smilacina*.***Hiraea reclinata* Jacq.***Hiraea kunthiana* A.Juss., *Hiraea obovata* (Kunth) Nied.

Cuatrecasas 1958c.
Trepadora, liana.
Nativa. Caribe, Pacífico, V
Magdalena. 0-590 m.
ANT, ATL, BOL, CES, CHO,
CÓR, MAG, SUC. No evaluada.
México a N Suramérica.
Smith 1508 (COL, GH, MICH,
MO, NY, UC, US).

Hiraea sanctae-marthae

C.V.Morton

Cuatrecasas 1958c.
Liana.
Endémica. Caribe. 10-200 m.
ATL, CES, MAG. No evaluada.
NE Colombia.
Dugand 6276 (COL, NY, US).

***Hiraea schultesii* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson
1981.
Arbolito, liana.
Nativa. Amazonia. 270 m.
AMA, VAU. No evaluada.
Colombia, Brasil y Perú.
Sastre 3331 (COL, MICH, P).

***Hiraea sclerophylla* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.
Liana.
Endémica. V Magdalena. 300-
500 m.
TOL. No evaluada.
Pennell 3560 (GH, NY, US).
NOTA: conocida solo del tipo /
known only from the type.

***Hiraea smilacina* Standl.**

Hiraea pittieri Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c; Anderson, W.
2007b.
Arbusto, trepadora, liana.
Nativa. Amazonia, Andes. 290-
2100 m.
CAQ, CAU, PUT. No evaluada.
Costa Rica a Ecuador.
Cuatrecasas 11120 (COL, F, US).

NOTA: Cuatrecasas (1958) usó
para esta especie el nombre *H.*
quapara, especie restringida a
las Guayanas y zonas aledañas
de Brasil. Véase discusión en
Anderson (1993) / Cuatrecasas
(1958) used for this species the
name *H. quapara*, a species
restricted to the Guianas and
adjacent areas of Brazil; see
discussion in Anderson (1993).

***Hiraea ternifolia* (Kunth)**

A.Juss.

Hiraea platytriphyllo Hochr.,
Hiraea ternifolia var. *eglandulosa*
Triana & Planch., *Hiraea*
ternifolia var. *granatensis*
Nied., *Hiraea ternifolia* var.
humboldtiana Nied., *Hiraea*
ternifolia var. *robustior* Cuatrec.,
Hiraea ternifolia f. *glandulosa*
Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, arbolito, liana.
Nativa. Andes, Guayana y
Macarena, Caribe, Orinoquia, V
Magdalena. 70-2730 m.
ANT, BOY, CHO, CUN, GUJ,
MET, NSA, TOL. No evaluada.
Panamá a Venezuela y Perú.
García-Barriga 11845 (COL, NY,
US).

***Hiraea transiens* Nied.**

Liana.
Endémica. Andes, Pacífico.
0-1200 m.
ANT, CES, CHO. No evaluada.
NO Colombia.
Acevedo 6863 (HUA, MICH,
MO, NY, US).

***Hiraea villosa* Nied.**

Niendenzu 1928.
Liana.
Nativa. V Magdalena. 120 m.
NSA, TOL. No evaluada.
Colombia y Perú.
Araque 18NS119 (US).

***Jubelina* A.Juss.**

4 especies

**[*Jubelina bracteosa* (Griseb.)
Cuatrec.]**

Cuatrecasas 1958c.
NOTA: registro basado en
identificación errónea.
Corresponde a *J. grisebachiana*
/ record based on a
misidentification; corresponds to
J. grisebachiana.

Jubelina grisebachiana

W.R.Anderson

Anderson 1990a.
Liana.
Nativa. Amazonia. 115-370 m.
GUI, VAU. No evaluada.
SE Colombia, SO Venezuela, NO
Brasil.
Cuatrecasas 7255 (COL, US).
NOTA: Cuatrecasas (1958) usó
para estas plantas el nombre *J.*
bracteosa. Véase la discusión en
Anderson (1990a) / Cuatrecasas
(1958) used for this species the
name *J. bracteosa*; see discussion
in Anderson (1990a).

Jubelina magnifica

W.R.Anderson

Anderson 1981; Anderson
1990a; Anderson, W. 2001a.
Liana.
Nativa. Guayana y Macarena?
130 m.
GUI? No evaluada.
SO Venezuela.
NOTA: esperada; conocida de los
alrededores de San Carlos de río
Negro (Venezuela), en la frontera
con Guainía / expected; known
around San Carlos de río Negro
(Venezuela), on the border with
Guainía.

***Jubelina uleana* (Nied.)**

Cuatrec.

Anderson 1990a.

Liana.

Nativa. Amazonia? 200 m.

PUT? No evaluada.

Amazonia de Ecuador y Perú.

NOTA: esperada; conocida de la Amazonia de Ecuador y Perú. Esperada en Putumayo / expected; known in the Amazon of Ecuador and Peru; expected in Putumayo.

Jubelina wilburii

W.R.Anderson

Anderson 1990a.

Liana.

Nativa. V Cauca, V Magdalena. 150-822 m.

ANT. No evaluada.

NO Colombia a Costa Rica.

Cárdenas 2681 (JAUM, MICH).

***Lophanthera* A.Juss.**

4 especies, 1 especie endémica

Lophanthera longifolia

(Kunth) Griseb.

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.

Arbusto, arbolito, árbol.

Nativa. Amazonia?, Orinoquia? 118 m.

GUI?, VIC? No evaluada.

NOTA: esperada; conocida de cerca de los ríos Orinoco y Negro, en Amazonas (Venezuela), frente a Vichada y Guainía / expected; known near the Orinoco and the río Negro in Amazonas (Venezuela) opposite Vichada and Guainía.

***Lophanthera pendula* Ducke**

Anderson 1981.

Arbusto, arbolito.

Nativa. Guayana y Macarena? 118 m.

GUI? No evaluada.

NO Brasil.

NOTA: esperada; conocida del Alto río Negro y sus afluentes en Amazonas (Brasil); esperada en Guainía / expected; known from the Upper río Negro and its tributaries in Amazonas (Brazil); expected in Guainía.

Lophanthera spruceana

Nied.

Anderson 1981.

Arbusto, arbolito.

Nativa. Amazonia. 350 m.

VAU. No evaluada.

Amazonia de Colombia y Brasil.

Betancur 10081 (COAH, COL).

***Lophanthera* sp. nov.**

Arbusto.

Endémica. Pacífico. 0 m.

CHO. No evaluada.

O Colombia.

Fuchs 21771 (COL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lophopterys* A.Juss.**

1 especie

Lophopterys inpana

W.R.Anderson

Anderson & Davis 2001.

Arbusto, liana.

Nativa. Guayana y Macarena? 97 m.

GUI? No evaluada.

Amazonia.

NOTA: esperada; conocida de cerca de San Fernando de Atabapo (Venezuela), al otro lado de la frontera / expected; known near San Fernando de Atabapo (Venezuela), across the border.

***Malpighia* L.**

4 especies

Malpighia albiflora

(Cuatrec.) Cuatrec.

Stigmaphyllon albiflorum
Cuatrec.

Anderson, W. 2007b.

Arbusto, arbolito.

Nativa. Pacífico. 0-200 m.

ANT, CAU, CHO. No evaluada.

Colombia a Nicaragua.

Acevedo 6917 (COL, HUA, MICH, US).

***Malpighia emarginata* DC.**

Anderson, W. 2001c.

Arbusto, arbolito.

Nativa y cultivada. Andes, Caribe, Orinoquia, V Cauca, V Magdalena. 10-1600 m.

ANT, ARA, ATL, BOL, Cór, GUJ, HUI, MAG, NSA, SUC, TOL, VAL. No evaluada.

México a NO Suramérica.

Zarucchi 3852 (MICH, MO).

NOTA: prob. nativa en las tierras bajas del Caribe, pero cultivada o naturalizada en otros lugares. Cuatrecasas (1958) usó para esta especie el nombre *M. puniceifolia*, sinónimo de *M. glabra* / prob. native to the Caribbean lowlands, but elsewhere cultivated or naturalized. Cuatrecasas (1958) used for this species the name *M. puniceifolia*, a synonym of *M. glabra*.

***Malpighia glabra* L.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2007b.

Arbusto, arbolito, árbol.

Nativa y cultivada. Andes, Caribe, Pacífico, V Cauca, V Magdalena. 0-2100 m.

ANT, ATL, BOL, CAU, CES, CHO, CUN, GUJ, HUI, MAG, NAR, SAN, SUC, TOL, VAL. No evaluada.

Texas (Estados Unidos) a Perú y Venezuela; Antillas Mayores.

Zarucchi 5466 (CHOCO, COL, HUA, MICH, MO).

NOTA: nativa hasta elevaciones de 800 m; colecciones de mayor elevación prob. son de plantas cultivadas / native up to of 800 m; collections from higher elevations are prob. cultivated plants.

[*Malpighia puniceifolia* L.]

Cuatrecasas 1958c.

NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde a *M. emarginata* / record based on a misidentification; corresponds to *M. emarginata*.

Malpighia romeroana

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2007b.

Arbusto, arbolito, árbol.

Nativa. Pacífico, V Magdalena. 2-400 m.

ANT, CHO, SAN. No evaluada. Colombia a México.

Cárdenas 688 (JAUM, MO).

***Malpighiodes* Nied.**

1 especie

Malpighiodes liesneri

(W.R.Anderson)

W.R.Anderson

Anderson, W. 2001a; Anderson 2006.

Liana.

Nativa. Guayana y Macarena? 118 m.

GUI? No evaluada.

S Venezuela.

NOTA: esperada. Conocida de San Carlos de río Negro (Amazonas, Venezuela), al otro lado de la frontera / expected; known from San Carlos de río

Negro (Amazonas, Venezuela), across the border.

***Mascagnia* (DC.) Bertero**

15 especies, 3 especies endémicas

***Mascagnia allopterys* (Moris)**

W.R.Anderson

Mascagnia tenuis Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2007a.

Trepadora.

Nativa. Caribe, V Magdalena. 5-80 m.

BOL, CES. No evaluada.

N Colombia, Panamá.

Callejas 4401 (COL, HUA, MICH, MO).

Mascagnia arenicola

C.E.Anderson

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C. 2001a.

Trepadora, liana.

Nativa. Amazonia, Andes, Orinoquia, Pacífico, V Magdalena. 40-1500 m.

AMA, ANT, CAU, NSA, VAU.

No evaluada.

N Suramérica.

García-Barriga 18280 (COL, GH, NY, US).

NOTA: Cuatrecasas (1958) usó para esta especie el nombre *M. sepium*, correspondiente a una especie de SE Brasil / Cuatrecasas (1958) used for this species the name *M. sepium*, corresponding to a species from SE Brazil.

Mascagnia conformis

W.A.Anderson

Anderson, W. 2007a.

Liana.

Nativa. Amazonia?, Orinoquia? 68 m.

AMA?, VIC? No evaluada.

Amazonia a Bolivia.

NOTA: esperada; conocida de Pevas (Loreto, Perú), cerca

de Amazonas (Colombia), y de cerca de Puerto Ayacucho (Venezuela), al otro lado del río Orinoco, en Vichada / expected; known Pevas (Loreto, Peru) near Amazonas (Colombia), and near Puerto Ayacucho (Venezuela), across the Rio Orinoco in Vichada.

Mascagnia cynanchifolia

Griseb.

Anderson, W. 2001a.

Liana.

Nativa. Guayana y Macarena? 97 m.

GUI? No evaluada.

O Amazonia.

NOTA: esperada; conocida de cerca de San Fernando de Atabapo (Venezuela), al otro lado del río Atabapo / expected; known from near San Fernando de Atabapo (Venezuela), across the Rio Atabapo.

Mascagnia dissimilis

C.V.Morton & Moldenke

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Nativa. Andes, Guayana y Macarena, V Cauca, V Magdalena. 200-1070 m.

ANT, BOY, CAQ. No evaluada.

O Suramérica.

Soejarto 3928 (COL, HUA, MO, NY).

Mascagnia divaricata

(Kunth) Nied.

Mascagnia oblongifolia (DC.) Nied.

Cuatrecasas 1958c; Anderson 1993.

Trepadora, liana.

Nativa. Amazonia, Caribe, Orinoquia, Pacífico, V Cauca. 5-400 m.

AMA, ANT, ARA, BOL, Cór, GUJ, MAG, MET, NSA, VAL. No evaluada.

Nicaragua a Argentina.

Haught 3606 (COL, US).

NOTA: esta es la especie que Cuatrecasas (1958) llamó *M. ovatifolia*, que en realidad es el nombre correcto de lo que él llamó *M. nervosa* (ver Anderson 1993) / this is the species that Cuatrecasas (1958) called *M. ovatifolia*, which is actually the correct name for what he called *M. nervosa* (see Anderson 1993).

Mascagnia eggersiana

(Nied.) W.R.Anderson

Anderson 1981; Anderson, W. 2001a.

Liana.

Nativa. Amazonia?, Orinoquia? 68 m.

PUT?, VIC? No evaluada.

NO Suramérica.

NOTA: esperada; conocida de cerca del río Orinoco (Venezuela) y N Napo (Ecuador) / expected; known near the Orinoco (Venezuela) and N Rio Napo (Ecuador).

***Mascagnia lorentensis* Morton**

Trepadora.

Nativa. Amazonia. 130 m.

AMA. No evaluada.

Amazonia de Colombia, Perú y Brasil.

Zarucchi 1030 (GH, MICH).

Mascagnia lugoi

W.R.Anderson

Anderson, W. 1997.

Liana.

Nativa. Amazonia? 290 m.

PUT? No evaluada.

O Amazonia.

NOTA: esperada; conocida de las proximidades del lago Agrio (Sucumbíos, Ecuador), cerca de la frontera / expected; known near Lago Agrio (Sucumbíos, Ecuador), near the border.

***Mascagnia macradena* (DC.)**

Nied.

Hiraea macradena var.

angustifolia A.Juss., *Mascagnia americana* Bertero, *Mascagnia cordifolia* subsp. *thiantha* Nied.

Nieden zu 1928; Cuatrecasas 1958c.

Trepadora, liana.

Nativa. Caribe, Orinoquia, V Cauca. 0-600 m.

ANT, ARA, BOL, CES, GUJ, MAG, SUC. No evaluada.

N Colombia y Venezuela.

Smith 336 (A, COL, GH, MICH, MO, NY).

Mascagnia ovatifolia

(Kunth) Griseb.

Mascagnia nervosa Nied.

Cuatrecasas 1958c; Anderson 1993.

Trepadora, liana.

Nativa. Caribe, Orinoquia, Pacífico, V Magdalena. 0-1000 m.

ANT, ARA, ATL, BOL, CES, GUJ, MAG, MET, SAN. No evaluada.

Panamá, Colombia, Venezuela y Trinidad.

Davidse 5457 (COL, MO).

NOTA: esta es la especie que Cuatrecasas (1958) llamó *M. nervosa*; lo que él llamó *M. ovatifolia* es en realidad *M. divaricata*. Ver Anderson (1993) / this is the species that Cuatrecasas (1958) called *M. nervosa*; what he called *M. ovatifolia* is actually *M. divaricata*. See Anderson (1993).

[*Mascagnia pauciflora*

(G.Mey.) Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.

NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde a *Carolus sinemariensis* / record based on a

misidentification; corresponds to *Carolus sinemariensis*.

Mascagnia pittieri

C.V.Morton

Cuatrecasas 1958c.

Trepadora.

Endémica. Andes. 1200-1600 m.

VAL. No evaluada.

Pittier 900 (US).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

[*Mascagnia sepium* (A.Juss.) Griseb.]

Cuatrecasas 1958c.

NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde a *M. arenicola* / record based on a misidentification; corresponds to *M. arenicola*.

***Mascagnia tenuifolia* Nied.**

Liana.

Nativa. Amazonia. 200 m.

AMA. No evaluada.

O Amazonia.

Duque 4834 (COAH).

***Mascagnia violacea* (Triana & Planch.) Nied.**

Hiraea violacea var. *pubescens*

Triana & Planch.

Cuatrecasas 1958c.

Trepadora, liana.

Endémica. Andes, V Magdalena. 300-1320 m.

CUN, TOL. No evaluada.

García-Barriga 12178 (AAU, COL, US).

***Mascagnia* sp. nov.**

Trepadora.

Endémica. Pacífico. 40 m.

ANT. No evaluada.

Brand 315 (HUA, MO).

Mezia Nied.

2 especies

Mezia includens (Benth.)**Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2001a.

Liana.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 210-1400 m.

AMA, MET, VAU. No evaluada.

N Suramérica.

Phiipson 1939 (COL, US).

Mezia rufa W.R.Anderson

Anderson, W. 2001a.

Liana.

Nativa. Guayana y Macarena. 90-200 m.

AMA. No evaluada.

Amazonia de Colombia, Venezuela y Perú.

López 10786 (COAH, UDBC).

Niendenzuella W.R.Anderson

4 especies, 1 especie endémica

Niendenzuella castanea**(Cuatrec.) W.R.Anderson***Heteropterys castanea* Cuatrec.,*Mascagnia castanea* (Cuatrec.)

W.R.Anderson

Anderson, W. 2001a; Anderson 2006.

Liana.

Nativa. Amazonia? 130 m.

GUI?, VAU? No evaluada.

Amazonia de Venezuela y Brasil.

NOTA: esperada. Conocida de Amazonas (Venezuela) y Amazonas (Brasil). Esperada en Guainía, Vaupés o Amazonas / expected; known from Amazonas (Venezuela) and Amazonas (Brazil); expected in Guainía, Vaupés or Amazonas.

Niendenzuella metensis**(Cuatrec.) W.R.Anderson***Tetrapteryx metensis* Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c; Anderson 2006.

Liana.

Endémica. Orinoquia.

MET. No evaluada.

Apollinaire s.n. (US).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

Niendenzuella poeppigiana**(A.Juss.) W.R.Anderson***Mascagnia poeppigiana* (A.Juss.)W.R.Anderson, *Mascagnia**subsericea* Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c; Anderson 1981; Anderson 2006.

Liana.

Nativa. Amazonia. 250 m.

AMA. No evaluada.

Suramérica a Rio de Janeiro.

Rodríguez 14 (COAH, UDBC).

Niendenzuella stannea**(Griseb.) W.R.Anderson***Mascagnia benthamiana*

(Griseb.) W.R.Anderson,

Mascagnia sericans Nied.,*Mascagnia stannea* (Griseb.)

Nied.

Anderson 1981; Anderson 2006.

Liana.

Nativa. Amazonia, V Magdalena. 150-500 m.

AMA, SAN. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia.

Schultes 3827A (COL, GH).

Pterandra A.Juss.

2 especies, 2 especies endémicas

Pterandra colombiana**C.E.Anderson**

Anderson, C. 1997b.

Árbol.

Endémica. V Cauca, V

Magdalena. 70-900 m.

ANT, CAL. No evaluada.

Callejas 4667 (COL, HUA, MICH, MO, NY).

Pterandra ultramontana**Cuatrec.**

Anderson, C. 1997b.

Árbol.

Endémica. Pacífico. 10-100 m.

CAU, VAL. No evaluada.

SO Colombia.

Gentry 40472 (COL, JAUM, MICH, MO).

Spachea A.Juss.

3 especies, 1 especie endémica

Spachea herbert-smithii**(Rusby) Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.

Arbolito, árbol.

Endémica. Andes, Caribe,

SN Santa Marta, V Cauca, V Magdalena. 100-1300 m.

ANT, BOL, CAL, MAG, SAN,

TOL. No evaluada.

N Colombia.

Cogollo 779 (COL, HUA, MICH).

Spachea membranacea**Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.

Arbusto, arbolito.

Nativa. Pacífico. 100 m.

ANT. No evaluada.

NO Colombia y Panamá.

Plowman 3180 (COL, F, GH, HUA, K, US).

Spachea tricarpa A.Juss.

Cuatrecasas 1958c.

Árbol.

Nativa. Amazonia. 100-200 m.

AMA, CAQ. No evaluada.

Amazonia de Colombia, Perú y Brasil.

Restrepo 588 (COAH, MO, NY).

***Stigmaphyllon* A.Juss.**

28 especies, 9 especies endémicas

***Stigmaphyllon adenodon*
A.Juss.**

Stigmaphyllon kuhlmannii Pilg.
Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Liana.

Nativa. Amazonia. 100-325 m.

AMA, PUT. No evaluada.

Amazonia; Tobago, Granada,
Trinidad y N Venezuela.

Zarucchi 1058 (COL, GH, K,
MICH).

Stigmaphyllon adenodon var.
adenodon.

***Stigmaphyllon alternans*
Triana & Planch.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Liana.

Nativa. Amazonia, Orinoquia.
360-450 m.

CAQ, MET. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

Callejas 5892 (HUA, MO).

***Stigmaphyllon*
bannisterioides (L.)**

C.E.Anderson

Banisteria picta Kunth,
Stigmaphyllon ovatum (Cav.)
Nied.

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora.

Nativa. Caribe, Pacífico. 0 m.

ANT, ATL, BOL, CHO, SUC. No
evaluada.

Costa atlántica de México a
Brasil; Antillas; costa atlántica de
África.

Callejas 5019 (COL, HUA,
MICH).

***Stigmaphyllon bogotense*
Triana & Planch.**

Stigmaphyllon bogotense var.
subglabratum (Nied.) Nied.,
Stigmaphyllon ruizianum var.
subglabratum Nied.

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Liana.

Nativa. Andes, SN Santa Marta,
V Cauca. 400-3200 m.

ANT, BOY, CAL, CAQ, CAU,
CES, CUN, HUI, MAG, MET,
NAR, NSA, PUT, QUI, RIS,
SAN, TOL, VAL. No evaluada.

Costa Rica y Andes.

Luteyn 5081 (COL, MICH, MO,
NY, US).

***Stigmaphyllon cardiophyllum*
A.Juss.**

Anderson, C. 1997a.

Liana.

Nativa. Amazonia? 100 m.

AMA?, PUT? No evaluada.

Amazonia.

NOTA: esperada. Conocida en N
Ecuador y Perú y O Amazonas
(Brasil) / expected; known in
N Ecuador and Peru, and W
Amazonas (Brazil).

***Stigmaphyllon ciliatum*
(Lam.) A.Juss.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora.

Nativa. Pacífico. 0 m.

ANT. No evaluada.

Costa atlántica de Belice a
Uruguay.

Haught 4838 (COL, US).

***Stigmaphyllon columbicum*
Nied.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora.

Nativa. Andes, Caribe, Pacífico,
V Cauca, V Magdalena. 30-3200
m.

ANT, BOL, BOY, CAL, CES,
CHO, CUN, MAG, SAN, SUC,
TOL. No evaluada.

Costa Rica, Colombia y Ecuador.

Cuatrecasas 8283 (CM, COL, F,
US).

***Stigmaphyllon dichotomum*
(L.) Griseb.**

Banisteria variifolia DC.,
Stigmaphyllon humboldtianum
(DC.) A.Juss., *Stigmaphyllon*
tiliifolium Nied., *Stigmaphyllon*
tiliifolium var. *berteroanum* Nied.
Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Hierba, liana.

Nativa. Andes, Caribe,
Orinoquia, Pacífico, V Cauca, V
Magdalena. 0-1300 m.

ANT, ATL, BOL, BOY, CAL,
CES, CHO, CUN, MAG, MET,
NSA, SAN, TOL. No evaluada.

Panamá, Colombia y Venezuela.

Smith 1525 (A, BM, BR, C, CM,
COL, F, G, GH, LL, MA, MO,
MT, NY, P, S, TEX, U, US, W,
WIS).

***Stigmaphyllon echitoides*
Triana & Planch.**

Stigmaphyllon ipomoeoides
Planch. & Triana

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora, liana.

Endémica. Andes, Pacífico, V
Cauca, V Magdalena. 100-2300
m.

ANT, CAU, CES, HUI, NAR,
NSA, VAL. No evaluada.

Hutchison 3122 (COL, F, K, MO,
NY, US).

***Stigmaphyllon ellipticum*
(Kunth) A.Juss.**

Stigmaphyllon ellipticum var.
intermedium (Nied.) Nied.,
Stigmaphyllon ellipticum var.
nicaraguense (Nied.) Nied.
Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora, liana.

Nativa. Andes, Caribe, Pacífico.
0-1480 m.

ANT, ATL, CAU, CES, CHO,
GUJ, MAG, NAR, VAL. No
evaluada.

México a NO Suramérica.

Smith 341 (A, BM, BR, CM,
COL, F, G, GH, K, MA, MICH,
MO, MT, NY, P, S, TEX, U, US,
UTD).

***Stigmaphyllon florosum*
C.E.Anderson**

Anderson, C. 1997a.

Liana.

Nativa. Amazonia? 130 m.
AMA?, PUT? No evaluada.
O Amazonia.

NOTA: esperada; conocida en
NE Ecuador y Perú (Loreto) /
expected; known in NE Ecuador
and Peru (Loreto).

***Stigmaphyllon goudotii*
C.E.Anderson**

Anderson, C. 1997a.

Trepadora.

Endémica. Andes. 1200-1310 m.

ANT, TOL, VAL. No evaluada.

Callejas 5608 (COL, HUA,
MICH).

***Stigmaphyllon herbaceum*
Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora, liana.

Nativa. Caribe, Pacífico, V
Cauca, V Magdalena. 86-1000 m.

ANT, BOL, BOY, CAL, CAU,
CHO, Cór, NAR, SAN, VAL.
No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Callejas 4690 (COL, HUA,
MICH).

***Stigmaphyllon hypargyreum*
Triana & Planch.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora, liana.

Nativa. Andes, Pacífico. 350-
2250 m.

ANT, CHO, MET. No evaluada.

Colombia y Panamá.

Barkley 1815 (BM, COL, F,
MEDEL).

***Stigmaphyllon lacunosum*
A.Juss.**

Anderson, C. 1997a.

Trepadora, liana.

Nativa. Amazonia. 100-130 m.

AMA. No evaluada.

Amazonia de Colombia, Perú y
Brasil.

Schultes 6882 (COL, US).

***Stigmaphyllon lindenianum*
A.Juss.**

Anderson, C. 1997a.

Trepadora, liana.

Nativa. Pacífico. 5-40 m.

CHO. No evaluada.

NO Colombia a SE México.

Forero 9226 (COL, MO).

***Stigmaphyllon maynense*
Huber**

Anderson, C. 1997a.

Liana.

Nativa. Amazonia? 100 m.

PUT? No evaluada.

O Amazonia.

NOTA: esperada; conocida en NE
Ecuador / expected; known in
NE Ecuador.

***Stigmaphyllon orientale*
Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora.

Endémica. Orinoquia. 100-480
m.

MET. No evaluada.

Ramírez 13353 (CAUP, COL).

***Stigmaphyllon puberum*
(Rich.) A.Juss.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora, liana.

Nativa. Amazonia, Guayana y
Macarena, Orinoquia, Pacífico.
0-520 m.

AMA, ANT, CHO, GUV, MET,
PUT. No evaluada.

Centroamérica a N Suramérica;
Antillas.

Callejas 5745 (HUA, MICH,
MO).

***Stigmaphyllon romeroi*
Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora.

Endémica. Caribe. 30 m.

BOL. No evaluada.

Romero-Castañeda 9838 (AAU,
COL, US).

***Stigmaphyllon sarmentosum*
Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.

Trepadora.

Nativa. Andes. 2350-2450 m.

CUN. No evaluada.

Colombia, Ecuador y NO Perú.

Grant 9576 (COL, NY, US, WIS).

***Stigmaphyllon singulare*
C.E.Anderson**

Anderson, C. 1997a.

Trepadora.

Nativa. Andes. 1200 m.
NSA. No evaluada.
NE Colombia y NO Venezuela.
Schlim 251 (BM, BR, G, K, P).

***Stigmaphyllon sinuatum*
(DC.) A.Juss.**

Stigmaphyllon brachiatum
Triana & Planch., *Stigmaphyllon*
martianum A.Juss.,
Stigmaphyllon splendens (DC.)
Cuatrec.

Anderson, C. 1997a.
Trepadora, liana.
Nativa. Amazonia, Guayana y
Macarena, Orinoquia, V Cauca,
V Magdalena. 40-800 m.
AMA, ANT, BOY, CAQ, GUI,
GUV, MET, NSA, SAN, VAU,
VIC. No evaluada.
N Suramérica.
Schultes 8222 (COL, GH, US).

***Stigmaphyllon stenophyllum*
C.E.Anderson**

Anderson, C. 1997a.
Trepadora.
Endémica. Andes. 2000-2500 m.
ANT. No evaluada.
David 500 (HUA).

***Stigmaphyllon suffruticosum*
Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.
Trepadora.
Endémica. Andes, V Cauca. 680-
1500 m.
CAQ, RIS, VAL. No evaluada.
SO Colombia.
Idrobo 10031 (COL).

***Stigmaphyllon tergalanatum*
Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.
Trepadora.
Endémica. V Magdalena. 850 m.

HUI. No evaluada.
Fosberg 19230 (NY, US).
NOTA: conocida solo del tipo /
known only from the type.

***Stigmaphyllon velutinum*
Triana & Planch.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.
Trepadora.
Endémica. Andes, V Magdalena.
800-2300 m.
ANT, CAL, CUN, NSA, QUI,
RIS. No evaluada.
Silverstone-Sopkin 7689 (CUVC,
MICH).

***Stigmaphyllon venulosum*
Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c; Anderson, C.
1997a.
Trepadora.
Endémica. Andes, Orinoquia.
400-2800 m.
ANT, BOY, CAL, QUI, RIS, VAL.
No evaluada.
Zarucchi 4732 (COL, HUA, K,
MICH, MO).

***Tetrapteryx* Cav.**

27 especies, 6 especies endémicas

***Tetrapteryx acapulcensis*
Kunth**

Tetrapteryx crispa f. *granatensis*
Nied.
Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, liana.
Nativa. Andes, V Cauca, V
Magdalena. 400-1720 m.
ANT, CUN, HUI, TOL. No
evaluada.
Colombia y Ecuador.
Forero 9337 (COL).

***Tetrapteryx benthamii* Triana
& Planch.**

Tetrapteryx jamesonii var.
granatensis Nied.

Cuatrecasas 1958c.
Liana.
Endémica. Andes. 700-2500 m.
CAU, HUI, NAR, VAL. No
evaluada.
Fernández 46 (COL).

***Tetrapteryx calophylla*
A.Juss.**

Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, liana.
Nativa. Amazonia, Andes,
Orinoquia. 250-1420 m.
CUN, GUV, MET. No evaluada.
N Suramérica.
Giraldo-Cañas 2483 (COAH,
COL, HUA, MO).

***Tetrapteryx chloroptera*
Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.
Liana.
Nativa. Amazonia, Guayana y
Macarena, Orinoquia, V Cauca.
113-900 m.
CAS, GUV, MET, RIS. No
evaluada.
Colombia y Venezuela.
Cuatrecasas 7501 (COL, US).

***Tetrapteryx crispa* A.Juss.**

Tetrapteryx alternifolia Cuatrec.
Cuatrecasas 1958c.
Arbusto, liana.
Nativa. Andes, Caribe,
Orinoquia, V Magdalena. 10-
1300 m.
ATL, BOL, CES, GUJ, MAG,
MET, NSA, SAN, TOL. No
evaluada.
Panamá a Bolivia y E Brasil.
Haught 3854 (COL, MO).

***Tetrapteryx diptera* Cuatrec.**

Cuatrecasas 1958c.
Liana.
Nativa. Andes, Pacífico, V
Magdalena. 80-2000 m.

ANT, CHO, SAN, VAL. No evaluada.
Colombia y Venezuela.
McPherson 13296 (COL, HUA, MICH, MO).

***Tetrapteryx discolor* (G.Mey.) DC.**

Tetrapteryx cuspidata Triana & Planch.

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Nativa. Amazonia, Andes, Orinoquia, V Cauca, V Magdalena. 100-1900 m.
ANT, CAL, CUN, GUV, MET, PUT, SAN, VAL, VIC. No evaluada.

México a N Suramérica.
Callejas 7246 (COL, HUA, MICH).

***Tetrapteryx goudotiana* Triana & Planch.**

Tetrapteryx macrocarpa I.M.Johnst.

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Nativa. Amazonia, Caribe, Pacífico, V Magdalena. 110-860 m.

ANT, BOL, CAQ, CAU, CES, GUJ, PUT, SAN, SUC. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.
Zarucchi 4015 (COL, MICH, MO).

***Tetrapteryx gracilis* W.R.Anderson**

Anderson, W. 2001a.

Subarbusto, arbusto.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 120 m.

GUI, VAU. No evaluada.

Colombia y Venezuela.
Zarucchi 1962 (COL, GH, MICH).

Tetrapteryx hirsutula

Cuatrec. & Croat

Cuatrecasas & Croat 1981.

Liana.

Nativa. Pacífico? 140 m.

CHO? No evaluada.

NOTA: esperada; conocida de Darién (Panamá) / expected; known from Darién (Panama).

***Tetrapteryx jamesonii* Turcz.**

Trepadora.

Nativa. Andes. 1820-2600 m.

NAR. No evaluada.

SO Colombia, Ecuador.

Saravia 1836 (COL).

NOTA: identificación provisional / provisional identification.

***Tetrapteryx magnifolia* Griseb.**

Liana.

Nativa. V Cauca, V Magdalena. 100-400 m.

ANT, CES. No evaluada.

Colombia, Ecuador y Perú.

Cogollo 523 (COL, HUA, MO).

***Tetrapteryx mucronata* Cav.**

Tetrapteryx silvatica Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c; Anderson 1981.

Arbusto, liana.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia, Pacífico. 120-280 m.

AMA, BOY, CAS, CHO, GUI, GUV, PUT, VAU. No evaluada.
Costa Rica a Bolivia.

Zarucchi 2205 (COAH, COL, GH, MICH).

NOTA: véase en Anderson (1981, p. 266) la discusión del problema de la amplia variación en esta especie / see discussion of the problem of wide variation of this species in Anderson (1981, p. 266).

Tetrapteryx natans

W.R.Anderson

Anderson, W. 2007a.

Liana.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 100-300 m.

AMA, CAQ. No evaluada.

Amazonia de Colombia, Perú y Brasil.

Navarro 1208 (COAH, UDBC).

***Tetrapteryx nitida* A.Juss.**

Tetrapteryx pallida Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.

Trepadora, liana.

Nativa. Amazonia. 66-220 m.

AMA. No evaluada.

O Amazonia.

Schultes 10400i (COL, US).

***Tetrapteryx papyracea* Triana & Planch.**

Arbusto, trepadora, liana.

Endémica. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Orinoquia. 100-680 m.

AMA, CAQ, CUN, MET, PUT. No evaluada.

E Colombia.

Barbosa 8086 (COAH, COL, MA, MO).

***Tetrapteryx seemannii* Triana & Planch.**

Tetrapteryx alloicarpa Rusby

Cuatrecasas 1958c; Anderson, W. 2007b.

Trepadora, liana.

Nativa. Caribe, Pacífico. 30-300 m.

ANT, ATL, BOL, MAG, SUC. No evaluada.

Costa Rica a Venezuela.

Feddema 1908 (COL, MICH).

Tetrapteryx splendens

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.

Trepadora, liana.

Endémica. Andes, V Magdalena.
740-2100 m.

ANT, BOY, QUI, SAN. No
evaluada.

De Escobar 8836 (HUA, MICH,
TEX).

***Tetrapteryx styloptera* A.Juss.**

Tetrapteryx boliviensis Nied.,

Tetrapteryx boliviensis var.

granatensis Nied., *Tetrapteryx*

methystica R.E.Schult.,

Tetrapteryx squarrosa (Griseb.)

Griseb., *Tetrapteryx tenuistachys*

Rusby

Cuatrecasas 1958c; Anderson

1981; Anderson, W. 2001a.

Arbusto, trepadora, liana.

Nativa. Amazonia, Caribe,

Orinoquia, Pacífico, V Cauca, V
Magdalena. 60-1300 m.

AMA, ANT, CES, CHO, Cór,

GUI, GUJ, MAG, MET, NSA,

SAN, SUC, VAU. No evaluada.

Nicaragua a Bolivia y Guayana
Francesa.

Zarucchi 1892 (COAH, COL,
GH, MICH).

Tetrapteryx subaptera

Cuatrec.

Cuatrecasas 1958c.

Arbusto, trepadora.

Nativa. Pacífico. 0-100 m.

CAU, CHO, VAL. No evaluada.

Costa Pacífica de SO Panamá a
NO Ecuador.

Fuchs 21872 (COL, MO).

***Tetrapteryx tinifolia* Triana &
Planch.**

Tetrapteryx calophylla subsp.

glabrifolia (Griseb.) Cuatrec.,

Tetrapteryx glabrifolia (Griseb.)

Small

Anderson, W. 2007b.

Liana.

Nativa. Amazonia, Andes,

Pacífico, V Magdalena. 0-2320
m.

AMA, ANT, CAU, CHO, CUN,
HUI, PUT, TOL, VAL. No
evaluada.

México a N Suramérica.

Espina 2049 (COL, MICH, MO).

Tetrapteryx tolimensis

Sprague

Cuatrecasas 1958c.

Liana.

Endémica. V Magdalena.

TOL. No evaluada.

Sprague 271 (BM, K, US).

NOTA: conocida solo del tipo /
known only from the type.

***Tetrapteryx* sp. nov. 1 =**

***T. amazonica* C.E.Anderson**

Liana.

Nativa. Amazonia. 135-200 m.

AMA. No evaluada. Amazonia

de Colombia, Perú y Brasil.

Rudas 1252 (COAH, MICH,
COL).

***Tetrapteryx* sp. nov. 2**

Liana.

Endémica. Amazonia. 350-400
m.

CAQ. No evaluada.

Cabrera 3515 (CUVC, MO).

***Tetrapteryx* sp. nov. 3 =**

***T. callejasii* W.R.Anderson**

Arbusto, trepadora.

Endémica. Andes, Caribe,

Pacífico, V Cauca, V Magdalena.
60-1550 m.

ANT, CES, CHO, SAN. No
evaluada.

Ramírez 363 (COL, HUA,
JAUM, MO).

***Tetrapteryx* sp. nov. 4**

Liana. Nativa. Amazonia. 325-380 m.

PUT. No evaluada.

Amazonia de Colombia y
Ecuador.

Klug 1654 (A, GH, MICH,
MO).

***Tetrapteryx* sp. nov. 5 =**

***T. steyermarkii* W.R.Anderson**

Arbusto, arbolito, árbol. Nativa.

Caribe. 0-500 m.

CES, GUJ, MAG. No evaluada.

N Colombia y Venezuela.

Marulanda 2140 (COL, HUA,
MICH, MO).