

MALPIGHIACEAE

Autor: Múlgura, M. E.

Revisor: Anderson, C.

31 géneros, 113 especies, 22 especies endémicas.

Alicia W.R. Anderson

Número de especies: 1

Alicia anisopetala (A. Juss.) W.R. AndersonSin.: *Hiraea anisopetala* A. Juss., *Hiraea macrocarpa* Chodat, *Mascagnia anisopetala* (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999, 2006; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Liana. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 1875 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 15761 (NY)]; PRY[Zardini, E. M. 8127 (FCQ, MO)].

Amorimia W.R. Anderson

Número de especies: 1 endémica

Amorimia exotropica (Griseb.) W.R. AndersonSin.: *Mascagnia exotropica* Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Liana. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS).

Ejemplares de referencia: ARG[Vanni, R. O. 2903 (MICH)]; BRA[Krapovickas, A. 39391 (MICH)].

[Amorimia rigida (A. Juss.) W.R. Anderson]Sin.: *Hiraea rigida* A. Juss., *Mascagnia coriacea* Griseb., *Mascagnia rigida* (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia rigida* (A. Juss.) Griseb. subsp. *coriacea* (Griseb.) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Aspicarpa Rich.

Número de especies: 5, 1 endémica

Aspicarpa affinis (A. St.-Hil.) Hassl. = **Camarea affinis** A. St.-Hil.

Referencias: Mamede, M. C. H., 1990.

Aspicarpa argentea Nied., nom. superfl. = **Aspicarpa sericea** Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Aspicarpa argentea Nied. var. **sericea** (Griseb.) Nied., nom. superfl. = **Aspicarpa sericea** Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999; Múlgura, M. E., 1994b.

Aspicarpa ericoides (A. St.-Hil.) Hassl. = **Camarea ericoides** A. St.-Hil.**Aspicarpa guaranitica** (A. St.-Hil.) Hassl. = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Aspicarpa hirsuta (A. St.-Hil.) Hassl. = **Camarea hirsuta** A. St.-Hil.

Referencias: Mamede, M. C. H., 1990.

Aspicarpa lanata (Chodat) Nied., nom. illeg. = **Aspicarpa schininii** W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 1987, 1999.

Aspicarpa linearifolia (A. St.-Hil.) Nied. = **Peregrina linearifolia** (A. St.-Hil.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 1985, 1999.

Aspicarpa linearis (Kuntze) Hassl. = **Camarea ericoides** A. St.-Hil.**Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donnell & LourteigSin.: *Aspicarpa sericea* (A. St.-Hil.) Nied., nom. illeg., *Camarea pulchella* Griseb., *Cryptolappa pulchella* (Griseb.) Kuntze var. *latifolia* Kuntze, nom. superfl., *Cryptolappa pulchella* (Griseb.) Kuntze, nom. superfl., *Gaudichaudia sericea* A. St.-Hil., *Janusia sericea* (A. St.-Hil.) A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAU, CAN, CEN, CON, SPE); URY(ART, CLA, RIV).

Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 4919 (SI)]; BRA[Anderson, W. R. 11763 (NY)]; PRY[Jiménez, B. 1615 (BM, CTES, G, MO, PY)]; URY[Rosengurt, B. 8460 (MVFA)].

Aspicarpa robusta (Chodat) Hassl., nom. superfl. = **Aspicarpa sericea** Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Aspicarpa robusta (Chodat) Hassl. var. **fiebrigii** (Chodat) Hassl., nom. superfl. = **Aspicarpa schininii** W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Aspicarpa robusta (Chodat) Hassl. var. **sericea** (Griseb.) Hassl., nom. superfl. = **Aspicarpa sericea** Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Aspicarpa salicifolia (Chodat) Nied.Sin.: *Camarea salicifolia* Chodat, *Cryptolappa salicifolia* (Chodat) Kuntze, *Gaudichaudia salicifolia* (Chodat) Chodat

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hierba. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, MIS); PRY(PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[Zardini, E. M. 700 (SI)];

PRY[Zardini, E. M. 38669 (AS, MO)].

Aspicarpa schininii W.R. Anderson

Sin.: *Aspicarpa lanata* (Chodat) Nied., nom. illeg., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *fiebrigii* (Chodat) Hassl., nom. superfl., *Camarea lanata* Chodat, *Cryptolappa lanata* (Chodat) Kuntze, *Gaudichaudia lanata* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *fiebrigii* Chodat

Referencias: Anderson, W. R., 1987, 1999.

Hierba. Nativa. 1000–1500 m.

Países: ARG(JUJ); PRY(CEN, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[Kiesling, R. 8355 (SI)];

PRY[Zardini, E. M. 37643 (AS, MO)].

Aspicarpa sericea (A. St.-Hil.) Nied., nom. illeg.

= **Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donnell & Lourteig

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Aspicarpa sericea Griseb.

Sin.: *Aspicarpa argentea* Nied. var. *sericea* (Griseb.) Nied., nom. superfl., *Aspicarpa argentea* Nied., nom. superfl., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl. var. *sericea* (Griseb.) Hassl., nom. superfl., *Aspicarpa robusta* (Chodat) Hassl., nom. superfl., *Camarea robusta* Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *sericea* (Griseb.) Chodat

Referencias: Anderson, W. R., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Múlgura, M. E., 1992, 1994b.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).

Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, S. 10582 (SI)];

PRY[Degen, R. 2723 (FCQ, MO)].

Aspicarpa uruguayensis Nied.

Referencias: Niedenzu, F., 1928.

Hierba. Perenne. Endémica. 200–300 m.

Países: URY(TAC).

Ejemplares de referencia: URY[Arechavaleta, J. 140 (G)].

Banisteria acanthocarpa A. Juss. = **Banisteriopsis**

muricata (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria acerosa Nied. = **Banisteriopsis acerosa**

(Nied.) B. Gates

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria adenopoda A. Juss. = **Banisteriopsis**

adenopoda (A. Juss.) B. Gates

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria argentea (Kunth) Spreng. = **Banisteriopsis**

muricata (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria argyrophaea (A. Juss.) C.V. Morton

= **Heteropterys argyrophaea** A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Banisteria argyrophylla A. Juss. = **Banisteriopsis**

argyrophylla (A. Juss.) B. Gates

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria bonariensis Hook. & Arn. = **Stigmaphyllon**

bonariense (Hook. & Arn.) C. E. Anderson

Referencias: Anderson, C. E., 1997a, 1997[1996]b.

Banisteria caapi Griseb. = **Banisteriopsis caapi** (Griseb.)

C.V. Morton

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Banisteria campestris A. Juss. = **Banisteriopsis**

campestris (A. Juss.) Little

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria ciliata Lam. = **Stigmaphyllon ciliatum** (Lam.)

A. Juss.

Referencias: Anderson, C., 1997a.

[*Banisteria corymbosa* Larrañaga]

Referencias: Gates, B., 1982.

Notas: Nombre dudoso. Posiblemente *Stigmaphyllon* sp.

Banisteria dumetorum (Griseb.) C.V. Morton

= **Heteropterys dumetorum** (Griseb.) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Banisteria fagifolia DC. = **Hiraea fagifolia** (DC.)

A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Banisteria ferruginea Cav. = **Banisteriopsis ferruginea**

(Cav.) B. Gates

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria hassleriana Chodat = **Diplopterys lutea**

(Griseb.) W.R. Anderson & C. Cav. Davis

Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Banisteria hispida Nied. = **Diplopterys lutea** (Griseb.)

W.R. Anderson & C. Cav. Davis

Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Banisteria illustris (Rusby) Nied. = **Banisteriopsis**

muricata (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria inebrians (C.V. Morton) J.F. Macbr.

= **Banisteriopsis caapi** (Griseb.) C.V. Morton

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Banisteria laevifolia A. Juss. = **Banisteriopsis laevifolia**

(A. Juss.) B. Gates

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria lupuloides L. = **Gouania lupuloides** (L.) Urb.

Banisteria lutea Griseb. = **Diplopterys lutea** (Griseb.)

W.R. Anderson & C. Cav. Davis

Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Banisteria mediterranea Vell. = **Janusia mediterranea**
(Vell.) W.R. Anderson

Banisteria metallicolor A. Juss. = **Banisteriopsis**
muricata (Cav.) Cuatrec.
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria metallicolor A. Juss. var. *falcata* Nied.
= **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria metallicolor A. Juss. var. *sericea* Nied.
= **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria metallicolor A. Juss. var. *subrotunda* Nied.
= **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria muricata Cav. = **Banisteriopsis muricata**
(Cav.) Cuatrec.
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria nervosa (A. Juss.) R.O. Williams
= **Heteropterys nervosa** A. Juss.

Banisteria nitens Griseb. = **Banisteriopsis argyrophylla**
(A. Juss.) B. Gates
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria nitida Lam. = **Heteropterys nitida** (Lam.) DC.

Banisteria nitrosiodora Griseb. = **Diplopterys lutea**
(Griseb.) W.R. Anderson & C. Cav. Davis
Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Banisteria nummifera A. Juss. = **Banisteriopsis**
nummifera (A. Juss.) B. Gates
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria oxyclada A. Juss. = **Banisteriopsis oxyclada**
(A. Juss.) B. Gates
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria parviflora A. Juss. = **Banisteriopsis**
parviflora (A. Juss.) B. Gates
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria pseudojanusia Nied. = **Banisteriopsis**
pseudojanusia (Nied.) B. Gates
Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteria pubipetala A. Juss. = **Diplopterys pubipetala**
(A. Juss.) W.R. Anderson & C. Cav. Davis
Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Banisteria pubipetala A. Juss. f. *cordata* Nied.
= **Diplopterys pubipetala** (A. Juss.) W.R. Anderson
& C. Cav. Davis
Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Banisteria quitensis Nied. = **Banisteriopsis caapi**
(Griseb.) C.V. Morton
Referencias: Anderson, W. R., 1999; Gates, B., 1982.

Banisteria tenuis Lindl. = **Heteropterys glabra** Hook. &
Arn.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Banisteriopsis C.B. Rob.

Número de especies: 16, 1 endémica

Banisteriopsis acerosa (Nied.) B. Gates

Sin.: *Banisteria acerosa* Nied.

Referencias: Gates, B., 1982.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–200 m.

Países: PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: PRY[Hassler, E. 10481 (A, G)].

Banisteriopsis adenopoda (A. Juss.) B. Gates

Sin.: *Banisteria adenopoda* A. Juss.

Referencias: Gates, B., 1982.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 8062 (BM, F, G, S, US)].

Banisteriopsis argentea (Kunth) C.B. Rob.

= **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteriopsis argyrophylla (A. Juss.) B. Gates

Sin.: *Banisteria argyrophylla* A. Juss., *Banisteria nitens* Griseb.

Referencias: Gates, B., 1982.

Arbusto o liana. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Ejemplares de referencia: PRY[Hassler, E. 10403 (G, GH, NY)].

Banisteriopsis caapi (Griseb.) C.V. Morton

Sin.: *Banisteria caapi* Griseb., *Banisteria inebrians*

(C.V. Morton) J.F. Macbr., *Banisteria quitensis* Nied.,

Banisteriopsis inebrians C.V. Morton, *Banisteriopsis*

quitensis (Nied.) C.V. Morton

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1000 m.

Países: ARG(SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[Legname, P. R. 9690c (LIL)].

Banisteriopsis campestris (A. Juss.) Little

Sin.: *Banisteria campestris* A. Juss.

Referencias: Gates, B., 1982.

Arbolito. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 11010 (BM, GH, MO, NY, S, US)].

Banisteriopsis confusa B. Gates

Referencias: Gates, B., 1982.

Subarbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(COA, PAI).

Ejemplares de referencia: PRY[Hassler, E. 6726 (BM, G, GH, K, MO, NY, P, R, S, W), Krapovickas, A. 44853 (CTES)].

Banisteriopsis ferruginea (Cav.) B. GatesSin.: *Banisteria ferruginea* Cav., *Triopteris brasiliensis* Poir.

Referencias: Gates, B., 1982.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Mueller s.n. (P)].

Banisteriopsis illustris Rusby = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteriopsis inebrians C.V. Morton = **Banisteriopsis caapi** (Griseb.) C.V. Morton

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Banisteriopsis laevifolia (A. Juss.) B. GatesSin.: *Banisteria laevifolia* A. Juss.

Referencias: Gates, B., 1982.

Arbusto o subarbusto. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 29232 (NY, P)].

Banisteriopsis lutea (Griseb.) Cuatrec. = **Diplopterys lutea** (Griseb.) W.R. Anderson & C. Cav. Davis

Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Banisteriopsis metallicolor (A. Juss.) O'Donell & Lourteig = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteriopsis metallicolor (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *sericea* (Nied.) O'Donell & Lourteig = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteriopsis metallicolor (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *subrotunda* (Nied.) O'Donell & Lourteig = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.Sin.: *Banisteria acanthocarpa* A. Juss., *Banisteria argentea* (Kunth) Spreng., *Banisteria illustris* (Rusby) Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *falcata* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *sericea* Nied., *Banisteria metallicolor* A. Juss. var. *subrotunda* Nied., *Banisteria muricata* Cav., *Banisteriopsis argentea* (Kunth) C.B. Rob., *Banisteriopsis illustris* Rusby, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *sericea* (Nied.) O'Donell & Lourteig, *Banisteriopsis metallicolor* (A. Juss.) O'Donell & Lourteig var. *subrotunda* (Nied.) O'Donell & Lourteig, *Heteropterys argentea* Kunth, *Heteropterys pirayuensis* Morong

Referencias: Gates, B., 1982; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(CAN, GUA, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 5719 (SI)]; BRA[Dusén, P. K. H. 16622 (G, GH, MO, S)]; PRY[Jiménez, B. 1806 (BM, CTES, MO, PY)].

Banisteriopsis nitrosiodora (Griseb.) O'Donell & Lourteig = **Diplopterys lutea** (Griseb.) W.R. Anderson & C. Cav. Davis

Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Banisteriopsis nummifera (A. Juss.) B. GatesSin.: *Banisteria nummifera* A. Juss.

Referencias: Gates, B., 1982.

Liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Carneiro, J. 231 (MICH)].

Banisteriopsis oxyclada (A. Juss.) B. GatesSin.: *Banisteria oxyclada* A. Juss.

Referencias: Gates, B., 1982.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: PRY[Hassler, E. 10189 (C, G, GH, K, MICH, MO, NY, P, RB, S, SI, US, W)].

Banisteriopsis paraguariensis B. Gates

Referencias: Gates, B., 1982; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA, CAN).

Ejemplares de referencia: PRY[Rojas, T. 9832a (A, G, K, NY, P, W)].

Banisteriopsis parviflora (A. Juss.) B. GatesSin.: *Banisteria parviflora* A. Juss.

Referencias: Gates, B., 1982.

Liana. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 6034 (HB)].

Banisteriopsis pseudojanusia (Nied.) B. GatesSin.: *Banisteria pseudojanusia* Nied.

Referencias: Gates, B., 1982.

Liana. Endémica. 500-1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 12424 (P)].

Banisteriopsis pubipetala (A. Juss.) Cuatrec.= **Diplopterys pubipetala** (A. Juss.) W.R. Anderson & C. Cav. Davis

Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Banisteriopsis pulchra B. Gates

Referencias: Gates, B., 1982.

Liana. Nativa. 0-200 m.

Países: PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: PRY[Anderson, W. R. 11789 (K, MICH, NY)].

Banisteriopsis quitensis (Nied.) C.V. Morton= **Banisteriopsis caapi** (Griseb.) C.V. Morton

Referencias: Gates, B., 1982.

Banisteriopsis variabilis B. Gates

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Gates, B., 1982.

Arbolito. Nativa. 0–1100 m.

Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CON).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 14247 (MICH, P, US)]; PRY[Hassler, E. 10252 (A, G, K, NY)].

Brittonella pilosa Rusby = **Mionandra camareoides** Griseb.

Referencias: Múlgura, M. E., 1994b.

Bunchosia Kunth

Número de especies: 2

Bunchosia missionum Eskuche = **Bunchosia pallescens** Skottsb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Bunchosia multiflora Hook. & Arn. = **Heladena multiflora** (Hook. & Arn.) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Bunchosia pallescens Skottsb.

Sin.: *Bunchosia missionum* Eskuche

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Árbol. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CAN, CON).

Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 5613 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 47617 (NY)]; PRY[Hahn, W. J. 960 (MO, PY)].

Bunchosia paraguariensis Nied.

Arbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(sin localidad).

Ejemplares de referencia: PRY[Hassler, E. 7669 (NY)].

Byrsonima Rich. ex Kunth

Número de especies: 9, 1 endémica

Byrsonima brachybotrya Nied.

Arbusto. Endémica. 700–1100 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Silva, J. M. 1540 (MBM)].

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Arbusto. Nativa. 300–1000 m.

Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CON).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 52648 (MBM)]; PRY[Soria, N. 5015 (FCQ)].

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

Sin.: *Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth f. *kunthiana* Nied., *Malpighia crassifolia* L.

Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Niedenzu, F., 1928.

Arbusto. Nativa. 200–900 m.

Países: BRA(PAR); PRY(CAN).

Ejemplares de referencia: BRA[Cervi, A. C. 6377 (NY)]; PRY[Jiménez, B. 1648 (PY)].

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth f. *kunthiana* Nied.
= **Byrsonima crassifolia** (L.) Kunth

Byrsonima intermedia A. Juss.

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 17919 (NY)]; PRY[Jiménez, B. 28 (BM, CTES, PY)].

Byrsonima ligustrifolia A. Juss.

Árbol. Nativa. 0–500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 69830 (MBM)].

Byrsonima myricifolia Griseb.

Árbol. Nativa. 0–500 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Silva, J. M. 3361 (MBM)].

Byrsonima niedenzuiana Skottsb.

Árbol. Nativa. 0–500 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 29638 (MBM)].

Byrsonima psilandra Griseb.

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002.

Subarbusto. Nativa. 0–700 m.

Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON).

Ejemplares de referencia: BRA[Krapovickas, A. 23308 (CTES)]; PRY[Schinini, A. 22885 (CTES)].

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

Sin.: *Malpighia verbascifolia* L.

Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 20059 (MBM)].

Callaeum Small

Número de especies: 1

Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson

Sin.: *Hiraea platyptera* Griseb., *Hiraea psilophylla* A. Juss., *Mascagnia pachyptera* Rusby, *Mascagnia psilophylla* (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Johnson, D. M., 1986b.

Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, COA); URY(ART, SAO, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[Deginani, N. B. 1028 (SI)]; BRA[Krapovickas, A. 33735 (CTES, MICH)]; PRY[Hassler, E. 8026 (NY), Múlgura de Romero, M. E. 3550 (CTES, FCQ, SI)]; URY[Palacios 2019 (CTES)].

Camarea A. St.-Hil.

Número de especies: 1

Camarea affinis A. St.-Hil.

Sin.: *Aspicarpa affinis* (A. St.-Hil.) Hassl., *Gaudichaudia affinis* (A. St.-Hil.) Chodat

Referencias: Mamede, M. C. H., 1990.

Arbolito. Nativa. 100–1000 m.

Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8733* (B, HB, L, MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9824* (K)].

[*Camarea ericoides* A. St.-Hil.]

Sin.: *Aspicarpa ericoides* (A. St.-Hil.) Hassl., *Aspicarpa linearis* (Kuntze) Hassl., *Camarea linearifolia* A. St.-Hil., *Cryptolappa ericoides* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Cryptolappa linearifolia* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Gaudichaudia ericoides* (A. St.-Hil.) Chodat, *Gaudichaudia hilariana* Chodat

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[*Camarea hirsuta* A. St.-Hil.]

Sin.: *Aspicarpa hirsuta* (A. St.-Hil.) Hassl., *Gaudichaudia hirsuta* (A. St.-Hil.) Chodat

Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Camarea juncea Griseb. = *Peregrina linearifolia* (A. St.-Hil.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 1985, 1999.

Camarea lanata Chodat = *Aspicarpa schininii* W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 1987, 1999.

Camarea linearifolia A. St.-Hil. = *Camarea ericoides* A. St.-Hil.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Camarea pulchella Griseb. = *Aspicarpa pulchella* (Griseb.) O'Donell & Lourteig

Camarea robusta Chodat = *Aspicarpa sericea* Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Camarea salicifolia Chodat = *Aspicarpa salicifolia* (Chodat) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Carolus W.R. Anderson

Número de especies: 1

Carolus chlorocarpus (A. Juss.) W.R. Anderson

Sin.: *Heladena hassleriana* Nied., *Hiraea chlorocarpa* A. Juss., *Mascagnia chlorocarpa* (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1993, 2006.

Liana. Nativa. 0–800 m.

Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7837* (A, BM, G, K, LIL, MICH, MO, NY, P)].

Christianella W.R. Anderson

Número de especies: 1

Christianella multiglandulosa (Nied.) W.R. Anderson

Sin.: *Mascagnia multiglandulosa* Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Arbusto o liana. Nativa. 0–800 m.

Países: PRY(AMA, SPE).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6998* (A, G, K, MO, NY)].

Clonodia biglandulosa Chodat = **Heteropterys argyrophaea** A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Clonodia mollis Nied. = **Heteropterys mollis** (Nied.) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Clonodia tenuifolia Nied. = **Heteropterys sylvatica** A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1997.

Cordobia Nied.

Número de especies: 1 endémica

Cordobia argentea (Griseb.) Nied.

Sin.: *Cryptolappa argentea* (Griseb.) Kuntze, *Gaudichaudia argentea* (Griseb.) Chodat, *Janusia argentea* (Griseb.) Griseb., *Mionandra argentea* Griseb., *Peixotoa cordobensis* Kuntze

Referencias: Anderson, W. R., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Múlgura, M. E., 1994b.

Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11975* (SI), *Lorentz, P. G. 11* (K)]; PRY[*Mereles, F. 4967* (FCQ)].

Cordobia fischeri (Hicken) Nied. = **Gallardoa fischeri** Hicken

Referencias: Nicora, E. G., 1944.

Cryptolappa argentea (Griseb.) Kuntze = **Cordobia argentea** (Griseb.) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Cryptolappa ericoides (A. St.-Hil.) Kuntze = **Camarea ericoides** A. St.-Hil.

Cryptolappa lanata (Chodat) Kuntze = **Aspicarpa schininii** W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Cryptolappa linearifolia (A. St.-Hil.) Kuntze = **Camarea ericoides** A. St.-Hil.

Cryptolappa pulchella (Griseb.) Kuntze, nom. superfl. = **Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donell & Lourteig

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Cryptolappa pulchella (Griseb.) Kuntze var. *latifolia* Kuntze, nom. superfl. = **Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donell & Lourteig

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Cryptolappa salicifolia (Chodat) Kuntze = **Aspicarpa salicifolia** (Chodat) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Dicella Griseb.

Número de especies: 2, 1 endémica

Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb.

Sin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *holosericea* (A. Juss.) Nied., *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *subglabra* Nied., nom. superfl., *Dicella holosericea* A. Juss., *Dicella holosericea* A. Juss. var. *argentea* A. Juss.

Referencias: Chase, M. W., 1981.

Liana. Nativa. 100–700 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 37874 (MICH, MO, NY, SP)].

Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb. var. *holosericea* (A. Juss.) Nied. = ***Dicella bracteosa*** (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Chase, M. W., 1981.

Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb. var. *minutiflora* Chodat = ***Dicella nucifera*** Chodat

Referencias: Chase, M. W., 1981.

Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb. var. *subglabra* Nied., nom. superfl. = ***Dicella bracteosa*** (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Chase, M. W., 1981.

Dicella holosericea A. Juss. = ***Dicella bracteosa*** (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Chase, M. W., 1981.

Dicella holosericea A. Juss. var. *argentea* A. Juss. = ***Dicella bracteosa*** (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Chase, M. W., 1981.

Dicella nucifera Chodat

Sin.: *Dicella bracteosa* (A. Juss.) Griseb. var. *minutiflora* Chodat, *Dicella nucifera* Chodat f. *lancifolia* Nied., *Dicella nucifera* Chodat f. *ovatifolia* Nied., *Dicella tricarpa* Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999; Chase, M. W., 1981; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Liana. Endémica. 0–700 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 745 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 1144 (MICH, P, US)]; PRY[Zardini, E. M. 8147 (FCQ, MO)].

Dicella nucifera Chodat f. *lancifolia* Nied. = ***Dicella nucifera*** Chodat

Referencias: Chase, M. W., 1981.

Dicella nucifera Chodat f. *ovatifolia* Nied. = ***Dicella nucifera*** Chodat

Referencias: Chase, M. W., 1981.

Dicella tricarpa Nied. = ***Dicella nucifera*** Chodat

Referencias: Chase, M. W., 1981.

Dinemagonum A. Juss.

Número de especies: 1 endémica

Dinemagonum albicaule Phil. = ***Dinemagonum gayanum*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemagonum bridgesianum A. Juss. = ***Dinemagonum gayanum*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemagonum bridgesianum A. Juss. f. *glanduloso-bracteolata* Nied. = ***Dinemagonum gayanum*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemagonum bridgesianum A. Juss. var. *parvifolium* Nied. = ***Dinemagonum gayanum*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemagonum gayanum A. Juss.

Sin.: *Dinemagonum albicaule* Phil., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. f. *glanduloso-bracteolata* Nied., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. var. *parvifolium* Nied., *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *albicaule* (Phil.) Reiche, *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *bridgesianum* (A. Juss.) Reiche, *Dinemagonum maculigerum* Phil.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–2600 m.

Países: CHL(III, IV, V).

Ejemplares de referencia: CHL[Wagenknecht, R. 18537 (G, GH, UC), Werdermann, E. 157 (SI)].

Dinemagonum gayanum A. Juss. var. *albicaule* (Phil.) Reiche = ***Dinemagonum gayanum*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemagonum gayanum A. Juss. var. *bridgesianum* (A. Juss.) Reiche = ***Dinemagonum gayanum*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemagonum maculigerum Phil. = ***Dinemagonum gayanum*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemandra A. Juss.

Número de especies: 1 endémica

Dinemandra ericoides A. Juss.

Sin.: *Dinemandra ericoides* A. Juss. var. *triandra* Nied., *Dinemandra glaberrima* A. Juss., *Dinemandra glauca* Baill., *Dinemandra ramosissima* Phil., *Dinemandra strigosa* Phil., *Dinemandra subaptera* Phil.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Subarbusto. Endémica. 0–2800 m.

Países: CHL(II, III).

Ejemplares de referencia: CHL[Werdermann, E. 435 (B, BM, CAS, G, GH, K, UC, US)].

Dinemandra ericoides A. Juss. var. *triandra* Nied.

= ***Dinemandra ericoides*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemandra glaberrima A. Juss. = ***Dinemandra ericoides*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemandra glauca Baill. = ***Dinemandra ericoides*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemandra ramosissima Phil. = ***Dinemandra ericoides*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemandra strigosa Phil. = ***Dinemandra ericoides*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Dinemandra subaptera Phil. = ***Dinemandra ericoides*** A. Juss.

Referencias: Simpson, B. B., 1989b.

Diplopterys A. Juss.

Número de especies: 2

Diplopterys lutea (Griseb.) W.R. Anderson & C. Cav. Davis

Sin.: *Banisteria hassleriana* Chodat, *Banisteria hispida* Nied., *Banisteria lutea* Griseb., *Banisteria nitrosiodora* Griseb., *Banisteriopsis lutea* (Griseb.) Cuatrec., *Banisteriopsis nitrosiodora* (Griseb.) O'Donnell & Lourteig, *Jubistylis mollis* Rusby

Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Gates, B., 1982; Múlgura, M. E., 1994b.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(CEN, CON, PAD).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 27947 (SI)]; PRY[Zardini, E. M. 7179 (FCQ, MO)].

Diplopterys pubipetala (A. Juss.) W.R. Anderson & C. Cav. Davis

Sin.: *Banisteria pubipetala* A. Juss., *Banisteria pubipetala* A. Juss. f. *cordata* Nied., *Banisteriopsis pubipetala* (A. Juss.) Cuatrec.

Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006; Gates, B., 1982.

Arbusto o liana. Nativa. 0–800 m.

Países: BRA(PAR); PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 16987 (P, US)]; PRY[Hassler, E. 10562 (G, GH, MO, NY, P, S)].

Gallardoa Hicken

Número de especies: 1 endémica

Gallardoa fischeri Hicken

Sin.: *Cordobia fischeri* (Hicken) Nied.

Referencias: Nicora, E. G., 1944.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SLU).

Ejemplares de referencia: ARG[Fischer, W. 10 (GH, K, MO, NY, SI, US)].

Galphimia Cav.

Número de especies: 3, 1 endémica

Galphimia amambayensis C.E. Anderson

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

Subarbusto. Endémica. 0–600 m.

Países: PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: PRY[Fernández Casas, F. J. 6190 (MO, NY)].

Galphimia australis Chodat

Sin.: *Galphimia australis* Chodat f. *angustifolia* Chodat, *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. f. *angustifolia* (Chodat) Nied., *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. var. *australis* (Chodat) Chodat, *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. var. *pubescens* A. Juss.

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

Subarbusto. Nativa. 0–900 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA); URY(PAY).

Ejemplares de referencia: ARG[Burkart, A. 29359 (CTES, GH)]; BRA[Poliquesi, C. B. 495 (CEPEC, CTES, MBM, UB)]; PRY[Schinini, A. 21495 (F, G, MICH)]; URY[Rosengurt, B. 3278 ½ (GH, MO, SP)].

Galphimia australis Chodat f. *angustifolia* Chodat = ***Galphimia australis*** Chodat

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

[*Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss.]

Sin.: *Thryallis brasiliensis* L.

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. f. *angustifolia* (Chodat) Nied. = ***Galphimia australis*** Chodat

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. f. *platyphylla* (Chodat) Nied. = ***Galphimia platyphylla*** Chodat

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. var. *australis* (Chodat) Chodat = ***Galphimia australis*** Chodat

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. var. *platyphylla* (Chodat) Nied. = ***Galphimia platyphylla*** Chodat

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. var. *pubescens* A. Juss. = ***Galphimia australis*** Chodat

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

Galphimia platyphylla Chodat

Sin.: *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. f. *platyphylla* (Chodat) Nied., *Galphimia brasiliensis* (L.) A. Juss. var. *platyphylla* (Chodat) Nied.

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

- Subarbusto. Nativa. 300–400 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[Balansa, B. 2396 (G, P)].
- Gaudichaudia affinis* (A. St.-Hil.) Chodat = **Camarea affinis** A. St.-Hil.
Referencias: Mamede, M. C. H., 1990.
- Gaudichaudia argentea* (Griseb.) Chodat = **Cordobia argentea** (Griseb.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Gaudichaudia barbeyi* (Chodat) Chodat = **Janusia guaranítica** (A. St.-Hil.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Gaudichaudia ericoides* (A. St.-Hil.) Chodat = **Camarea ericoides** A. St.-Hil.
- Gaudichaudia guaranítica* A. St.-Hil. = **Janusia guaranítica** (A. St.-Hil.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Gaudichaudia hilariana* Chodat = **Camarea ericoides** A. St.-Hil.
- Gaudichaudia hirsuta* (A. St.-Hil.) Chodat = **Camarea hirsuta** A. St.-Hil.
Referencias: Mamede, M. C. H., 1990.
- Gaudichaudia lanata* (Chodat) Chodat = **Aspicarpa schininii** W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 1987.
- Gaudichaudia linearifolia* A. St.-Hil. = **Peregrina linearifolia** (A. St.-Hil.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 1985.
- Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat = **Aspicarpa sericea** Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *fiebrigii* Chodat = **Aspicarpa schininii** W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Gaudichaudia robusta* (Chodat) Chodat var. *sericea* (Griseb.) Chodat = **Aspicarpa sericea** Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Gaudichaudia salicifolia* (Chodat) Chodat = **Aspicarpa salicifolia** (Chodat) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Gaudichaudia sericea* A. St.-Hil. = **Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donnell & Lourteig

Heladena A. Juss.

Número de especies: 1

- Heladena australis* A. Juss., nom. superfl. = **Heladena multiflora** (Hook. & Arn.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Heladena hassleriana* Nied. = **Carolus chlorocarpus** (A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.
- Heladena multiflora** (Hook. & Arn.) Nied.
Sin.: *Bunchosia multiflora* Hook. & Arn., *Heladena australis* A. Juss., nom. superfl., *Malpighiantha volubilis* Rojas
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAU, CAN, GUA, PAI, SPE); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[Múlgura de Romero, M. E. 2093 (SI)]; PRY[Zardini, E. M. 34859 (AS, MO)]; URY[Del Puerto, O. 15937 (MVFA)].
- Hemsleya brachystachys* (Lindl.) Kuntze = **Thryallis brachystachys** Lindl.
Referencias: Anderson, C. E., 1995.
- Heteropterys Kunth, nom. cons.**
Número de especies: 23, 4 endémicas
- Heteropterys aceroides* Griseb. = **Heteropterys intermedia** (A. Juss.) Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- [*Heteropterys acutifolia* Arechav.]
Notas: Nombre dudoso.
- Heteropterys aenea** Griseb.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[Barbosa, E. 404 (MBM)].
- Heteropterys amplexicaulis** Morong
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
Arbusto o liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[Molfino, J. F. s.n. (BAA)]; PRY[Morong, T. 199 (NY)].
- Heteropterys angustifolia* Griseb. = **Heteropterys glabra** Hook. & Arn.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *angustissima* Nied. = **Heteropterys glabra** Hook. & Arn.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *lanceolata* Nied. = **Heteropterys glabra** Hook. & Arn.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
- Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *sinuata* Nied. = **Heteropterys hypericifolia** A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys argentea Kunth = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Heteropterys argyrophaea A. Juss.

Sin.: *Banisteria argyrophaea* (A. Juss.) C.V. Morton,
Clonodia biglandulosa Chodat

Referencias: Anderson, W. R., 1999; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(CAU, CON, COA, GUA, MIE, PAI); URY(SAO).

Ejemplares de referencia: ARG[Biganzoli, F. 72 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 40549 (MBM)]; PRY[Zardini, E. M. 8123 (FCQ, MO)]; URY[Berro, M. B. 3340 (MVFA)].

Heteropterys australis A. Juss. = **Heteropterys syringifolia** Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys bicolor A. Juss.

Sin.: *Heteropterys bicolor* A. Juss. var. *elliptica* Nied.,
Heteropterys bicolor A. Juss. var. *lanceolata* Nied.,
Heteropterys bicolor A. Juss. var. *major* A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999; Múlgura, M. E., 1981b.

Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA).

Ejemplares de referencia: ARG[Gamerro, J. C. 174 (SI)]; BRA[Pereira, E. 7908 (MBM)]; PRY[Zardini, E. M. 44780 (AS, MO)].

Heteropterys bicolor A. Juss. var. *elliptica* Nied.

= **Heteropterys bicolor** A. Juss.

Referencias: Múlgura, M. E., 1981b.

Heteropterys bicolor A. Juss. var. *lanceolata* Nied.

= **Heteropterys bicolor** A. Juss.

Referencias: Múlgura, M. E., 1981b.

Heteropterys bicolor A. Juss. var. *major* A. Juss.

= **Heteropterys bicolor** A. Juss.

Referencias: Múlgura, M. E., 1981b.

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss.

Referencias: Niedenzu, F., 1928.

Subarbusto. Nativa. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR); PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 27106 (MBM)]; PRY[Schinini, A. 21365 (MICH)].

[*Heteropterys byrsonimifolia* A. Juss. var. *glandulifera* Nied.]

Notas: Nombre dudoso.

Heteropterys cochleosperma A. Juss.

Sin.: *Heteropterys hassleriana* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. f. *acrobasis* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. f. *amblyobasis* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. var. *eglandulosa* Nied., *Heteropterys hassleriana* Nied. var. *glandulifera* Nied., *Heteropterys trichanthera* A. Juss. var. *cuiabensis* Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1998, 2001.

Arbusto o liana. Nativa. 0-1000 m.

Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[Schulz, A. G. 5412 (LIL)]; BRA[Hatschbach, G. 73045 (CTES)]; PRY[Zardini, E. M. 12625 (MO, PY)].

Heteropterys cultriformis Chodat

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Países: PRY(APY).

Ejemplares de referencia: PRY[Schinini, A. 18076 (CTES)].

Heteropterys diversifolia A. Juss. = **Heteropterys intermedia** (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys dumetorum (Griseb.) Nied.

Sin.: *Banisteria dumetorum* (Griseb.) C.V. Morton,
Heteropterys paraguayensis Nied., *Heteropterys praecox* Nied., *Mascagnia dumetorum* Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Arbusto. Nativa. 0-2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, GUA).

Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 3751 (SI)]; PRY[Schinini, A. 2043 (CTES)].

Notas: Citada para Brasil y Uruguay sin mencionar localidad o ejemplar de referencia (W. R. Anderson, 1999).

Heteropterys dusenii Nied.

Referencias: Niedenzu, F., 1928.

Arbusto. Endémica. 0-1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 16183 (MO)].

Heteropterys glabra Hook. & Arn.

Sin.: *Banisteria tenuis* Lindl., *Heteropterys angustifolia* Griseb., *Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *angustissima* Nied., *Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *lanceolata* Nied., *Heteropterys lanceolata* (Nied.) Herter, *Heteropterys pseudoangustifolia* Chodat

Referencias: Anderson, W. R., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Múlgura, M. E., 1994b.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, RNO).

Ejemplares de referencia: ARG[Burkart, A. 15482 (SI)]; BRA[Sehnem, A. 4469 (SI)]; PRY[Mereles, F. 5830 (CTES, FCQ, MO, PY)]; URY[Herter, W. G. F. 1158 (SI)].

Heteropterys hassleriana Nied. = **Heteropterys cochleosperma** A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999, 2001.

Heteropterys hassleriana Nied. f. *acrobasis* Nied.

= **Heteropterys cochleosperma** A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys hassleriana Nied. f. *amblyobasis* Nied.

= **Heteropterys cochleosperma** A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys hassleriana Nied. var. *eglandulosa* Nied.

= **Heteropterys cochleosperma** A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys hassleriana Nied. var. *glandulifera* Nied.

= **Heteropterys cochleosperma** A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys hiraoides A. Juss., nom. superfl.

= **Heteropterys intermedia** (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys hypericifolia A. Juss.

Sin.: *Heteropterys angustifolia* Griseb. f. *sinuata* Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Arbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[Schinini, A. 15971 (CTES, MICH)]; BRA[Saint-Hilaire, A. F. C. P. s.n. (P)]; PRY[Burkart, A. 18807 (SI)].

Heteropterys intermedia (A. Juss.) Griseb.

Sin.: *Heteropterys aceroides* Griseb., *Heteropterys diversifolia* A. Juss., *Heteropterys hiraoides* A. Juss., nom. superfl., *Heteropterys laurifolia* Gardner, nom. illeg., *Heteropterys venosa* Griseb., *Hiraea floribunda* A. Juss., *Hiraea intermedia* A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Liana. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 1858 (SI)]; BRA[Dusén, P. K. H. 13563 (SI)]; PRY[Jørgensen, P. 3830 (SI)].

Heteropterys lanceolata (Nied.) Herter = **Heteropterys glabra** Hook. & Arn.

Heteropterys laurifolia Gardner, nom. illeg.

= **Heteropterys intermedia** (A. Juss.) Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys martiana A. Juss. = **Heteropterys syringifolia** Griseb.

[*Heteropterys microcarpa* Skottsb.]

Notas: Nombre dudoso.

[*Heteropterys microdon* Skottsb.]

Notas: Nombre dudoso.

Heteropterys mollis (Nied.) Nied.

Sin.: *Clonodia mollis* Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999, 2005.

Arbusto. Nativa. 1000–1500 m.

Países: ARG(JUJ).

Ejemplares de referencia: ARG[Villa Carenzo, M. 398 (LIL)].

Heteropterys mulgurae W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 1998, 1999.

Liana. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: ARG[Schwarz, G. J. 3218 (LIL)];

BRA[Hatschbach, G. 52790 (MICH)];

Notas: Probablemente habite en Paraguay.

Heteropterys nervosa A. Juss.

Sin.: *Banisteria nervosa* (A. Juss.) R.O. Williams

Arbusto. Nativa.

Países: PRY(sin localidad).

Ejemplares de referencia: PRY[Hassler, E. 11410 (MICH)].

Heteropterys nitida (Lam.) DC.

Sin.: *Banisteria nitida* Lam.

Arbusto o liana. Nativa. 0–500 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 13707 (SI)].

Notas: Citada erróneamente para Argentina sobre la base de material correspondiente a *Heteropterys mulgurae* (Múlgura, 1981b).

Heteropterys paraguariensis Nied. = **Heteropterys dumetorum** (Griseb.) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys pirayuensis Morong = **Banisteriopsis muricata** (Cav.) Cuatrec.

Referencias: Gates, B., 1982.

Heteropterys praecox Nied. = **Heteropterys dumetorum** (Griseb.) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys pseudoangustifolia Chodat = **Heteropterys glabra** Hook. & Arn.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys pteropetala A. Juss.

Sin.: *Heteropterys pteropetala* A. Juss. f. *orbicularis* Skottsb.

Referencias: Niedenzu, F., 1928.

Arbusto. Nativa. 200–800 m.

Países: PRY(AMA, CON).

Ejemplares de referencia: PRY[Krapovickas, A. 44924 (CTES, MICH)].

Heteropterys pteropetala A. Juss. f. *orbicularis* Skottsb. = **Heteropterys pteropetala** A. Juss.

Heteropterys rhopalifolia A. Juss.

Arbusto. Nativa. 0–200 m.

Países: PRY(APY, CEN).

Ejemplares de referencia: PRY[Zardini, E. M. 36197 (AS, MICH, MO)].

Heteropterys schulziana W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 1998.

Arbusto. Endémica. 500–1000 m.

Países: ARG(SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[Schulz, A. G. 509 (CTES, LIL)].

Heteropterys stannea Griseb. = **Niedenzuella stannea**
(Griseb.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Heteropterys sylvatica A. Juss.
Sin.: *Clonodia tenuifolia* Nied., *Heteropterys tenuifolia*
(Nied.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1997, 1999, 2005.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[Legname, P. R. 9122c
(CTES)].

Heteropterys syringifolia Griseb.
Sin.: *Heteropterys australis* A. Juss., *Heteropterys martiana*
A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS,
SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 5252 (SI)];
BRA[Reitz, P. R. 4193 (MICH)]; PRY[Hahn, W. J.
2515 (MO, PY)].
Notas: Es posible que esta especie produzca híbridos
naturales con *Heteropterys hypericifolia*.

Heteropterys tenuifolia (Nied.) Nied. = **Heteropterys
sylvatica** A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1997.

Heteropterys tomentosa A. Juss.
Referencias: Niedenzu, F., 1928.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: PRY(AMA, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[Schinini, A. 20179 (MICH)].

Heteropterys trichanthera A. Juss. var. *cuiabensis* Nied.
= **Heteropterys cochleosperma** A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Heteropterys umbellata A. Juss.
Referencias: Niedenzu, F., 1928.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 13896 (MO,
NY)]; PRY[Zardini, E. M. 57807 (MO)].

Heteropterys venosa Griseb. = **Heteropterys intermedia**
(A. Juss.) Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hiraea Jacq.
Número de especies: 3

Hiraea ambigua A. Juss. = **Tetrapteryx ambigua**
(A. Juss.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hiraea anisopetala A. Juss. = **Alicia anisopetala**
(A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Hiraea bahiensis Moric. = **Hiraea fagifolia** (DC.)
A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hiraea bahiensis Moric. var. *paraguariensis* Nied.
= **Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hiraea brevifolia (Griseb.) Niederl. = **Mascagnia
brevifolia** Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hiraea chlorocarpa A. Juss. = **Carolus chlorocarpus**
(A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Hiraea cuneata Griseb.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–4500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[Silva, J. M. 3120 (MBM)].

Hiraea divaricata Kunth = **Mascagnia divaricata**
(Kunth) Nied.

Hiraea elegans A. Juss. = **Mascagnia divaricata** (Kunth)
Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hiraea fagifolia (DC.) A. Juss.
Sin.: *Banisteria fagifolia* DC., *Hiraea bahiensis* Moric.,
Hiraea bahiensis Moric. var. *paraguariensis* Nied.,
Hiraea salzmänniana A. Juss., *Hiraea salzmänniana*
A. Juss. var. *glandulifera* Chodat
Referencias: Anderson, W. R., 1999.
Arbusto o liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA,
AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA,
PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 5199 (SI)];
BRA[Hatschbach, G. 40553 (NY)]; PRY[Jørgensen, P.
3832 (SI)].

Hiraea floribunda A. Juss. = **Heteropterys intermedia**
(A. Juss.) Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hiraea intermedia A. Juss. = **Heteropterys intermedia**
(A. Juss.) Griseb.

Hiraea laurifolia A. Juss. = **Niedenzuella sericea**
(A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Hiraea macrocarpa Chodat = **Alicia anisopetala**
(A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Hiraea multiflora Griseb. = **Niedenzuella lucida**
(A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Hiraea ovatifolia Kunth = **Mascagnia ovatifolia** (Kunth) Griseb.

Hiraea platyptera Griseb. = **Callaeum psilophyllum** (A. Juss.) D.M. Johnson
Referencias: Johnson, D. M., 1986b.

Hiraea psilophylla A. Juss. = **Callaeum psilophyllum** (A. Juss.) D.M. Johnson
Referencias: Johnson, D. M., 1986b.

Hiraea pulcherrima Morong = **Mascagnia divaricata** (Kunth) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1993.

Hiraea rigida A. Juss. = **Amorimia rigida** (A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Hiraea salicifolia A. Juss. = **Tetrapteryx salicifolia** (A. Juss.) Nied.

Hiraea salzmänniana A. Juss. = **Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hiraea salzmänniana A. Juss. var. *glandulifera* Chodat = **Hiraea fagifolia** (DC.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Hiraea sepium A. Juss. var. *nitens* S. Moore = **Mascagnia australis** C.E. Anderson
Referencias: Anderson, C. E., 2001a.

Hiraea sericea A. Juss. = **Niedenruella sericea** (A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Hiraea wiedeana A. Juss.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 59786 (MBM)].

Janusia A. Juss.

Número de especies: 3

Janusia argentea (Griseb.) Griseb. = **Cordobia argentea** (Griseb.) Nied.
Referencias: Múlgura, M. E., 1994b.

Janusia barbeyi Chodat = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Janusia guaranitica (A. St.-Hil.) A. Juss.
Sin.: *Aspicarpa guaranitica* (A. St.-Hil.) Hassl., *Gaudichaudia barbeyi* (Chodat) Chodat, *Gaudichaudia guaranitica* A. St.-Hil., *Janusia barbeyi* Chodat, *Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *cordifolia*

Nied., nom. superfl., *Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *glabrata* Nied., *Janusia guaranitica* (A. St.-Hil.) A. Juss. var. *barbeyi* (Chodat) Kuntze, *Janusia proluxa* Arechav.

Referencias: Anderson, W. R., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Múlgura, M. E., 1994b; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(LAV, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 1875 (SI)]; BRA[Rambo, B. 35733 (SI)]; PRY[Múlgura de Romero, M. E. 3734 (CTES, FCQ, SI)]; URY[Osten, C. 5512 (SI)].

Janusia guaranitica (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *cordifolia* Nied., nom. superfl. = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Janusia guaranitica (A. St.-Hil.) A. Juss. f. *glabrata* Nied. = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Janusia guaranitica (A. St.-Hil.) A. Juss. var. *barbeyi* (Chodat) Kuntze = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Janusia linearifolia (A. St.-Hil.) A. Juss. = **Peregrina linearifolia** (A. St.-Hil.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 1985, 1999.

Janusia mediterranea (Vell.) W.R. Anderson
Sin.: *Banisteria mediterranea* Vell.
Referencias: Anderson, W. R., 1982.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 60571 (MICH)]; PRY[Ferrucci, M. S. 1636 (CTES, MICH)].

Janusia occhionii W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 1987.
Liana. Nativa. 100–300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 14253 (F, MBM, MICH, NY, P, US)]; PRY[Simonis, J. E. 114 (MICH)].

Janusia proluxa Arechav. = **Janusia guaranitica** (A. St.-Hil.) A. Juss.

Janusia sericea (A. St.-Hil.) A. Juss. = **Aspicarpa pulchella** (Griseb.) O'Donnell & Lourteig

Jubistylis mollis Rusby = **Diplopteryx lutea** (Griseb.) W.R. Anderson & C. Cav. Davis
Referencias: Anderson, W. R. & Davis, C. C., 2006.

Malpighia crassifolia L. = **Byrsonima crassifolia** (L.) Kunth

Malpighia phlomoides Spreng. = **Tetrapteryx phlomoides** (Spreng.) Nied.

Malpighia verbascifolia L. = **Byrsonima verbascifolia** (L.) DC.

[*Malpighiantha fruticosa* Rojas]
Notas: Nombre dudoso.

Malpighiantha volubilis Rojas = **Heladena multiflora** (Hook. & Arn.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mascagnia (Bertero ex DC.) Colla

Número de especies: 3, 1 endémica

Mascagnia ambigua (A. Juss.) Griseb. = **Tetrapteryx ambigua** (A. Juss.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mascagnia ambigua (A. Juss.) Griseb. f. *paraguayensis* (Nied.) Nied. = **Tetrapteryx ambigua** (A. Juss.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mascagnia anisopetala (A. Juss.) Griseb. = **Alicia anisopetala** (A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Mascagnia australis C.E. Anderson
Sin.: *Hiraea sepium* A. Juss. var. *nitens* S. Moore, *Mascagnia sepium* (A. Juss.) Griseb. var. *mediterranea* Nied., *Mascagnia sepium* auct. non (A. Juss.) Griseb.
Referencias: Anderson, C. E., 2001a.
Liana. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, COS); PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[Schulz, A. G. 14299 (MICH)]; PRY[Hassler, E. 6092 (G)].

Mascagnia brevifolia Griseb.

Sin.: *Hiraea brevifolia* (Griseb.) Niederl., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *malmeana* (Skotts.) Nied., *Mascagnia brevifolia* Griseb. var. *paniculata* Nied., *Mascagnia laurifolia* Nied., *Mascagnia malmeana* Skotts.
Referencias: Anderson, W. R., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Múlgura, M. E., 1994b.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 4157 (SI), Zuloaga, F. O. 7097 (SI)]; PRY[Degen, R. 3211 (CTES, FCQ, MO)].

Mascagnia brevifolia Griseb. var. *malmeana* (Skotts.) Nied. = **Mascagnia brevifolia** Griseb.

Mascagnia brevifolia Griseb. var. *paniculata* Nied. = **Mascagnia brevifolia** Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mascagnia chlorocarpa (A. Juss.) Griseb. = **Carolus chlorocarpus** (A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Mascagnia coriacea Griseb. = **Amorimia rigida** (A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Mascagnia divaricata (Kunth) Nied.

Sin.: *Hiraea divaricata* Kunth, *Hiraea elegans* A. Juss., *Hiraea pulcherrima* Morong, *Mascagnia elegans* (A. Juss.) Griseb., *Mascagnia ixiamensis* Rusby, *Mascagnia pulcherrima* (Morong) Skotts.
Referencias: Anderson, W. R., 1993, 1999.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 6610 (SI)]; BRA[Carneiro, J. 926 (MBM)]; PRY[Morong, T. 626 (K, MICH)].

Mascagnia dumetorum Griseb. = **Heteropteryx dumetorum** (Griseb.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mascagnia elegans (A. Juss.) Griseb. = **Mascagnia divaricata** (Kunth) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mascagnia exotropica Griseb. = **Amorimia exotropica** (Griseb.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Mascagnia ixiamensis Rusby = **Mascagnia divaricata** (Kunth) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mascagnia laurifolia Nied. = **Mascagnia brevifolia** Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mascagnia malmeana Skotts. = **Mascagnia brevifolia** Griseb.
Referencias: Múlgura, M. E., 1994b.

Mascagnia multiglandulosa Nied. = **Christianella multiglandulosa** (Nied.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

[*Mascagnia ovatifolia* (Kunth) Griseb.]
Sin.: *Hiraea ovatifolia* Kunth
Notas: Especie excluida del área del proyecto, el material anteriormente citado bajo este nombre corresponde a *Mascagnia divaricata*.

Mascagnia pachyptera Rusby = **Callaeum psilophyllum** (A. Juss.) D.M. Johnson
Referencias: Johnson, D. M., 1986a.

Mascagnia paraguayensis Nied. = **Tetrapteryx ambigua** (A. Juss.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mascagnia psilophylla (A. Juss.) Griseb. = **Callaeum psilophyllum** (A. Juss.) D.M. Johnson
Referencias: Johnson, D. M., 1986b.

Mascagnia pulcherrima (Morong) Skottsbo. = **Mascagnia divaricata** (Kunth) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1993.

Mascagnia rigida (A. Juss.) Griseb. = **Amorimia rigida** (A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Mascagnia rigida (A. Juss.) Griseb. subsp. *coriacea* (Griseb.) Nied. = **Amorimia rigida** (A. Juss.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

[*Mascagnia sepium* (A. Juss.) Griseb.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Mascagnia sepium auct. non (A. Juss.) Griseb.
= **Mascagnia australis** C.E. Anderson

Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb. var. *mediterranea* Nied. = **Mascagnia australis** C.E. Anderson

Mascagnia sericans Nied. = **Niendenzuella stannea** (Griseb.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Mascagnia stannea (Griseb.) Nied. = **Niendenzuella stannea** (Griseb.) W.R. Anderson
Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Mionandra Griseb.

Número de especies: 2, 1 endémica

Mionandra argentea Griseb. = **Cordobia argentea** (Griseb.) Nied.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Múlgura, M. E., 1994b.

Mionandra camareoides Griseb.
Sin.: *Brittonella pilosa* Rusby, *Mionandra camareoides* Griseb. f. *prostrata* Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 1999; Múlgura, M. E., 1994b.
Subarbusto. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, S. 5770 (SI)].

Mionandra camareoides Griseb. f. *prostrata* Nied.
= **Mionandra camareoides** Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Mionandra camareoides Griseb. var. *paraguariensis* Nied. = **Mionandra paraguariensis** Chodat

Mionandra paraguariensis Chodat
Sin.: *Mionandra camareoides* Griseb. var. *paraguariensis* Nied.
Referencias: Chodat, R. H. & Vischer, W., 1917a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[Chodat, R. H. 238 (G)].

Niendenzuella W.R. Anderson

Número de especies: 6

Niendenzuella acutifolia (Cav.) W.R. Anderson
Sin.: *Tetrapteryx acutifolia* Cav.
Referencias: Anderson, W. R., 2006.
Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 25820 (MICH)].

Niendenzuella lucida (A. Juss.) W.R. Anderson
Sin.: *Hiraea multiflora* Griseb., *Tetrapteryx lucida* A. Juss., *Tetrapteryx multiflora* (Griseb.) A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 2006.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[Silva, J. M. 59 (SI)].

Niendenzuella multiglandulosa (A. Juss.) W.R. Anderson
Sin.: *Tetrapteryx multiglandulosa* A. Juss.
Referencias: Anderson, W. R., 2006.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 7919 (NY)]; PRY[Mereles, F. 3923 (FCQ)].

Niendenzuella sericea (A. Juss.) W.R. Anderson
Sin.: *Hiraea laurifolia* A. Juss., *Hiraea sericea* A. Juss., *Tetrapteryx chalcophylla* A. Juss., *Tetrapteryx glandulosa* Griseb., *Tetrapteryx laurifolia* (A. Juss.) Griseb., *Tetrapteryx ligustrifolia* Nied., nom. illeg.
Referencias: Anderson, W. R., 1999, 2006.
Arbusto o liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 5737 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 13338 (MICH)]; PRY[Zardini, E. M. 55553 (MO)].

Niendenzuella stannea (Griseb.) W.R. Anderson
Sin.: *Heteropteryx stannea* Griseb., *Mascagnia sericans* Nied., *Mascagnia stannea* (Griseb.) Nied.
Referencias: Anderson, W. R., 2006.
Liana. Nativa. 200–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[Hassler, E. 7825 (G, K, MICH, NY)].

Niedenzuella suaveolens (A. Juss.) W.R. AndersonSin.: *Tetrapterys suaveolens* A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Liana. Nativa. 100–300 m.

Países: PRY(COA).

Ejemplares de referencia: PRY[Tressens, S. G. 4770 (CTES, MICH)].

Peixotoa A. Juss.

Número de especies: 5, 2 endémicas

Peixotoa catarinensis C.E. Anderson

Referencias: Anderson, C. E., 1982.

Arbusto. Endémica. 100 m.

Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Smith, L. B. 12276 (K, NY, P, R, RB, US)].

Peixotoa cordobensis Kuntze = **Cordobia argentea** (Griseb.) Nied.

Referencias: Anderson, C. E., 1982; Múlgura, M. E., 1994b.

Peixotoa discolor Griseb. = **Peixotoa parviflora** A. Juss.

Referencias: Anderson, C. E., 1982.

Peixotoa floribunda C.E. Anderson

Referencias: Anderson, C. E., 2001b.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: PRY(APY).

Ejemplares de referencia: PRY[Zardini, E. M. 50346 (MICH, MO)].

Peixotoa jussieuana A. Juss.Sin.: *Peixotoa jussieuana* A. Juss. var. *velutina* Nied.

Referencias: Niedenzu, F., 1928.

Arbusto o liana. Nativa.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 1413 (MICH)].

Peixotoa jussieuana A. Juss. var. *velutina* Nied.
= **Peixotoa jussieuana** A. Juss.**Peixotoa parviflora** A. Juss.Sin.: *Peixotoa discolor* Griseb.

Referencias: Anderson, C. E., 1982, 2001b.

Arbusto o liana. Nativa. 700–800 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 11685 (A, BM, G, GH, K, MO, NY, S, US)].

Peixotoa reticulata Griseb.

Referencias: Anderson, C. E., 1982; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002.

Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI, SPE).

Ejemplares de referencia: BRA[Anderson 11155 (MICH, NY, UB)]; PRY[Hassler, E. 5927 (A, BM, F, G, K, MO, NY, P, S, W)].

Peregrina W.R. Anderson

Número de especies: 1 endémica

Peregrina linearifolia (A. St.-Hil.) W.R. AndersonSin.: *Aspicarpa linearifolia* (A. St.-Hil.) Nied., *Camarea juncea* Griseb., *Gaudichaudia linearifolia* A. St.-Hil., *Janusia linearifolia* (A. St.-Hil.) A. Juss.

Referencias: Anderson, W. R., 1985, 1999; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[Múlgura de Romero, M. E. 2072 (SI)]; BRA[Dusén, P. K. H. 15657 (F, GH, MO, NY, S, US)]; PRY[Marín, G. 686 (CTES)].

Ptilochaeta Turcz., nom. cons.

Número de especies: 2

Ptilochaeta densiflora Nied.

Arbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(APY).

Ejemplares de referencia: PRY[Hassler, E. 7278 (NY)].

[*Ptilochaeta elegans* Nied.]

Notas: Nombre dudoso.

Ptilochaeta nudipes Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).

Ejemplares de referencia: ARG[Rodríguez 1057 (LP)]; PRY[Degen, R. 3277 (FCQ)].

Stigmaphyllon A. Juss.

Número de especies: 6, 1 endémica

Stigmaphyllon arenicola C.E. AndersonSin.: *Stigmaphyllon martianum* A. Juss. var. *variabile* Nied.

Referencias: Anderson, C. E., 1993, 1997a.

Liana. Nativa. 0–400 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 42721 (MICH)].

Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.)

C. E. Anderson

Sin.: *Banisteria bonariensis* Hook. & Arn., *Stigmaphyllon heterophyllum* Hook., *Stigmaphyllon littorale* A. Juss., *Stigmaphyllon littorale* A. Juss. var. *trilobum* Nied.

Referencias: Anderson, C. E., 1997[1996]b; Anderson, C. E., 1997a.

Liana. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, APA, ITA, MIE, NEE); URY(COL, MON, RNO).

Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 5249 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 15826 (MICH, P)]; PRY[Fiebrig, K. A. G. 5459 (G, GH, K, US)]; URY[Herter, W. G. F. 692 (F, G, GH, LE, M, MO, NY, S, U, WIS)].

Stigmaphyllon calcaratum N.E. Br.Sin.: *Stigmaphyllon hasslerianum* Nied.Referencias: Anderson, C. E., 1997a; Múlgura, M. E., 1994b.
Liana. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE); PRY(APY, CEN, CON, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[Schulz 90 (CTES, SI)];
PRY[Zardini, E. M. 24132 (MO)].**Stigmaphyllon ciliatum** (Lam.) A. Juss.Sin.: *Banisteria ciliata* Lam.

Referencias: Anderson, C. E., 1997a.

Liana. Nativa. 0–100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 37981
(MICH, MO)]; URY[Marsaud s.n. (DS)].**Stigmaphyllon hasslerianum** Nied. = **Stigmaphyllon calcaratum** N.E. Br.

Referencias: Anderson, C. E., 1997a; Múlgura, M. E., 1994b.

Stigmaphyllon heterophyllum Hook. = **Stigmaphyllon bonariense** (Hook. & Arn.) C. E. Anderson

Referencias: Anderson, C. E., 1997[1996]b; Anderson, C. E., 1997a.

Stigmaphyllon jatrophifolium A. Juss.Sin.: *Stigmaphyllon jatrophifolium* A. Juss. f. *gracile* Nied.Referencias: Anderson, C. E., 1997a; Soria Rey, N.,
Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Liana. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA);
PRY(APY, APA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, ITA,
MIE, PAI, SPE); URY(MON, SAO).Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 5292 (SI)];
BRA[Pedersen, T. M. 11990 (C, CTES, MICH)];
PRY[Zardini, E. M. 9842 (FCQ, MO)]; URY[Osten, C.
5421 (US)].**Stigmaphyllon jatrophifolium** A. Juss. f. *gracile* Nied.
= **Stigmaphyllon jatrophifolium** A. Juss.

Referencias: Anderson, C. E., 1997a.

Stigmaphyllon littorale A. Juss. = **Stigmaphyllon bonariense** (Hook. & Arn.) C. E. Anderson

Referencias: Anderson, C. E., 1997a, 1997[1996]b.

Stigmaphyllon littorale A. Juss. var. *trilobum* Nied.
= **Stigmaphyllon bonariense** (Hook. & Arn.)

C. E. Anderson

Referencias: Anderson, C. E., 1997[1996]b.

Stigmaphyllon martianum A. Juss. var. *variabile* Nied.
= **Stigmaphyllon arenicola** C.E. Anderson

Referencias: Anderson, C. E., 1993.

[*Stigmaphyllon megacarpum* (Vell.) Griseb.]

Referencias: Anderson, C. E., 1997a.

Notas: Nombre dudoso.

Stigmaphyllon tomentosum A. Juss.

Referencias: Anderson, C. E., 1997a.

Liana. Nativa. 0–700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 18108
(MICH, P)].**Tetrapteryx Cav., nom. cons.**

Número de especies: 6, 1 endémica

Tetrapteryx acutifolia Cav. = **Niedenzuella acutifolia**
(Cav.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Tetrapteryx ambigua (A. Juss.) Nied.Sin.: *Hiraea ambigua* A. Juss., *Mascagnia ambigua* (A. Juss.)Griseb., *Mascagnia ambigua* (A. Juss.) Griseb.f. *paraguayensis* (Nied.) Nied., *Mascagnia**paraguayensis* Nied., *Tetrapteryx ambigua* (A. Juss.)Nied. var. *paraguayensis* (Nied.) Nied., *Tetrapteryx**paraguariensis* Nied., *Tetrapteryx pilifera* S. MooreReferencias: Anderson, W. R., 1999; Jiménez, B., Knapp, S.,
Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(JUJ, MIS); PRY(AMA, CAU, CAN, CON,
COA, SPE).Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 31963
(MICH, SI)]; PRY[Jiménez, B. 1642 (BM, CTES, G,
MO, PY)].**Tetrapteryx ambigua** (A. Juss.) Nied. var. *paraguayensis*
(Nied.) Nied. = **Tetrapteryx ambigua** (A. Juss.)

Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Tetrapteryx chalcophylla A. Juss. = **Niedenzuella sericea**
(A. Juss.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Tetrapteryx cinerea Griseb. = **Tetrapteryx mollis** Griseb.
Referencias: Anderson, W. R., 1999.**Tetrapteryx glandulosa** Griseb. = **Niedenzuella sericea**
(A. Juss.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Tetrapteryx hassleriana Nied.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: PRY(CON).

Ejemplares de referencia: PRY[Hassler, E. 7410 (SI)].

Tetrapteryx laurifolia (A. Juss.) Griseb. = **Niedenzuella sericea**
(A. Juss.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Tetrapteryx ligustrifolia Nied., nom. illeg. = **Niedenzuella sericea**
(A. Juss.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Tetrapteryx lucida A. Juss. = **Niedenzuella lucida**
(A. Juss.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Tetrapteryx mollis Griseb.Sin.: *Tetrapteryx cinerea* Griseb.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Arbusto o liana. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 6889 (SI)];
BRA[Wassum, R. A. s.n. (NY)].Notas: Especie afín a *Tetrapteryx phlomoides*, posiblemente no distinta de esta.**Tetrapteryx multiflora** (Griseb.) A. Juss. = **Niendenzuella lucida** (A. Juss.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Tetrapteryx multiglandulosa A. Juss. = **Niendenzuella multiglandulosa** (A. Juss.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Tetrapteryx paraguariensis Nied. = **Tetrapteryx ambigua** (A. Juss.) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Tetrapteryx phlomoides (Spreng.) Nied.Sin.: *Malpighia phlomoides* Spreng.

Enredadera. Perenne. Nativa.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 64421 (MBM)].

Tetrapteryx pilifera S. Moore = **Tetrapteryx ambigua** (A. Juss.) Nied.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Tetrapteryx salicifolia (A. Juss.) Nied.Sin.: *Hiraea salicifolia* A. Juss.

Referencias: Niendenzu, F., 1928.

Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR); PRY(GUA).

Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 2776 (*)];
PRY[Jørgensen, P. 4042 (A, C, DS)].**Tetrapteryx suaveolens** A. Juss. = **Niendenzuella suaveolens** (A. Juss.) W.R. Anderson

Referencias: Anderson, W. R., 2006.

Tetrapteryx xylosteifolia A. Juss.

Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 40286 (MBM)].

Thryallis Mart., nom. cons.

Número de especies: 2

Thryallis brachystachys Lindl.Sin.: *Hemsleya brachystachys* (Lindl.) Kuntze, *Thryallis brachystachys* Lindl. var. *obtusata* Nied., *Thryallis latifolia* Mart. var. *ovatifolia* (Nied.) Nied., *Thryallis ovatifolia* Nied., *Thryallis rotundifolia* A. Gray

Referencias: Anderson, C. E., 1995.

Arbusto o liana. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APY, AMA, CON).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 37839 (MICH, MO, NY, SP)]; PRY[Fiebrig, K. A. G. 4530 (BM, G, GH, K, M, NY)].

Thryallis brachystachys Lindl. var. *acuminata* Nied.,
nom. superfl. = **Thryallis laburnum** S. Moore
Referencias: Anderson, C. E., 1995.*Thryallis brachystachys* Lindl. var. *obtusata* Nied.
= **Thryallis brachystachys** Lindl.
Referencias: Anderson, C. E., 1995.*Thryallis brasiliensis* L. = **Galphimia brasiliensis** (L.)
A. Juss.

Referencias: Anderson, C. E., 2005.

Thryallis laburnum S. MooreSin.: *Thryallis brachystachys* Lindl. var. *acuminata* Nied.,
nom. superfl., *Thryallis laburnum* S. Moore var. *minor*
S. Moore, *Thryallis latifolia* Mart. f. *laburnum*
(S. Moore) Nied.

Referencias: Anderson, C. E., 1995.

Arbusto o liana. Nativa. 100–300 m.

Países: PRY(APY).

Ejemplares de referencia: PRY[Weddell, H. A. 3017 (P)].

Thryallis laburnum S. Moore var. *minor* S. Moore
= **Thryallis laburnum** S. Moore
Referencias: Anderson, C. E., 1995.*Thryallis latifolia* Mart. f. *laburnum* (S. Moore) Nied.
= **Thryallis laburnum** S. Moore
Referencias: Anderson, C. E., 1995.*Thryallis latifolia* Mart. var. *ovatifolia* (Nied.) Nied.
= **Thryallis brachystachys** Lindl.
Referencias: Anderson, C. E., 1995.*Thryallis ovatifolia* Nied. = **Thryallis brachystachys**
Lindl.
Referencias: Anderson, C. E., 1995.*Thryallis rotundifolia* A. Gray = **Thryallis brachystachys** Lindl.
Referencias: Anderson, C. E., 1995.**Tricomaria** Hook. & Arn.

Número de especies: 1 endémica

Tricomaria usillo Hook. & Arn.

Referencias: Anderson, W. R., 1999.

Arbusto. Endémica. 500–1500 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Pozner, R. 281 (CTES, SI)].

Triopteris brasiliensis Poir. = **Banisteriopsis ferruginea**
(Cav.) B. Gates
Referencias: Gates, B., 1982.