

CXLIV. Familia MALPIGHIACEAE

1252. *Banisteriopsis* C. B. Rob. in Small, N. Amer. fl. 25(2): 131 (1910)
Typus: *Banisteriopsis cornifolia* (Kunth) C. B. Rob.
4311. *Banisteriopsis acapulcensis* (Rose) Small, N. Amer. fl. 25(2): 132 (1910)
= *Heteropterys acapulcensis* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5(3): 139 (1897)
IL: «Collected by Dr. Edward Palmer near Acapulco, December, 1894, (No. 219)»
= *Banisteria guatemalensis* Nied., Banisteria: 6 (1900)
= *Banisteriopsis guatemalensis* (Nied.) C. B. Rob. in Small, N. Amer. fl. 25(2): 132 (1910)
IL: «Type: Guatemala, *Seler 2428* (B)», fide J. Cuatrecasas & T. B. Croat (1980: 857)
287. *Banisteriopsis acapulcensis* (Rose) Small var. *acapulcensis*
IL: «Collected by Dr. Edward Palmer near Acapulco, December, 1894, (No. 219)»
CC: B. Gates (1982: 46, fig. 5)
NV: ala de cucaracha; chilillo; sombra de cusuco
4312. *Banisteriopsis cornifolia* (Kunth) C. B. Rob. in Small, N. Amer. fl. 25(2): 132 (1910)
= *Heteropterys cornifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 165 (1822)
= *Banisteria cornifolia* (Kunth) Spreng., Syst. veg. 2: 388 (1825)
= *Banisteria maracaybensis* A. Juss. var. *cornifolia* (Kunth) Nied., Banisteria: 5 (1900)
IL: «Crescit prope Ibague Novo-Granatensium, alt. 700 hex.»
CC: Ant. Molina (1975: 64), C. Nelson (1986b: 68, fig. 20)
4313. *Banisteriopsis elegans* (Triana & Planch.) Sandwith, J. Arnold. Arbor. 24(2): 222 (1943)

Catálogo de las plantas vasculares de Honduras

- = *Banisteria elegans* Triana & Planch., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 18: 322 (1862)
- = *Banisteriopsis martiniana* (A. Juss.) Cuatrec. var. *elegans* (Triana & Planch.) Cuatrec., Webbia 13(2): 501 (1958)
- IL: «Prov. de Buenaventura, cordillera occidental, alt. 1000 metros»
- = *Banisteria elegans* Triana & Planch. var. *guatemalensis* Nied., Malpigh. amer. 2: 16 (1912)
- IL: «Von Tuerckheim II 1785, Guatemala: Alta Verapaz: Cobán, flower (B-destroyed, fragm NY)», fide w³-TROPICOS (MO)
- = *Banisteriopsis speciosa* Small, N. Amer. fl. 25(2): 133 (1910)
- IL: «Type collected at Coban, Guatemala, May, 1907, H. von Tuerckheim II. 1785 (herb. John Donnell Smith)»
- = *Banisteriopsis scalariformis* Schery in Woodson & Schery, Ann. Missouri Bot. Gard. 30(1): 93 (1943)
- IL: «[Panama.] Bocas del Toro: Western River, Sept. 27, 1941, H. von Wedel 2776 (Herb. Missouri Bot. Gard., type)»
- CC: Ant. Molina (1975: 64), B. Gates (1982: 136, fig. 30)

- 4314. *Banisteriopsis muricata* (Cav.) Cuatrec., Webbia 13(2): 503 (1958)**
- = *Banisteria muricata* Cav., Diss. 9: 423, tab. 246 (1790)
 - IL: «Habitat in Perú, ubi eam reperit *Iosephus de Jussieu*. V[isam] S[iccam] communicatam ab huius nepote»
 - = *Heteropterys argentea* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 164, tab. 450 (1822)
 - = *Banisteria argentea* (Kunth) Spreng., Syst. veg. 2: 388 (1825)
 - = *Banisteriopsis argentea* (Kunth) C. B. Rob., N. Amer. fl. 25(2): 138 (1910)
 - IL: «Crescit in Regno Novo-Granatensi»
 - = *Banisteria schomburgkiana* sensu Donn. Sm., Enum. pl. guatem. 4: 16 (1895)
 - CC: J. D. Smith (1895: 16), P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 470), Ant. Molina (1975: 64)

- 1253. *Bronwenia* W. R. Anderson & C. Davis, Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 138 (2007)**
 Typus: *Bronwenia ferruginea* (Cav.) W. R. Anderson & C. Davis

- 4315. *Bronwenia acapulcensis* (Rose) W. R. Anderson & C. Davis, Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 141 (2007)**
- = *Heteropterys acapulcensis* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5(3): 139 (1897)
 - = *Banisteriopsis acapulcensis* (Rose) Small, N. Amer. fl. 25(2): 132 (1910)
 - IL: «Collected by Dr. Edward Palmer near Acapulco, December, 1894, (No. 219)»
 - = *Banisteria guatemalensis* Nied., Banisteria: 6 (1900)
 - = *Banisteriopsis guatemalensis* (Nied.) C. B. Rob. in Small, N. Amer. fl. 25(2): 132 (1910)
 - IL: «Type: Guatemala, *Seler 2428* (B)», fide J. Cuatrecasas & T. B. Croat (1980: 857)
 - NV: ala de cucaracha; chilillo; sombra de cusuco

- 4316. *Bronwenia cornifolia* (Kunth) W. R. Anderson & C. Davis, Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 142 (2007)**
- = *Bunchosia cornifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 154 (1822)
 - = *Banisteria cornifolia* (Kunth) Spreng., Syst. veg. 2: 388 (1825)
 - = *Banisteriopsis cornifolia* (Kunth) C. B. Rob. in Small, N. Amer. fl. 25: 132 (1910)
 - IL: «Crescit inter Turbaco et Carthagena de Indias, alt. 150 hex. (Regno Novo-Granatensi)»
 - CC: P. C. Standley (1930c: 21); (1931b: 243), Ant. Molina (1975: 64)

- 1254. *Bunchosia* Rich. ex Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 153 (1822)**
 Typus: *Bunchosia odorata* (Jacq.) Kunth

- 4317. *Bunchosia armeniaca* (Cav.) DC., Prodr. 1: 582 (1824)**
- = *Malpighia armeniaca* Cav., Diss. 8: 410, tab. 238 (1789)
 - IL: «Habitat in regno Peruano in Chancae provincia. Primus reperit atque delineavit D. Iosephus de Jussieu; novissime vero observata fuit a peregrinatoribus Dombeyo, Pavonio, et Ruizio. Appellatur vulgo Cirhuella de Frayle: prunus monachi. V[isa] S[iccam] apud D. de Jussieu»
 - CC: C. Alix, O. Vargas & A. D. Lobo (1999: 155)
 - OB: (C)
 - NV: cansaboca, fide C. Alix, O. Vargas & A. D. Lobo (1999)

- 4318. *Bunchosia cornifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 154 (1822)**
- IL: «Crescit inter Turbaco et Carthagena de Indias, alt. 150 hex. (Regno Novo-Granatensi)»
 - CC: P. C. Standley (1930c: 21); (1931b: 243), Ant. Molina (1975: 64)

- 4319. *Bunchosia gracilis* Nied., Bunchosia: 5 (1898)**
- IL: «Mexico: (*Schaffner 479*); Guatemala (*Tuerckheim ed. Smith 1033*); Costarica (*Oersted 22*: in monte Aguacaliente); Panama (*Wagner*: Maume et Gorgone <*L. B. glanduliferu* Hb. Griseb.>; *J. Lange*)»
 - CC: Ant. Molina (1975: 64), C. Nelson (1986b: 577)
 - NV: jocote

- 4320. *Bunchosia guatemalensis* Nied., Bunchosia: 5 (1898)**
- IL: «Guatemala (*J. D. Smith 1994 et 2084*: Dep. Escuintla <*B. strigosa*>; Bernoulli et Cario 3012: Retaluleu)»
 - CC: Ant. Molina (1975: 64)

- 4321. *Bunchosia lanieri* S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 21(2): 461 (1886); vide Proc. Amer. Acad. Arts, N. S., 13(2): 461 (1886)**

- IL: «[Department of Yzabal, Guatemala, February to April, 1885] On the Camino Real near Yzabal [S. Watson]»
 CC: C. Nelson 17113 & R. Andino (TEFH)
 NV: hojona; ojojona
- 4322.** *Bunchosia lindeniana* A. Juss., Arch. Mus. Hist. Nat. 3: 335 (1843)
 IL: «(h[orto] et v[isa] s[icca] herb. mus. Par.). Hab. Mexicum [...] In provinciâ Vera-Cruz juxta Miradores ad pedum 3-4000 altit. julio et augusto florentem legerunt cl. Linden (Pl. exs. 911) et Galeotti (Pl. exs. 4340)»
 = *Bunchosia lanceolata* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 36(1): 582 (1863)
 IL: «Mexico, Orizaba, Botteri coll. sine numero»
 = *Bunchosia lanceolata* sensu C. Nelson (1976: 64)
 CC: C. Nelson (1976c: 64)
- 4323.** *Bunchosia mesoamericana* W. R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 23: 66 (2001)
 IL: «TYPE: GUATEMALA. Zacapa: Gualán, ravine, 620 ft, 20 Jun 1909 fl, C.C. Deam 6363 (holotype: MICH!; isotypes: FI GH! MO! NY! US!)»
 CC: W. R. Anderson (2001b: 67)
- 4324.** *Bunchosia montana* A. Juss., Arch. Mus. Hist. Nat. 3: 340 (1843)
 IL: «(v[isa] s[icca] herb. mus. Par.). Hab. Mexicum [...] In porphyris Mitlae, legas 14 ab Oaxaca distantis, ad ped. 5500 alt. maio florentem legit cl. Galeotti (Pl. exs. 4331)»
 CC: C. Nelson (1976c: 64)
- 4325.** *Bunchosia nitida* (Jacq.) A. Juss., Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 18: 481 (1811); DC., Prodr. 1: 582 (1824)
 = *Malpighia nitida* Jacq., Enum. syst. pl.: 21 (1760)
 IL: «In Insulis Caribaeis vicinaque Americae continente», secundum nomen libri
 CC: J. D. Smith (1895: 15). S. J. Record (1927: 28). P. C. Standley (1930c: 21); (1931b: 243). Ant. Molina (1975: 64)
- 4326.** *Bunchosia odorata* (Jacq.) Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 153 (1822). Figura 613.
 = *Malpighia odorata* Jacq., Enum. syst. pl.: 21 (1760)
 IL: «In Insulis Caribaeis vicinaque Americae continente», secundum nomen libri
 = *Bunchosia pilosa* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 156 (1822)
 IL: «Crescit prope Turbaco Novo-Granatensium, alt. 180 hex.»
 = *Bunchosia costaricensis* Rose in Pittier, Prim. fl. costaric. 2(1): 63 (1898)
 IL: «Type: Costa Rica, San José, Río Tiliří, 1130 m, Pittier 4286 (US syntype)», fide J. Cuatrecasas & T. B. Croat (1980: 868)
 = *Bunchosia macrophylla* Rose in Pittier, Prim. fl. costaric. 2(1): 64 (1898)
 IL: «Type: Costa Rica, between Sipurio and Tsuritkub (Talamanca), 100 m, Pittier & Tonduz 8686»
 Lectotypus ex J. Cuatrecasas & T. B. Croat (1980: 868); Pittier & Tonduz 8686 (US)
 CC: P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 476). T. G. Yuncker (1938: 372). Ant. Molina (1975: 64)
- 1255.** *Byrsonima* Rich. ex Juss., Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 18: 481 (1811)
 Typus: *Byrsonima spicata* (Cav.) Kunth
- 4327.** *Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 149 (1822). Figura 614.
 = *Malpighia crassifolia* L., Sp. pl. 1: 426, no. 3 (1753)
 IL: «Habitat in America calidiore»
 = *Byrsonima pulchra* Sessé & Moç. ex DC., Prodr. 1: 580 (1824)
 = *Malpighia pulchra* Sessé & Moç. ex DC., Fl. mexic.: icon. 115 (1894), pro syn.
 IL: «in Mexici montibus»
 = *Byrsonima laurifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 147 (1822)
 IL: «Crescit in Llanos de Cumana, prope Alto del Pyritals»
 = *Byrsonima rufescens* Bertol., Fl. guatimal.: 18 (1840)
 IL: «Habitat in Escuintla Guatimalae, Joaquin Velásquez s.n.»
 = *Byrsonima panamensis* Beurl., Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1854: 117 (1854)
 IL: «Type: Panama, Colon Province near Portobello, Billberg (probably NY)», fide J. Cuatrecasas & T. B. Croat (1980: 873)
 = *Byrsonima fendleri* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou: 582 (1863)
 IL: «Type: Panama, Fendler 24 (US, isotype)», fide J. Cuatrecasas & T. B. Croat (1980: 873)
 = *Byrsonima laurifolia* Kunth var. *guatemalensis* Nied., Pflanzenr. IV. 141: 724 (1928)
 IL: «HT: Rojas 362, Guatemala: San Antonio de Flores», fide w¹-TROPICOS (MO)
 CC: J. D. Smith (1895: 15). S. J. Record (1927: 28). A. Pérez Estrada (1929: 9). P. C. Standley (1930c: 21); (1930d: 31); (1931b: 243). T. G. Yuncker (1938: 373); (1940: 300). P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 478). Ant. Molina (1975: 64). A. F. Clewell (1986: 265). C. Nelson (1986b: 671, fig. 461). E. Bermingham & al. (1998: 21). C. Alix, O. Vargas & A. D. Lobo (1999: 157). N. Zamora V. (2000: 133)
 NV: crabboo (angl.); crabo, fide P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq); heb (jicaque), fide D. Lentz (1987); krabu (miskito); krabu yari (miskito, nance grande); nance, fide A. Pérez Estrada (1929); nancite, fide N. Zamora V. (2000); nancito, fide L. Landa ex S. J. Record (1927); nuren (garifuna), fide V. L. Ochoa López (1991)
- 4328.** *Byrsonima verbascifolia* (L.) DC., Prodr. 1: 579 (1824). Figura 615.
 = *Malpighia verbascifolia* L., Sp. pl. 1: 426, no. 4 (1753)

Catálogo de las plantas vasculares de Honduras

- *Byrsonima verbascifolia* (L.) Rich. ex A. Juss., Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 18: 481 (1811), nom. inval.
 IL: «Habitat in America calidior»
 CC: C. Nelson (1986a: 205). W. R. Anderson (2001a: 1267)
 NV: krabu (mískito); twi krábuka (mískito, nance de sabana)

1256. *Galphimia* Cav., Icon. 5: 61, tab. 489 (1799)
 Typus: *Galphimia glauca* Cav.

- 4329. *Galphimia glauca* Cav., Icon. 5: 61, tab. 489 (1799)**
 = *Thryallis glauca* (Cav.) Kuntze, Revis. gen. pl. 1: 89 (1891)
 IL: «Habitat in Acambaro et Salvatierra in Regno mexicano ubi dictam altitudinem attingit dicente Ludovico Née [...] in hoc Matritensi horto culta anno 1794»
 CC: P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 480). Ant. Molina (1975: 65). C. Nelson (1986b: 163, fig. 96)
 CC: (C)
 NV: berbería; botón de oro; flor de oro; lluvia de oro; pascua; santa maría; santa marta

- 4330. *Galphimia gracilis* Bartl., Linnaea 13: 552 (1839)**
 = *Thryallis gracilis* (Bartl.) Kuntze, Revis. gen. pl. 1: 89 (1891)
 IL: «In regno Mexicano? Colitur in H[orto] Gotting, aliisque (v[isa] v[iva] c[ulta])»
 = *Thryallis montana* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12(7): 281 (1909)
 IL: «Collected by J. N. Rose in southern Durango, August 15, 1897 (no. 2309) [...] Type in U. S. National Herbarium no. 301220»
 CC: Ant. Molina (1975: 65)
 OB: (C)
 NV: berbería; botón de oro; flor de oro; lluvia de oro; pascua; santa maría; santa marta

- 4331. *Galphimia speciosa* C. E. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 60, fig. 27 (2007). Figuras 616 y 617.**
 IL: «Type: Mexico. Chiapas: 2.5 km NW of Comitán on rd to San Cristóbal de las Casas, brushy cut-over roadside, 1820 m, 27 Oct 1988, Anderson 13555 (holotype: MICH!; isotypes: CHAPA! DUKE! IEB! MBM! MO! NY!)»
 CC: C. Anderson (2007: 63)
 NV: berbería; botón de oro; flor de oro; lluvia de oro; pascua; santa maría; santa marta

1257. *Gaudichaudia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. sp. pl. 5: tab. 445 (1821); ed. fol. 121; ed. qu. 156 (1822)
 Typus: *Gaudichaudia cynanchoides* Kunth

- 4332. *Gaudichaudia albida* Cham. & Schltdl., Linnaea 5: 217 (1830)**
 = *Banisteria albida* (Cham. & Schltdl.) Willd. ex Steud., Nom. bot., ser. 2, 1: 138 (1841)
 = *Tritomopterys albida* (Cham. & Schltdl.) Nied., Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceums Hosianum Braunsberg 4: 31 (1912)
 = *Aspicarpa albida* (Schltdl. & Cham.) Hassl., Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 210 (1918)
 IL: «[Plantarum mexicanarum a cel. viris Schiede et Deppe collectatum:] Hacienda de la Laguna, [Schiede & Deppe]»
 = *Triopteris sericea* Schltdl., Linnaea 10: 243 (1836)
 = *Gaudichaudia schiedeana* A. Juss., Arch. Mus. Hist. Nat. 3: 591 (1843), nom. nov. pro *Triopteris sericea* Schltdl.
 IL: «[Mexico:] Malpais de Naulingo [G. Schiede]»
 CC: P. C. Standley (1930d: 31). P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 481). Ant. Molina (1975: 65). C. Nelson (1986b: 68)
 NV: ala de cucaracha; cantagallo; flor de novia; picapica; raíz de estrella

- 4333. *Gaudichaudia hexandra* (Nied.) Chodat, Bull. Soc. Bot. Genève, sér. 2, 9: 100 (1917)**
 = *Tritomopterys hexandra* Nied., Malpigh. amer. 1: 30 (1912)
 = *Aspicarpa hexandra* (Nied.) Hassl., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 210 (1918)
 IL: «HT: Seler 2406, Guatemala: Río de las Vacas, between Chinantla and Chiquín», fide w³-TROPICOS (MO)
 CC: C. Nelson (1976c: 64)

1258. *Heteropterys* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 163, tab. 450 (1822)
 Typus: *Heteropterys purpurea* (L.) Kunth

- 4334. *Heteropterys brachiata* (L.) DC., Prodr. 1: 591 (1824)**
 = *Banisteria brachiata* L., Sp. pl. 1: 428 (1753), non Spreng. (1825) nec Willd. ex A. Juss. (1843) nec Billb. ex Beutl. (1856)
 = *Heteropterys tomentosa* Hook. & Arn., Bot. Beechey voy. 6: 281 (1838), non A. Juss. in A. St.-Hil. (1833)
 = *Heteropterys beecheyana* A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 13: 278 (1840), nom. nov. pro *Heteropterys tomentosa* Hook. & Arn.
 IL: «Mexico»
 = *Malpighia rotundifolia* Sessé & Moc., Pl. nov. Hisp.: 73 (1888); ed. 2: 68 (1893)
 IL: «Habitat in Mazatlán»
 Lectotypus ex C. Nelson (1997: 402): Sessé & al. 1102 bis (MA)
 = *Heteropterys retusa* Donn. Sm., Bot. Gaz. 16(1): 2 (1891), «*Heteropterys*»
 = *Banisteria retusa* (Donn. Sm.) C. B. Rob. in Small, N. Amer. fl. 25(2): 136 (1910)

- IL: «Along streams near Escuintla, Dept. Escuintla, alt. 1,100 feet, March, 1890, J.D. S. (Ex Pl. cit. 2068.)»
 = *Banisteria simulans* Small, N. Amer. fl. 25(2): 136 (1910)
 = *Heteropterys simulans* (Small) Nied. in Engl., Pflanzenr. IV. 141 (Heft 93): 380 (1928)
 IL: «Type collected near Los Canos, San Luis Potosi, Mexico, October 15-21, 1902, Edward Palmer 258 (herb. N. Y. Bot. Gard.)»
 CC: J. D. Smith (1895: 15). Ant. Molina (1975: 65). C. Nelson (1986b: 643)
 NV: matapijos
- 4335. *Heteropterys laurifolia* (L.) A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot., sér 2, 13: 276 (1840)**
 = *Banisteria laurifolia* L., Sp. pl. ed. 2, 1: 611, no. 3 (1762)
 IL: «Habitat in Jamaica»
 = *Banisteria caerulea* Lam., Encycl. 1: 367 (1783)
 = *Heteropterys caerulea* (Lam.) DC., Prodr. 1: 591 (1824)
 IL: «C'est une plante sarmentueuse & grimpante de l'Amérique méridionale»
 = *Malpighia dubia* Cav., Diss. 8: 413, tab. 242 (1789)
 IL: «Habitat in insula Sancti Dominici. V. S. apud D. de Jussieu»
 = *Heteropterys floribunda* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 166 (1822)
 IL: «Crescit in declivitate occidentali montium Mexicanorum, prope Venta del Exido, alt. 220 hex.»
 = *Heteropterys longifolia* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 166 (1822), «*Heteropteris*»
 IL: «Crescit prope urbem Mexici, alt. 1170 hex. Floret Majos»
 CC: J. D. Smith (1895: 15). A. Pérez Estrada (1929: 7). P. C. Standley (1931b: 244). T. G. Yuncker (1940: 300). Ant. Molina (1975: 65). C. Nelson (1986b: 374)
- 4336. *Heteropterys leona* (Cav.) Exell, Cat. vasc. pl. S. Tomé: 123 (1944)**
 = *Banisteria leona* Cav., Diss. 9: 424 (1790)
 IL: «Habitat in Africae Sierra Leona, fortasse ex America adportata. V. S. exemplar africanum apud D. Thouin, ipsi datum a D. Smeathman. In herbario D. de Jussieu exemplaria existunt americana»
 = *Malpighia reticulata* Poir., Encycl. Suppl. 4: 8 (1816)
 = *Byrsonima reticulata* (Poir.) DC., Prodr. 1: 581 (1824)
 = *Heteropterys reticulata* (Poir.) Nied., Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceums Hosianum Braunsberg 2: 54 (1903), nom. illeg., non Griseb. (1858)
 = *Banisteria reticulata* (Poir.) C. B. Rob., N. Amer. fl. 25(2): 138 (1910)
 IL: «Cette plante a été recueillie à Cayenne par M. Joseph Martin. (V. s. in herb. Desfont.)»
 = *Banisteria multiflora* DC., Prodr. 1: 589 (1824)
 = *Heteropterys multiflora* (DC.) Hochr., Bull. New York Bot. Gard. 6(21): 277 (1910)
 IL: «in Cayennâ. Patris»
 CC: P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 485). Ant. Molina (1975: 65)
- 4337. *Heteropterys obovata* (Small) Cuatrec. & Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 67(4): 886 (1980)**
 = *Banisteria obovata* Small, N. Amer. fl. 25(2): 136 (1910)
 IL: «Type collected in Costa Rica, February, 1900, Ad. Tonduz 13478 (U. S. Nat. Herb. 577723)»
 = *Spachea sericea* Kuntze, Revis. gen. pl. 1: 88 (1891)
 [=] *Banisteria kuntzei* Small, N. Amer. fl. 25(2): 137 (1910), nom. nov. pro *Spachea sericea* Kuntze
 IL: «Panama»
 = *Banisteria hyposericea* Standl. & L. O. Williams, Ceiba 3(1): 50 (1952), «*hyposerica*»
 IL: «HONDURAS: Dept. [Francisco] Morazán: Colinas y quebradas áridas, abajo de Suyapa, alt. 1100 m., Dic. 26, 1948, Antonio Molina R. 14924 (TIPO en Herb. Esc. Agr. Panamá; dupl. en Herb. Chicago Nat. Hist. Mus.)»
 = *Heteropterys petenensis* Lundell, Wrightia 6(2): 30 (1978), «*Heteropteris*»
 IL: «Guatemala: Dept. Peten, Río Pasión, San Juan de Acul, in high forest on rocky shore of the lake, Feb. 11, 1964, C. L. Lundell 17944 (UTD, holotype)»
 CC: Ant. Molina (1975: 64). J. Cuatrecasas & T. B. Croat (1980: 887)
- 4338. *Heteropterys orinocensis* (Kunth) A. Juss., Arch. Mus. Hist. Nat. 3: 462 (1843)**
 = *Banisteria ? orinocensis* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 162 (1822)
 IL: «Crescit in ripa fluminis Orinoci, prope San Borja»
 CC: Rivas 162 (MO)
- Heteropterys rosea* Standl. ex Ant. Molina, Ceiba 19(1): 65 (1975), nom. nud.
- 4339. *Heteropterys standleyana* W. R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16: 80 (1987), nom. nov. pro**
Banisteria rosea Standl.
 [=] *Banisteria rosea* Standl., J. Wash. Acad. Sci. 14: 96 (1924), nom. illeg., non Kralik (1908)
 IL: «El Salvador: collected in a ravine at the base of the Volcán San Vicente, near the town of San Vicente, Mar 1922, P. C. Standley 21663 (HT: US-1137424)», fide w³-TROPICOS (MO)
 CC: W. R. Anderson (1987: 80)
- 1259. *Hiraea* Jacq., Enum. syst. pl.: 21 (1760)**
 Typus: *Hiraea reclinata* Jacq.

Catálogo de las plantas vasculares de Honduras

4340. *Hiraea barclayana* Benth., Bot. voy. Sulphur 3: 75 (1844)

IL: «Libertad in Columbia»

= *Hiraea velutina* Nied., *Hiraea*: 6 (1906)

IL: «Type: *Lehmann 4636*, no date, Colombia (B)», fide w³-TROPICOS (MO)

CC: P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 487). Ant. Molina (1975: 65)

4341. *Hiraea fagifolia* (DC.) A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 13: 258 (1840)

= *Banisteria fagifolia* DC., Prodr. 1: 590 (1824)

IL: «in Cayennâ. (v[isa] s[ic]ca) sine fr.»

= *Hiraea riedleyana* A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 13: 258 (1840)

IL: «Type: *Hostmann 291*, no date, Surinam (P)», fide w³-TROPICOS (MO)

CC: P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 485). Ant. Molina (1975: 65)

4342. *Hiraea reclinata* Jacq., Enum. syst. pl.: 21 (1760), nom. nud.; Select. stirp. amer. hist.: 137, tab. 174, fig. 42 (1763)

= *Triopteris reclinata* (Jacq.) Cav., Diss. 9: 431 (1790)

= *Malpighia reclinata* (Jacq.) Colla, Hortus ripul.: 85 (1824)

IL: «In Insulis Caribaeis vicinaque Americae continenter», secundum nomen libri

= *Malpighia obovata* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl. 5: 146 (1822)

[=] *Hiraea kunthiana* A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 13: 258 (1840), nom. nov. pro *Malpighia obovata* Kunth

= *Hiraea obovata* (Kunth) Nied., *Hiraea*: 8 (1906)

IL: «Crescit in ripa fluminis Magadalenae, prope Nares»

= *Hiraea borealis* Nied., Verz. Vorles. Lyceums Braunsberg 1906: 5 (1906)

IL: nulla, «Samarac non suppetunt»

= *Tetrapterys panamensis* Seem., Bot. voy. Herald 3: 92 (1853)

= *Hiraea panamensis* (Seem.) Griseb. in Mart., Fl. bras. 12(1): 100 (1858)

IL: «Near Santiago de Veraguas»

CC: P. C. Standley (1931b: 244). P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 486). T. G. Yuncker (1940: 300). Ant. Molina (1975: 65). E. Bermingham & al. (1998: 21)

NV: guacuco

4343. *Hiraea smilacina* Standl., Contr. Arnold Arbor. 5: 87, tab. 13 (1933)

IL: «Panama: Barro Colorado Island, Canal Zone, June 27, 1931, L. H. & Ethel Zoe Bailey 403 (Herb. Field Mus. No. 643070, type)»

CC: P. House 2184 (TEFH); R. Liesner 26131 (MO). W. R. Anderson (2001a: 1278)

NV: wahpu wan (tawahka)

1260. *Malpighia* L., Sp. pl. 1: 425 81753)

Typus: *Malpighia glabra* L.

4344. *Malpighia coccigera* L., Sp. pl. 1: 426, no. 6 (1753)

IL: «Habitat in America calidiore»

CC: Ant. Molina (1975: 65)

OB: (C)

4345. *Malpighia emarginata* Sessé & Moc. ex DC., Prodr. 1: 578 (1824)

IL: «in Mexico»

= *Malpighia berteriana* Spreng., Syst. veg. ed. 16, 2: 383 (1825)

IL: «Guadalupa. Bertero»

= *Malpighia umbellata* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 1(9): 310, tab. 29 (1895)

IL: «[Mexico. Sonora:] Agiabampo, October 3 to 15, 1890, [E. Palmer] No. 799»

= *Malpighia punicifolia* auct., non L. (1762)

CC: L. O. Williams (1981: 204)

4346. *Malpighia glabra* L., Sp. pl. 1: 425, no. 1 (1753)

IL: «Habitat in Jamaica, Brasilia, Surinamo, Curacao»

= *Malpighia punicifolia* L., Sp. pl. ed. 2, 1: 609, no. 2 (1762)

L: «Habitat in America meridionali»

= *Malpighia semeruco* A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 13: 337 (1840)

L: «HT: *Plée s.n.*, no date, Venezuela: Zulia: Maracaybo ad Perijá (P-JU)», fide w³-TROPICOS (MO)

= *Malpighia undulata* A. Juss., Arch. Mus. Hist. Nat. 3: 266 (1843)

L: «(v[isa] s[ic]ca) herb. mus. Par., Lessert). Hab. Mexicum [...] Circa Puente Nacional provinciae Vera-Cruz junio, et circa Teapa novembri florentem legit Cl. Lindem»

CC: J. D. Smith (1895: 15). S. J. Record (1927: 28). A. Pérez Estrada (1929: 20). P. C. Standley (1930c: 21); (1931b: 244). T. G. Yuncker (1938: 373). Ant. Molina (1975: 65). C. Nelson (1986b: 297). C. Alix, O. Vargas & A. D. Lobo (1999: 159)

IV: acerola; cereza; cereza de Barbados, fide A. Pérez Estrada (1929); endurecemaíz; nance morado

347. *Malpighia romeroana* Cuatrec., Webbia 13(2): 561, fig. 33-l-m, tab. 46, fig. 34 (1958)

- IL: «Typus: Colombia; Santander: margen izquierda del río Opón, alrededores de la Quebrada La India, 10 leguas al SE de Barranca Bermeja, 200 m. alt.; arbusto 2 m., pétalos morados, fruto rojo, 22-IX-1954, R. Romero 4894 (holotypus, COL; isotypus, US)»
 = *Malpighia mayana* Lundell, *Wrightia* 5(7): 242 (1976)
 IL: «Guatemala: Dept. Peten, La Cumbre, in high forest, zapotal, on hill about 4 km. east on Rio Purula Road, Sept. 19, 1975, C. L. Lundell & Elias Contreras 19882 (LL, type)»
 CC: R. Cruz 372 (TEFH); C. Soto V. 578 (TEFH)
- 4348.** *Malpighia verruculosa* W. R. Anderson, Contr. Univ. Michigan Herb. 16: 99 (1987)
 IL: «Type: Nicaragua. Rivas: Slopes of Volcán Maderas above coffee plantations above Balgüe, Isla de Ometepe, 11°28'N, 85°31'W, 600-800 m, cloud forest-rain forest, 14 Sep 1983 fl/fr, Nee & Tellez 28038 (MICH, holotype)»
 CC: W. R. Anderson (1987: 100); (2001a: 1283)
- 1261.** *Mascagnia Bertero* in Colla, Hortus ripul.: 86 (1824)
 Typus: *Mascagnia americana* Bertero
- Mascagnia mortoniana* Standl. & L. O. Williams ex Ant. Molina, Ceiba 19(1): 65 (1975), nom. nud.
- 4349.** *Mascagnia polycarpa* Brandege, Univ. Calif. Publ. Bot. 10(8): 409 (1924)
 = *Hiraea polycarpa* (Brandegee) Standl., Contr. U. S. Natl. Herb. 23(4): 1668 (1926)
 IL: «Collected at Remudadero, Vera Cruz. [C. A. Purpus] No. 9019. Type, Herb. Univ. Calif. No. 220319»
 CC: C. Soto V. 918 (TEFH), C. Soto V. 922 (TEFH)
- 4350.** *Mascagnia sepium* (A. Juss.) Griseb. in Mart., Fl. bras. 12(1): 96 (1858)
 = *Hiraea sepium* A. Juss. in A. St.-Hil., Fl. Bras. merid. 3(22): 16, tab. 165 (1832)
 IL: «In sepibus prov. Rio Janeiro frequens»
 CC: P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 492). Ant. Molina (1975: 65). C. Nelson (1986b: 638)
- 1262.** *Spachea* A. Juss., Icon. sel. pl. 3: 19 (1837) [1838]
 Typus: *Spachea elegans* (G. Mey.) A. Juss.
- 4351.** *Spachea elegans* (G. Mey.) A. Juss. in Deless., Icon. sel. pl. 3: 19, tab. 31 (1837) [1838]
 = *Malpighia elegans* G. Mey., Prim. fl. esseq.: 178 (1818)
 = *Byrsonima elegans* (G. Mey.) DC., Prodr. 1: 580 (1824)
 IL: «In litore insulae Arowabisch»
 CC: Ant. Molina (1975: 65)
 OB: (C)
- 1263.** *Stigmaphyllon* Juss. in A. St.-Hil., Fl. Bras. merid. 3(22): 48, tab. 171 (1832)
 Typus: *Stigmaphyllon auriculatum* (Cav.) Juss.
- 4352.** *Stigmaphyllon bannisterioides* (L.) C. E. Anderson, Taxon 41(2): 328 (1992)
 = *Malpighia bannisterioides* L., Pl. surin.: 9 (1775)
 IL: «Type: Suriname, Dahlberg [sic] s. n. (holotype: Herb. Linn. 588.13, LINN)», fide C. E. Anderson, Taxon 41(2): 328 (1992)
 = *Banisteria ovata* Cav., Diss. 9: 429, tab. 257, fig. 1 (1790)
 = *Brachypterys borealis* A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 13: 291 (1840), nom. superfl.
 = *Stigmaphyllon ovatum* (Cav.) Nied., Stigmatoph. 2: 31 (1900)
 = *Brachypterys ovata* (Cav.) Small, N. Amer. fl. 25(2): 138 (1910)
 IL: «Surian. herb. 288 [sic] [...] Habitat in insula Sancti Dominici: ubi eam reperit Desportes, et Surian. V[isa] s[ic]ca apud D. de lussieu»
 Lectotypus ex C. E. Anderson (1987: 34): *Surian* 828 [sic] (P-JU)
 CC: C. Nelson (1986a: 205)
 NV: mano de león
- 4353.** *Stigmaphyllon ciliatum* (Lam.) A. Juss. in A. St.-Hil., Fl. Bras. merid. 3(22): 38 (1833)
 = *Banisteria ciliata* Lam., Encycl. 1: 369 (1783)
 IL: «M. de Commerson a observé cette plante au Brésil (v[isa] s[ic]ca) sans fr.»
 CC: C. E. Anderson (1987: 12); (1997: 172, fig. 40)
- 4354.** *Stigmaphyllon cordatum* Rose in Donn. Sm., Bot. Gaz. 18(6): 198 (1893)
 IL: «Depart. Guatemala, alt. 5,000^h, Mch. 1892, Heyde & Lux, (ex Pl. cit. 3,267)»
 CC: C. Nelson 1144 & J. R. Martínez (TEFH)
- 4355.** *Stigmaphyllon ellipticum* (Kunth) A. Juss., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 13: 190 (1840)
 = *Banisteria elliptica* Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. 5: 161 (1822)
 IL: «Crescit in Regno Novo-Granatensi, prope Loxam, alt. 1060 hex.»
 = *Banisteria mucronata* DC., Prodr. 1: 589 (1824)
 = *Stigmaphyllon mucronatum* (DC.) A. Juss., Monogr. Malpigh.: 123 (1843)

Catálogo de las plantas vasculares de Honduras

- IL: «in Novâ-Hispaniâ? (v[isa] s[ic] sine fr.)»
 = *Banisteria billbergiana* Beurl., Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1854: 116 (1854)
 IL: «Type: Panama. Colón: "Porto Bello [Portobelo], ad litora insulae Manzanilla [Manzanillo]," *Billberg* 285 (holotype, SI)», fide C. E. Anderson (1987: 18)
 = *Stigmaphyllon mucronatum* (DC.) A. Juss. var. *nicaraguense* Nied., *Stigmatoph.* 2: 4 (1900)
 = *Stigmaphyllon ellipticum* (Kunth) A. Juss. var. *nicaraguense* (Nied.) Nied. in Engl., *Pflanzenr.* IV. 141 (Heft 93): 500 (1928)
 IL: «Type: Nicaragua. Matagalpa: Matagalpa, 800 m, *Rothschuh* 643 (holotype: B, destroyed)», fide C. E. Anderson (1997: 150)
 = *Stigmaphyllon mucronatum* (DC.) A. Juss. var. *intermedium* Nied., *Stigmatoph.* 2: 4 (1900)
 = *Stigmaphyllon ellipticum* (Kunth) A. Juss. var. *intermedium* (Nied.) Nied. in Engl., *Pflanzenr.* IV. 141 (Heft 93): 500 (1928)
 IL: «Type: Panama. Panamá: "Río Bayono [Bayano]," Mar 1858, *Wagner s. n. (Fasc. 11)*», fide C. E. Anderson (1997: 150)
 Lectotypus ex C. E. Anderson (1987: 18): *Wagner s. n. (M)*
 = *Stigmaphyllon periplocifolium* sensu Donn. Sm., *Enum. pl. guatem.* 4: 16 (1895)
 CC: J. D. Smith (1895: 16). P. C. Standley (1930d: 31). T. G. Yuncker (1938: 373). Ant. Molina (1975: 65). C. Nelson (1986b: 158, 869), C. E. Anderson (1987: 19); (1997: 151, fig. 47)
 NV: bejuco de ratón; camote; chanchito de monte; corrimiento; guacamaya; mano de león
- 4356. *Stigmaphyllon lindenianum*** A. Juss., *Arch. Mus. Hist. Nat.* 3: 362 (1843)
 IL: «(v[isa] s[ic] herb. mus. Par., Lessert). Hab. Mexicum [...] Juxta Teapa aprili maioque floriferum legit cl. *Lindem*»
 = *Stigmaphyllon lindenianum* A. Juss. var. *jussieuanum* Nied. in Engl., *Pflanzenr.* IV. 141 (Heft 93): 499 (1928), nom. superfl.
 = *Stigmaphyllon lindenianum* A. Juss. var. *yucatanum* Nied., *Stigmatoph.* 2: 18 (1900)
 IL: «Type: Mexico. Yucatán, *Gaumer* 408 (holotype, B, destroyed)», fide C. E. Anderson (1997: 188)
 = *Stigmaphyllon tilifolium* Nied. var. *sericans* Nied., *Stigmatoph.* 2: 17 (1900)
 = *Stigmaphyllon sericans* (Nied.) Small, *N. Amer. fl.* 25(2): 144 (1910)
 IL: «Type: Honduras. Santa Bárbara [Cortés]: [San] Pedro Sula, 800 ft, *Thieme* 5164», fide C. E. Anderson (1997: 188)
 Lectotypus ex C. E. Anderson (1987: 30): *Thieme* 5164 (US)
 = *Stigmaphyllon tilifolium* Nied. var. *sericans* Nied. fma. *grandifolium* Nied. in Engl., *Pflanzenr.* IV. 141 (Heft 93): 498 (1928), «*grandifolium*»
 IL: «Costa Rica (J. D. Smith n. 6458: La Concepción, Llanuras de Sa. Clara, 250 m; Herb. Inst. ph.-g. costaric. n. 9365 [leg. *Pittier* und *Tonduz*]: Wälder am Shirrores, Calamanca [sic], 100 m, n. 10670 [leg. *Biolley*]: Sa. Clara-Las Delicias, 500 m, n. 11234 [leg. *Pittier*]: Tuis bei Turalba [sic], und n. 11454 [leg. *Tonduz*], 650 m)»
 Lectotypus ex C. E. Anderson (1987: 30): *Tonduz* 11454 (F)
 = *Stigmaphyllon fulgens* sensu Donn. Sm., *Enum. pl. guatem.* 4: 16 (1895)
 CC: J. D. Smith (1895: 16). F. Niedenzu (1928: 498). P. C. Standley (1931b: 244). Ant. Molina (1975: 65). C. E. Anderson (1997: 191, fig. 62)
 NV: mariposita
- 4357. *Stigmaphyllon puberum*** (Rich.) A. Juss., *Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2*, 13: 289 (1840)
 = *Banisteria pubera* Rich., *Actes Soc. Hist. Nat. Paris* 1(1): 109 (1792)
 IL: «Catalogus plantarum [...] e Cayenna missarum a Domino *Le Blond* / Conscriptus a L. Richard [pag. 105]»
 CC: P. C. Standley & J. A. Steyermark (1946qq: 496). T. G. Yuncker (1938: 373); (1940: 300). Ant. Molina (1975: 65). C. E. Anderson (1987: 39); (1997: 73, fig. 15)
- 4358. *Stigmaphyllon retusum*** Griseb. in Oerst., *Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn* 1853(1-2): 45 (1853)
 IL: «[Nicaragua ved Granada]»
 Lectotypus ex C. E. Anderson (1987: 39): *Oersted s. n. (GOET)*
 = *Stigmaphyllon lupulus* S. Watson, *Proc. Amer. Acad. Arts* 21(2): 461 (1886); vide *Proc. Amer. Acad. Arts*, N. S., 13(2): 461 (1886)
 = *Stigmaphyllon lindenianum* A. Juss. var. *lupulus* (S. Watson) Nied., *Stigmatoph.* 2: 19 (1900)
 = *Stigmaphyllon lindenianum* A. Juss. subsp. *lupulus* (S. Watson) Nied. in Engl., *Pflanzenr.* IV. 141 (Heft 93): 499 (1928)
 = *Stigmaphyllon lindenianum* A. Juss. subsp. *lupulus* (S. Watson) Nied. var. *watsonianum* Nied. in Engl., *Pflanzenr.* IV. 141 (Heft 93): 499 (1928), nom. superfl.
 IL: «[Department of Yzabal, Guatemala, February to April, 1885] Scarcely woody, running over the ground and climbing bushes in the clearings at the Chocon plantation [S. Watson 35 (holotype: GH)]»
 = *Stigmaphyllon lindenianum* A. Juss. var. *nicaraguense* Nied., *Stigmatoph.* 2: 19 (1900)
 = *Stigmaphyllon lindenianum* A. Juss. subsp. *lupulus* (S. Watson) Nied. var. *nicaraguense* Nied. in Engl., *Pflanzenr.* IV. 141 (Heft 93): 499 (1928)
 IL: «Type: Nicaragua. *Wright s. n.* (holotype: B, destroyed)», fide C. E. Anderson (1997: 194)
 = *Stigmaphyllon humboldtinum* sensu Ant. Molina (1975: 65)
 CC: Ant. Molina (1975: 65). C. E. Anderson (1987: 41); (1997: 195, fig. 65)
- 1264. *Tetrapteryx*** Cav., *Diss.* 9: 433 (1790)
 Typus: *Tetrapteryx inaequalis* Cav.
- 4359. *Tetrapteryx arcana*** C. V. Morton, *Publ. Carnegie Inst. Wash.* 461: 132 (1936)
 IL: «Type in the U. S. National Herbarium, No. 1,493,921, collected at Rio Privacion, Mountain Pine Ridge, El Cayo District, British Honduras, February 26, 1931, by H. H. Bartlett (No. 11796)»
 CC: Ant. Molina (1975: 65)
- 4360. *Tetrapteryx argentea*** Bertol., *Fl. guatimal.*: 19 (1840). Figura 618.
 IL: «Habitat in Antigua Guatimala [leg. *Joaquín Velásquez*]»
 CC: C. Nelson 10588, 13521 & R. Andino (TEFH)

4361. *Tetrapterys discolor* (G. Mey.) DC., Prodr. 1: 587 (1824)

= *Triopteris discolor* G. Mey., Prim. fl. esseq.: 182 (1818)

IL: «In sylvis arenosis plantationis Sophienburg»

= *Tetrapterys surinamensis* Miq., Linnaea 18: 55[bis] (1844), «*Tetrapteris*»

= *Tetrapterys discolor* (G. Mey.) DC. var. *surinamensis* (Miq.) Nied., Tetrapterys: 42 (1909)

IL: «Crescit Surinami, in via ad Wanica, m. Sept. cum fruct matur.»

«Type : Hostmann 983, no date, Surinam (W)», fide w³-TROPICOS (MO)

= *Tetrapterys cuspidata* Triana & Planch., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 18: 336 (1862)

IL: non vidimus

= *Tetrapterys schiedeana* Cham. & Schltdl. fma. *grandifolia* Nied., Verzeichnis Vorles. Königl. Lyceum

Hosianum Braunsberg 1909(10): 38 (1909)

IL: non vidimus

CC: Ant. Molina (1975: 65)

4362. *Tetrapterys schiedeana* Cham. & Schltdl., Linnaea 5: 218 (1830)

IL: «[Plantarum mexicanarum a cel. viris Schiede et Deppe collectatum:] In sylvis prope Jalapam in arboribus scandens. Aug. Hacienda de la Laguna. Sept.»

= *Tetrapterys eriocarpa* Bertol., Novi Comment. Acad. Sci. Ist. Bononiensis 104: 419 (1840)

IL: «Habitat in Guatemala, Joaquín Velásquez s.n.», fide w³-TROPICOS (MO)

= *Malpighia dasycarpa* Donn. Sm., Bot. Gaz. 24(6): 390 (1897)

IL: «Rio Samalá, Depart. Retalhuleu, Guat., alt. 1700ⁿ, Oct. 1891, Shannon, no. 217 Pl. Guat., etc., qu. ed. Donn. Sm. sub *M. glabra* L.?—Banks of Rio Torres, San Francisco de Guadalupe, Costa Rica, alt. 3400ⁿ, Nov. 1893, Tonduz, no. 8444 herb. nat. C. R.—San Juan del Norte, Nicaragua, June 1895, Pittier, no. 9653 herb. nat. C. R.»

= *Heteropteris yucatanensis* Millsp., Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 1(4): 369 (1898)

IL: «Izamal, Sept. [Geo. F. Gaumer] (816)»

= *Tetrapterys schiedeana* Cham. & Schltdl. fma. *primaeva* Nied., Verzeichnis Vorles. Königl. Lyceum Hosianum Braunsberg 1909(10): 38 (1909)

IL: non vidimus

CC: J. D. Smith (1895: 16). T. G. Yuncker (1940: 300). Ant. Molina (1975: 65)