

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:ITIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

Cum Privilegio S. R. Mitis Sueciæ & S. R. Mitis Poloniæ ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

11. ARENARIA foliis ovatis ciliatis acutis. *ciliata.*
 Alfine, serpilli folio, multicaulis & multiflora. *Segu. ver.*
 421. t. 5. f. 2.

β. Arenaria foliis ovatis nervosis sessilibus imbricatis acutis. *Amœn. acad.* 1. p. 162. n. 155.

- γ. Alfine foliis lanceolatis, petalis integris calyce majoribus. *Hall. helv.* 390. t. 7. f. 3.
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæis. 2

12. ARENARIA foliis subulatis subtus hispida.

Habitat Montpelii in monte calcaris.

Habitus *spergulae*. Caules simplices, pilis raris adspersi. hispida.

Folia opposita, subulata, plana, subtus pilis raris hispida. Panicula primum dichotoma, mox alternis paniculis ramosa.

CHERLERIA.

1. CHERLERIA. *Hall. helv.* 391. t. 6.

Lychnis alpina, mucosis foliis densius stipatis, floribus *Sedoides*. parvis, calyce duriore. *Pluk. alm.* 233. t. 42. f. 8.

Sedum montanum perpusillum luteum. *Morif. hist.* 3. p. 471. f. 12. t. 6. f. 14.

Sedum montanum perpusillum, luteolis floribus. *Park. theatr.* 758.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Valesiæ, Gotthardo. 2

GARIDELLA.

1. GARIDELLA. *Hort. cliff.* 170. *Hort. ups.* 108. *Nigella-*
Roy. lugdb. 481. *strum.*

Garidella foliis tenuissime divis. *Garid. prov.* 203. t. 39.

Nigellastrum raris & fœniculaceis foliis. *Magn. hort.* 143. t. 143.

Nigella cretica, folio fœniculi. C. B. *Morif. hist.* 3. p. 516. f. 12. t. 18. f. 6.

Habitat in Galloprovincia. ☉

MALPIGHIA.

1. MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis umbellatis. *Hort. cliff.* 169. *Hort. ups.* 103.

Roy. lugdb. 459.

Cerasus jamicensis, fructu tetrapyreno. *Comm. hort.* 1.

p. 145. t. 75.

Cerasus americana, myrti conjugatis foliis, fructu acerbissimo tetrapyreno. *Pluk. alm.* 94. t. 157. f. 7.

Arbor baccifera, folio subrotundo, fructu cerasino sulcato rubro polypyreno: ossiculis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hist.* 2. p. 106. t. 207. f. 2. *Raj. dendr.* 74.

Habitat in Jamaica, Brasilia, Surinamo, Curacao. $\bar{h}$

urens.

2. **MALPIGHIA** foliis oblongo-ovatis: setis decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis.

Malpighia angustifolia & *latifolia*, fructu subtus spinoso. *Plum. gen.* 46.

Mespilus americana, folio lato subtus spinoso, fructu rubro. *Tournef. inst.* 642.

Arbor baccifera, folio oblongo subtilissimis spinis subtus obsito, fructu cerasino sulcato polypyreno: ossiculis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hist.* 2. p. 106. t. 207. f. 3. *Raj. dendr.* 74.

Habitat in America calidiore. $\bar{h}$

crassifolia.

3. **MALPIGHIA** foliis ovatis integerrimis subtus tomentosis, racemis terminalibus.

Malpighia latifolia, cortice sanguineo. *Barr. equin.* 72.?

Tilia affinis *laurifolia*, arbuti floribus albis racemosis odoratis, fructu pentagono. *Sloan. jam.* 136. *hist.* 2. p. 20. t. 163. f. 1.?

Habitat in America calidiore. $\bar{h}$

Arbor. Foliis ovatis palmaribus crassis subpetiolatis integerrimis, supra pubescentibus, subtus tomentosis. Racemi terminales longi tomentosi.

verbascifolia.

4. **MALPIGHIA** foliis lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus.

Malpighia humilis, verbasci folio & facie, caule crassissimo. *Barr. equin.* 71.

Habitat in America calidiore. $\bar{h}$

Folia lanceolato-ovata, in petiolos desinentia, pedalia, villosa, subtus densissimo tomento vestita. Racemi terminales, longi, villosi.

aquifolia.

5. **MALPIGHIA** foliis lanceolatis dentato-spinosis subtus hispidis.

Malpighia angustis & *acuminatis* *aquifolii* foliis. *Plum. gen.* 46.

Habitat in America calidiore. $\bar{h}$

occigera.

6. **MALPIGHIA** foliis subovatis dentato-spinosis.

Mal-

Malpighia humilis, ilicis cocciglandiferæ foliis. *Plum.*
gen. 46.

Habitat in America calidiore. ♪

BANISTERIA.

1. BANISTERIA foliis alternis lanceolatis ferratis. *Impuloides.*
Paullinia foliis simplicibus lanceolatis ferratis. *Hort. ups.*
 97.
Lupulus sylvestris americana claviculis donata. *Pluk.*
alm. 229. *t.* 201. *f.* 4. & *t.* 163. *f.* 3.
Habitat in Barbados. ♪
2. BANISTERIA foliis sinuato-angulosis. *angulosa.*
Acer scandens, folio anguloso. *Plum. spec.* 18.
Clematis anguloso folio, aceris fructu. *Plum. amer.* 77.
t. 92. *Raj. supp.* 328.
Habitat in America calidiore. ♪
3. BANISTERIA foliis ovatis, spicis lateralibus, semi-purpurea.
 nibus erectis.
Acer scandens, pseudoacaciæ folio, flore purpurascen-
 te. *Plum. spec.* 18.
Habitat in America meridionali. ♪
4. BANISTERIA foliis ovato-oblongis acuminatis, ra- *benghalensis.*
 cemis lateralibus, seminibus patentibus. *Fl. zeyl.* 176.*
Acer scandens, foliis citri, flore cæruleo spicato. *Plum.*
spec. 18.
Acer scandens, foliis laurinis. *Sloan. jam.* 137. *hist.* 2.
p. 26. *Raj. dendr.* 94.
Acer benghalensis, laurinis foliis, fructu tergemino. *Pluk.*
alm. 7. *t.* 3. *f.* 1.
Habitat in Indiis ♪
5. BANISTERIA foliis ovatis, ramis dichotomis. *dichotoma.*
Banisteria foliis ovatis, ramis dichotomis, seminibus ex-
 trorsum tenuioribus, introrsum lacinulam emittenti-
 bus. *Hort. cliff.* 169.*
Habitat in America calidiore. ♪
6. BANISTERIA foliis ovatis, ramis brachiatis, semini- *fulgens.*
 bus extrorsum tenuioribus.
Banisteria foliis ovatis, ramis ramosis, seminibus extror-
 sum tenuioribus, introrsum lacinulam emittentibus.
Hort. cliff. 169.*
Acer scandens, convolvuli folio, flore ex aureo cinereo.
Plum. spec. 18.

Acer

Acer scandens minus, apocyni facie, folio subrotundo.
Sloan. jam. 138. hist. 2. p. 27. t. 162. f. 2. Raj. dendr. 94.

Triopteris americana scandens, fructu fulgente majore
 aureo. *Pluk. mant. 185.*

Habitat in America. h

brachiata.

7. *BANISTERIA* foliis subovatis, ramis brachiatis, feminibus introrsum angustioribus.

Banisteria foliis subovatis, ramis ramosis, feminibus introrsum tenuioribus nullam lacinulam emittentibus.

*Hort. cliff. 169. **

Habitat in America. h

TRIOPTERIS.

jamaicensis. 1. *TRIOPTERIS.* *Hort. cliff. 169. **

Triopteris jamaicensis, angusto salicis folio, fructu minore fusco. *Pluk. alm. 377.*

Aceri vel *Paliuro* affinis, angusto oblongo ligustri folio, flore tetrapetalo herbaceo. *Sloan. jam. 138. hist. 2. p. 27. t. 162. f. 3. Raj. dendr. 94.*

Habitat in America calidiore. h

PENTAGYNIA.

AVERRHOA.

Bilimbi.

1. *AVERRHOA* caudice nudo fructificante, pomis oblongis obtusangulis. *Fl. zeyl. 177. **

Blinbingum teres. *Rumpf. amb. 1. p. 118. t. 16.*

Bilimbi. *Rheed. mal. 3. p. 55. t. 45. 46.*

Habitat in India. h

Carambola.

2. *AVERRHOA* axillis foliorum fructificantibus, pomis oblongis acutangulis. *Fl. zeyl. 178. **

Mala goënsia, fructu octangulati pomi vulgaris magnitudine. *Bauh. pin. 433.*

Prunum stellatum. *Rumpf. amb. 1. p. 115. t. 35.*

Tamara Tonga f. *Carambolas.* *Rheed. mal. 3. p. 51. t. 43. 44.*

Habitat in India. h

acida.

3. *AVERRHOA* ramis nudis fructificantibus, pomis subrotundis. *Fl. zeyl. 179.*

Neli-pouli. *Rheed. mal. 3. p. 57. t. 47. 48. Raj. hist. 1450.*

Habitat in India. h

CO-