

CAROLI LINNÆI

Equitis aur. de Stella polari,

ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL.
ACAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPERIAL.
LOND IN. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

SPECIES
PLANTARUM.

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,
AD

GENERA RELATAS,
CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS;
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE
DIGESTAS.

TOMUS I.

Editio Secunda, aucta.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sveciæ & S. R. M:tis Poloniæ ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ

IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII
1762.

*Tribulus foliolis quinque parium. Fl. zeyl. 168. **

Tribulus terrestris zeylanicus, cauliculis villosis, fructu acuminato. Burm. zeyl. 226. t. 106. f. 1.

Habitat in Zeylona.

terrestris.

3. **TRIBULUS** foliolis sexjugatis subæqualibus, seminibus quadricornibus. *Hort. cliff. 160. Hort. ups. 103.*

Roy. lugdb. 460. Sauv. monsp. 227. Brown jam. 220.

Tribulus terrestris, ciceris folio, fructu aculeato. Bauh. pin. 250.

Tribulus terrestris. Lob. ic. 2. p. 84.

Tribulus terrestris minor incanus hispanicus. Barr. rar. 54. t. 558.

Habitat in Europa australi ad semitas. ☉.

Cistoides.

4. **TRIBULUS** foliolis octojugatis subæqualibus.

Tribulus foliis octo parium pinnatis. Roy. lugdb. 460.

Tribulus terrestris major curassavicus. Herm. par. 236. t. 236.

Tribulus terrestris americanus, argemones flore flavo. Pluk. alm. 374. t. 64. Raj. suppl. 649.

Habitat in America calidior.

THRYALLIS.

brasiliensis. 1. **THRYALLIS.**

Fruticescens herba pisonis. Margr. bras. 79. f. 3

Habitat in Brasilia. h.

Fruticulus ramis teretibus, articulatis. Folia opposita, petiolata, ovata, integerrima. Stipulae setaceae. Racemus terminalis, e dichotomia ramorum, simplex, pedalis: Bracteae setaceae, brevissimae; Pedicellis filiformibus, flore longioribus. Flores parvi latei. Fructus tricocci.

LIMONIA.

acidissima. 1. **LIMONIA.**

Limonia malus sylvestris zeylanica, fructo pumilo. Burm. zeyl. 143.

*Schinus foliis pinnatis: petiolo marginato articulato, spinis axillaribus solitariis. Fl. zeyl. 175. **

Anisifolium. Rumph. amb. 2. t. 43.

Catu Tsiern Naregam. Rheed. mal. 4. p. t. 14.

Habitat in India. h.

Garidella foliis tenuissime divisis. *Garid. prov.* 203.
t. 39.

Nigellastrum raris & fœniculaceis foliis. *Magn. hort.*
143. t. 143.

Nigella cretica, folio fœniculi. C. B. *Moris. hist.* 3.
p. 516. f. 12. t. 18. f. 6.

Habitat in Galloprovincia. ☉.

MALPIGHIA.

1. MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis glabris, pe- glabra,
dunculis umbellatis. *Hort. cliff.* 169. *Hort. ups.* 108.
Roy. lugdb. 459. *Mill. dict.* t. 181. f. 2.

Malpighia fruticosa erecta, foliis nitidis ovatis acumi-
natis, floribus umbellatis, ramulis gracilibus. *Brown.*
jam. 230.

Cerasus jamaicensis, fructu tetrapyreno. *Comm. hort.*
1. p. 145. t. 75.

Arbor baccifera, folio subrotundo, fructu cerasino
sulcato rubro polypyreno: officulis canaliculatis.

Sloan. jam. 172. *hist.* 2. p. 106. t. 207. f. 2. *Raj.*
dendr. 74.

Habitat in Jamaica, Brasilia, Surinamo, Curacao. ☿.

2. MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis glabris, pe- puniceifolia,
dunculis unifloris.

Malpighia foliis ovatis integerrimis glabris. *Hort. ups.*
108.

Malpighia fruticosa erecta, ramulis gracilibus paten-
tibus, floribus solitariis. *Brown. jam.* 230.

Malpighia mali punici facie. *Pluk. gen.* 46. t. 166. f. 2.

Cerasus americana, myrti conjugatis foliis, fructu a-
cerbo tetrapyreno. *Pluk. alm.* 94. t. 157. f. 7.

Habitat in America meridionali. ☿.

3. MALPIGHIA foliis lanceolatis integerrimis glabris, nitida,
spicis lateralibus.

Malpighia foliis oblongo-ovatis utrinque nitidis, race-
mis axillaribus. *Jacq. amer.* 21.

Habitat in America. ☿.

4. MALPIGHIA foliis oblongo-ovatis: setis decumben- ürens,
tibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis. *Mill.*
dict. t. 181. f. 1.

Malpighia latifolia, folio subtus spinoso. *Plum. gen.*
46. t. 167. f. 1.

Mespilus americana, folio lato subtus spinoso, fructu rubro. *Tournef. inst.* 642.

Arbor baccifera, folio oblongo subtilissimis spinis subtus obsito, fructu cerasino sulcato polypyreno: ossiculis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hist.* 2. p. 106. t. 207. f. 3. *Raj. dendr.* 74.

Habitat in America calidiore. h.

Folia ovato-oblonga, integerrima, subpetiolata, adspersa, imprimis subtus, setis rigidis adpressis pungentibus, geminis: altera anteriore. Stipulae utrinque 2. Flores axillares utrinque 4, pedunculis unifloris, geniculo instructis.

angustifolia. 5. *MALPIGHIA* foliis lineari-lanceolatis: setis utrinque decumbentibus rigidis, pedunculis umbellatis. *Mill. dict.* *Jacq. amer.* 21.

Malpighia angustifolia, folio subtus spinoso. *Plum. gen.* 46.

Habitat in America meridionali. h.

crassifolia. 6. *MALPIGHIA* foliis ovatis integerrimis subtus tomentosis, racemis terminalibus.

Malpighia arborea, floribus spicatis, foliis ovatis acuminatis. *Brown. jam.* 230.

Malpighia arborea, foliis subrotundis alternis inferne sublanuginosis, spicis crassitis compositis terminalibus. *Brown. jam.* 231.

Malpighia latifolia, cortice sanguineo. *Barr. equin.* 72. ?

Tiliae affinis laurifolia, arbuti floribus albis racemosis odoratis, fructu pentagono. *Sloan. jam.* 136. *hist.* 2. p. 20. t. 163. f. 1.

Habitat in America calidiore. h.

Arbor. Foliis ovatis palmaribus crassis subpetiolatis integerrimis, supra pubescentibus, subtus tomentosis, saepius alternis. Racemi terminales longi tomentosi.

verbascifolia. 7. *MALPIGHIA* foliis lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus.

Malpighia humilis, verbasci folio & facie, caule crassissimo. *Barr. equin.* 71.

Baccifera arbor calyculata, foliis laurinis, fructu racemoso esculento subrotundo monoppyreno pallide luteo. *Sloan. hist.* 2. t. 198. f. 2.

Habitat in America calidiore. h.

Folia lanceolato-ovata, in petiolos desinentia, pedalia; villosa, subtus densissimo tomento vestita. Racemi terminales, longi, villosi.

8. MALPIGHIA foliis lanceolatis dentato-spinosis sub- aquifolia,
tus hispidis.

Malpighia angustis & acuminatis aquifolii foliis. *Plum.*
gen. 46. *ic.* 168. *f.* 1.

Habitat in America calidiore. h.

9. MALPIGHIA foliis subovatis dentato-spinosis. coccigrya.

Malpighia humilis, ilicis cocciglandiferæ foliis. *Plum.*
gen. 46. *ic.* 168. *f.* 2.

Habitat in America calidiore. h.

BANISTERIA.

1. BANISTERIA foliis sinuato-angulosis. angulosa.

Acer scandens, folio anguloso. *Plum. spec.* 18.

Clematis anguloso folio, aceris fructu. *Plum. amer.*

77. t. 92. *Raj. suppl.* 328.

Habitat in America calidiore. h.

2. BANISTERIA foliis ovatis, spicis lateralibus, semi- purpurea:
nibus erectis.

Banisteria foliis pinnatis: foliolis ovatis, spicis latera-
libus, seminibus erectis. *Mill. dict.*

Acer scandens, pseudoacaciæ folio, flore purpurascen-
te. *Plum. spec.* 18. *ic.* 15.

Habitat in America meridionali. h.

3. BANISTERIA foliis ovato-oblongis rigidis, racē- laurifolia,
mis terminalibus. *Mill. dict.*

Acer scandens, foliis laurinis. *Sloan. jam.* 137. *hist.* 2.

p. 26. *Raj. dendr.* 94.

Habitat in Jamaica. h.

4. BANISTERIA foliis ovato-oblongis acuminatis, benghalen-
racemis lateralibus, seminibus patentibus. *Fl. zeyl.* sis:

176. *

Acer scandens, foliis citri, flore cæruleo spicato. *Plum.*
spec. 18. *ic.* 14.

Acer benghalensis, laurinis foliis, fructu tergemino. *Pluk.*

alm. 7. t. 3. *f.* 1.

Habitat in Indiis. h.

- dichotoma. 5. **BANISTERIA** foliis ovatis, racemis dichotomis.
Banisteria foliis ovatis, ramis dichotomis, seminibus
 extrorsum tenuioribus, introrsum lacinulam emitten-
 tibus. *Hort. cliff.* 169. *.
Acer scandens, convolvuli folio, flore ex aureo cine-
 reo. *Plum. spec.* 18. ic. 13.
Habitat in America calidiore. h.
- fulgens. 6. **BANISTERIA** foliis subovatis subtus tomentosis,
 racemis brachiatis, pedunculis umbellatis.
Banisteria foliis ovatis, ramis ramosis, seminibus ex-
 trorsum tenuioribus, introrsum lacinulam emittenti-
 bus. *Hort. cliff.* 169. *.
Banisteria foliis orbiculatis, petiolis biglandulis, semi-
 nibus unialatis rugosis, racemis subumbellatis alari-
 bus. *Brown. jam.* 231.
Acer scandens minus, apocyni facie, folio subrotun-
 do. *Sloan. jam.* 138. *hist.* 2. p. 27. t. 162. f. 2. *Raj.*
dendr. 94.
Triopteris americana scandens, fructu fulgente majore
 aureo. *Pluk. mant.* 185.
Habitat in America. h.
- brachiata. 7. **BANISTERIA** foliis subovatis, ramis brachiatis, se-
 minibus introrsum angustioribus,
Banisteria foliis subovatis, ramis ramosis, seminibus
 introrsum tenuioribus nullam lacinulam emittentibus.
Hort. cliff. 169. *.
Banisteria foliis ovatis acuminatis, floribus laxo spica-
 tis, ramis diffusis scandentibus. *Mill. dict.*
Habitat in America. h.

TRIOPTERIS.

- jamaicensis. 1. **TRIOPTERIS.** *Hort. cliff.* 169. *.
Acer scandens tricoccus, foliis citri, flore luteo mino-
 re. *Plum. ic.* 9. t. 16?
Hiræa reclinata. *Jacq. amer.* 21.?
Habitat in America calidiore. h.

ERYTHROXYLON.

- areolatum. 1. **ERYTHROXYLON.** *Amœn. acad.* 5. p. 397. *.
Erythroxylon foliis ellipticis lineis binis longitudinali-
 bus