

Erythroxyton emarginatum Schum. et Thon., Guin. Pl., 224
 sec. Oliver, Flor. of Trop. Afr. I., pag. 274;
Erythroxyton caffrum Sond. in Linn. XXIII., pag.
 22; Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 233.
 Gueinzus 52! 587!

NATAL: Maritzburg 7551.

Erythroxyton pictum E. Mey. in herb. Drege! Harv. et Sond.,
 Flor. Cap. I, pag. 234.

NATAL: Inanda (leg. J. Wood.); Umbilo ad catarrha-
 ctam 8115.

MALPIGHIACEAE.

Acridocarpus natalitius Juss. Mon. pag. 232 sec. Harv. et
 Sond., Flor. Cap., I pag. 231, *Banisteria Kraus-*
siana Hoch.

Harv., Thes. Cap., I. tab. 19!

Gueinzus Natal 392!

NATAL: Vernlam 9064; Inanda (leg. J. Wood).

Sphedamnocarpus galphimiaefolius Juss. sub *Acridocarpus* Mon.
 pag. 273 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap., I, pag. 232.
 Gueinzus! sub *Banisteria leavigata* Sond.

TRANSVAAL: Boshveld Pinaasriver 4790.

Sphedamnocarpus pruriens Juss., sub *Acridocarpus* Mon. pag.
 238 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 232.
 Drege! sub *Banisteria*.

NATAL: Durban 8770, Inanda (leg. Wood.).

TRANSVAAL: Makapansberge Streydpoort 5493.

forma major nov. form.

forma omnis partibus robustior.

TRANSVAAL: Pretoria Aapies Poort 4194.

Sphedamnocarpus Rehmanii nov. sp.

S. fruticosus, caule ramoso, volubili, ramis teretibus flavido-sericeis, foliis 10—30 mm. lge. petiolatis, laminibus ovatis, basi subcordatis, subtus biglandulosis, apice acuminatis, integris, utrinque pilosis, subtus glaucis, ad nervos prominentes flavido-sericeis, 35—80 mm. lgis., 30—45 mm. ltis., flores umbellati- 3—4 flori, terminales, pedunculis 10—13 mm. lgis., pedicellis 18—20 mm. lgis., flavido-sericeis, sepalis ovatis, pubescentibus, 4—5 mm. lgis., petalis obovatis sepalis longioribus, carpella 3, axi coalita, hirsuta, styli 3, filiformes, divergentes; fructus samarae 3, oblongae, superne in alam productae, flavido-sericeae.

Sphedamnocarpo galphimiaefolio Juss. affinis indole eglandulorum foliorum bene distinguenda.

TRANSVAAL: Houtbosh 6390.

Triaspis Rehmannii nov. sp.

T. fruticosa, ramis teretibus, erectis, glauco-tomentosis, foliis subsessilibus vel 1—2 mm. lge. petiolatis, oppositis, laminibus ovatis, basi rotundatis subcordatisve, apice acuminatis, abrupte acuteque cuspidatis, integris, glaucis, supra sparse pilosis, subtus ad nervos prominentes tomentosis, 15—20 mm. lgis., 10—12 mm. ltis.; flores racemosi, axillares, pedunculis 10—12 mm. lgis., pedicellis 10—20 mm. lgis., tomentosis, sepalis lanceolato-ovatis, obtusis, tomentosis 3—4 mm. lgis., petalis unguiculatis, inaequalibus, uno margine longe fimbriato, alteris subintegris, 10—12 mm. lgis., filamentis inaequalibus, glabris, ovario piloso; samarae 3, margine 8—10 mm. late alatae.

Triaspidi macropteronti Welw. proxima differt magnitudine foliorum glabritudineque filamentorum.

TRANSVAAL: Pretoria Aapies Poort 4195; Boshveld Elandsriver and drift 4944.

ZYGOPHYLLEAE.

Tribulus terrestris Linn., Sp. plant. p. 554 sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 352, 353.
Eckl. et Zey. 751!

CAPE TOWN: 3336.

GRIQUALAND W.: Kimberlay 3442.

TRANSVAAL: Boshveld, Klippan 5207.

var. *hispidissimus* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I. c.

TRANSVAAL: Boshveld Kameelpoort 4826, Elandsriver Neu Halle 4907.

DAMARALAND: (leg. . . .).

var. *desertorum* Sond. in Harv. et Sond., Flor. Cap. I. c.

Eckl. et Zey. 751. β !

ORANJE FR. ST.: Mudriverdrift 3586.

KOUP: Flakkraal 2982.

Angea capensis Thunb. Flor. cap. pag. 389; Harv. et Sond., Flor. Cap. I. pag. 355.

In planitie carroidea prope Gwaakriver ad viam publicam inter Gray Reims et Aberdenn (leg. Bolus 528).

Zygophyllum sessilifolium Linn., Sp. plant., pag. 522. sec. Harv. et Sond., Flor. Cap. I., pag. 358.